

```

(*Solve the Radioactive decay eq by Dsolve
  command with initial conditions N(0)=1000 at t=0 *)

eq = n'[t] + n[t] / T == 0;
Sol = DSolve[eq, n[t], t]
nt = n[t] /. Sol[[1]]
nt = nt /. T -> 1 / E
eq1 = (nt /. t -> 0) == 1000
eq2 = nt /. C[1] -> 1000
Plot[eq2, {t, 0, 10}]

(*solve the eq of pendulum with initial conditions th=1 at t=0*)
eqp = th''[t] + g / l * th[t] == 0;
solp = DSolve[eqp, th[t], t]
solp = th[t] /. solp[[1]]
solp = solp /. {g -> 9.8, l -> 100}
eq1 = (solp /. t -> 0) == 0
eq2 = (solp /. t -> 1) == 1
constant = Solve[{eq1, eq2}, {C[1], C[2]}]
solp = solp /. constant[[1]]

Plot[solp, {t, 0, 180}]

(*alternative method*)
eq1 = th'[t] - w[t] == 0;
eq2 = w'[t] + g / l * th[t] == 0;
sol = DSolve[{eq1, eq2}, {th[t], w[t]}, t]
sol1 = th[t] /. sol[[1]]
sol2 = w[t] /. sol[[1]]
theta = sol1 /. {g -> 9.8, l -> 100}
omega = sol2 /. {g -> 9.8, l -> 100}
eqq1 = (sol1 /. t -> 0) == 5
eqq2 = (sol2 /. t -> 0) == 0
constant = Solve[{eqq1, eqq2}, {C[1], C[2]}]
theta = theta /. constant[[1]]
omega = omega /. constant[[1]]
Plot[{theta, omega}, {t, 0, 360}]

```