

线性代数 B2 23 年期末

一. 填空

1. 设线性变换 \mathcal{A} 在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & c \\ 1 & c & 1 \end{pmatrix}$, 在另一组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

则 $(a, b, c) = \underline{\hspace{2cm}}$

解: $(1, 0, 0)$

线性变换在两组基下的矩阵相似, 所以他们的迹相等, 则 $a = 1$

另外他们的秩也相等, 则 $b = c = 0$

2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的正交相抵标准型为 $\underline{\hspace{2cm}}$

解: $\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{19+\sqrt{145}}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{19-\sqrt{145}}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

注意审题, 正交相抵标准型就是要求其奇异值

我们有 $AA^T = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ -4 & 5 & -3 \\ 6 & -3 & 9 \end{pmatrix}$

计算其特征值有 $\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = \frac{19+\sqrt{145}}{2} \quad \lambda_3 = \frac{19-\sqrt{145}}{2}$

最后别忘记开根号

3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的正交相抵标准型为_____

解: $\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{\sqrt{11}}{2} \\ 0 & \frac{-\sqrt{11}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$

这是一道填空题，按理来说这应该是规范阵

验证有 $A^T A = A A^T = 9I$

那我们只用计算 A 的特征值即可

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}i, \lambda_3 = \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}i$$

结果为: $\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{\sqrt{11}}{2} \\ 0 & \frac{-\sqrt{11}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$

4. 设 V 为区间 $[0,1]$ 上连续函数全体按照内积 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 构成的欧氏空间, $W = \langle 1, x, x^2 \rangle$ 是 V 的子空间, 则函数 $f(x) = x^3$ 在 W 上的正交投影为_____

解: $\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{5}x + \frac{1}{20}$

注意要求正交投影要构造 $W = \langle 1, x, x^2 \rangle$ 的一组标准正交基, 过程略

5. 设 $V = \langle \cos(x), \cos(2x), \dots, \cos(nx) \rangle$, 求 V 的一组基 $\{\alpha_1 = \cos(x), \alpha_2 = \cos(2x), \dots, \alpha_n = \cos(nx)\}$ 的对偶基_____

解：设 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 的对偶基. 由 $f_i(\cos(jx)) = \delta_{ij}$ 对 $p(x) = \sum_{j=1}^n p_j \sin(jx) \in V$, 有

$$f_i(p) = \sum_{j=1}^n p_j f_i(\alpha_j) = p_i = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} p(x) \cos(ix) dx.$$

二.

给定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & -6 & 5 \end{pmatrix}$

(1) 求多项式矩阵 $\lambda I - A$ 的行列式因子, 不变因子, 初等因子组及 Smith 标准型

(2) 求 A 的 Jordan 标准型

解：Smith 标准型为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)^2 \end{pmatrix}$

Jordan 标准型为 $J = (J_2(2), 2)$

三. \mathcal{A} 为有限维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\text{rank}(\mathcal{A}) = \text{rank}(\mathcal{A}^2)$

求证: $V = \text{Im}(\mathcal{A}) \oplus \ker(\mathcal{A})$

证: 先证明 $r(\mathcal{A}) - r(\mathcal{A}^2) = \dim(\ker \mathcal{A} \cap \text{Im}(\mathcal{A}))$

考虑 \mathcal{A} 在 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上的限制: $\mathcal{A}|_{\text{Im} \mathcal{A}}: \text{Im} \mathcal{A} \rightarrow V$

有维数公式: 则 $\dim \ker \mathcal{A}|_{\text{Im} \mathcal{A}} = \dim \text{Im} \mathcal{A} - \dim \text{Im} \mathcal{A}|_{\text{Im} \mathcal{A}}$

其中 $\ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A} = \ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A}$ $\dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = r(\mathcal{A})$

$\operatorname{Im} \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A} = \mathcal{A}^2(V)$, 则 $\dim \operatorname{Im}(\mathcal{A}^2) = r(\mathcal{A}^2)$

代入得到 $r(\mathcal{A}) - r(\mathcal{A}^2) = \dim(\ker \mathcal{A} \cap \operatorname{Im} \mathcal{A})$

这样我们就证明了直和

又由维数公式 $\dim V = \dim(\operatorname{Im}(\mathcal{A}) \oplus \ker(\mathcal{A}))$, 这就说明了两边相等, 证毕

四. 设 $M := (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为线性空间 V 的一组基, \mathcal{A} 是 V 上的线性变换, \mathcal{A} 在 M 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 求 \mathcal{A} 的特征多项式, 最小多项式及 Jordan 标准型

(2) 求 \mathcal{A} 的特征子空间

(3) 求证: 如果 W 是 \mathcal{A} 的三维不变子空间, 则 W 包含 \mathcal{A} 的所有特征子空间

解:

(1) 显然按照行列式展开有特征值 1 和 2 (均为两重)

$$\varphi_{\mathcal{A}}(x) = (x - 1)^2(x - 2)^2$$

简单验证得到 $d_{\mathcal{A}}(x) = (x-1)^2(x-2)^2$

$$J = \text{diag}(J_2(1), J_2(2))$$

(2)

$$\lambda = 1 \text{ 有特征向量 } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 2 \text{ 有特征向量 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

\mathcal{A} 的特征子空间就是由这两个向量分别生成的子空间

(3)

我们先证明一个引理：

如果 W 是 \mathcal{A} 的不变子空间，那么 W 是 $f(\mathcal{A})$ 的不变子空间，这里 f 是任意多项式

证：这是因为 $\text{Im}(\mathcal{A}^k) \subseteq \text{Im}(\mathcal{A})$ 且 V 的任意一个子空间都是数乘变换的不变子空间

我们再证明第三问，首先特征值 1 和 2 的根子空间都是二维的（代数重数都是 2）

由引理我们知道 W 是 $\mathcal{A} - \lambda I$ 的不变子空间

事实上， W 是 $\mathcal{A} - \lambda I$ 的不变子空间等价于 W 是 \mathcal{A} 的不变子空间，因为存在一个一次的多项式使得 $f(\mathcal{A} - \lambda I) = \mathcal{A}$ ，由此自然推出：

如果 W 不包含 \mathcal{A} 的所有特征子空间，那么一定有某个特征值的特征子空间不在 W 中，这个特征子空间同时是 \mathcal{A} 与 $\mathcal{A} - \lambda I$ 的不变子空间，进而这个特征值对应的根子空间不在 W 中（否则取根子空间任意一个向量，它经过 $\mathcal{A} - \lambda I$ 作用后一定是特征向量，不包含在 W 中，那么就与 W 是不变子空间矛盾了）

注意 $\dim V = 4$, $\dim W = 3$, $\dim W_\lambda = 2$ 且 $\dim(W \cap W_\lambda) = 0$

且 $W + W_\lambda$ 是 V 的子空间，但是

$$\dim(W + W_\lambda) = \dim W + \dim W_\lambda - \dim(W \cap W_\lambda) = 5 > \dim V$$

矛盾，可知结论成立

五． 求证：实方阵 A 为规范方阵的充分必要条件是存在实系数多项式 $f(x)$ 使得 $A^T = f(A)$

(\Leftarrow) 注意到 A 与自己的任意正整数次幂是可交换的且与 I 可交换，进而与 $f(A)$ 是可交换的

(\Rightarrow) 新书上给出了复方阵类似结论，见例 5.4.4

我们证明实方阵情况：

A 规范则有正交相似标准型，存在正交阵 O 使得

$$B = OAO^T = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix} & & & \\ & \cdots & & \\ & & \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ -b_k & a_k \end{pmatrix} & \\ & & & \lambda_{2k+1} \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

我们想要的是对角阵而不是准对角阵，因为我们想使用一个引理

引理：

若 O 为正交阵， A 为对角阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ， $B = OAO^T$ ，那么对任意多项式 $f(x)$ 有

$$f(B) = f(OAO^T) = Of(A)O^T = O\text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n))O^T$$

证：注意正交阵性质及对角阵性质立得

又注意到

$$B + B^T = \text{diag}(2a_1I_{n_1}, \dots, 2a_kI_{n_k}, 2\lambda_{2k+1}, \dots, 2\lambda_n) \text{ 为对角阵}$$

这既符合了引理的形式，又因为加上的是 B （可以看作 B 自己的一个多项式），不会干扰最终的结论

另外，我们不妨设 $a_1, \dots, a_k, \lambda_{2k+1}, \dots, \lambda_n$ 都两两不同（如果相同我们把他们合成一个大对角块即可）

并记为 $B + B^T = \text{diag}(A_1, \dots, A_m)$ （这里角标不同是因为有二阶及以上的块）

又 A_1, \dots, A_m 特征值两两不同, 那么他们的特征多项式两两互素, 考虑中国剩余定理

我们有同余方程

$$\begin{cases} f(x) \equiv 2a_1 \pmod{\varphi_{A_1}(x)} \\ f(x) \equiv 2a_k \pmod{\varphi_{A_k}(x)} \\ f(x) \equiv 2\lambda_{2k+1} \pmod{\varphi_{A_{k+1}}(x)} \\ f(x) \equiv 2\lambda_n \pmod{\varphi_{A_m}(x)} \end{cases} \quad (\text{中间各项我们省略了})$$

此方程必有解 $f(x)$, 并注意到 $\varphi_{A_k}(x)$ 零化 A_k , 那么 $f(A_k) = 2a_k I_{n_k}$ (或者 $2\lambda_k$)

也就是存在 $f(x)$ s.t. $f(B) = B + B^T$

则 $B^T = f(B) - B \triangleq g(B)$

$g(x)$ 就满足要求

六. 设 A 为 n 阶可逆实对称阵

(1) 若 S 为 n 阶实正定对称阵, 求证: AS 的所有特征值都是实数

(2) 设 a 为 n 维实单位列向量, $B = A + aa^T A^{-1}$, 求证: B 的所有特征值都是实数

证 (1) 证一: (古法硬倒)

设 AS 有特征值 λ

则 $ASx = \lambda x$ (1 式) .

注意 A, S 对称且实, 取共轭转置 $x^*SA = \bar{\lambda}x^*$ (2 式)

(1 式)左乘 x^*S , 有 $x^*SASx = \lambda x^*Sx$

(2 式)右乘 Sx , 有 $x^*SASx = \bar{\lambda}x^*Sx$

两式相减: $(\lambda - \bar{\lambda})x^*Sx = 0$

注意到 S 可以视为复正定 Hermite 阵

$\forall x \neq 0$ 有 $x^*Sx > 0 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$, 即特征值为实数

证二:

先证明引理:

AB 与 BA 的非零特征值相同

证: $|\lambda I_n - BA| = \lambda^{n-m} |\lambda I_m - AB|$ 利用这个经典行列式结论立得, 在此不详细证明了

注意到 S 有唯一的平方根, 记为 B , 那么 B 为正定对称阵

则 $AS = AB^2$, 而 AB^2 与 BAB 有相同的非零特征值, 另一方面 BAB 为对称阵, 特征值都是实数

这就说明了 AS 的所有特征值都是实数

(2)

$$B = A(I + A^{-1}aa^T A^{-1})$$

注意到我们在（1）中证明完毕的结论，只需要证 $I + A^{-1}aa^T A^{-1}$ 正定即可

$(A^{-1})^T aa^T (A^{-1}) = A^{-1}aa^T A^{-1}$ 与 aa^T 相合，又 aa^T 为半正定对称阵，那么 $A^{-1}aa^T A^{-1}$ 也为半正定阵，特征值大于等于 0

所以 $I + A^{-1}aa^T A^{-1}$ 特征值大于等于 1，为正定阵

证毕