

线性代数 B2 21 年期末解析

一. 填空

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 则 A 的 Jordan 标准形是_____, A 的最小多项式是_____, A 的奇异值是_____. \mathbb{R}^3 上的线性变换 $\mathcal{A}: x \rightarrow Ax$ 的二维不变子空间为_____

解: $\text{diag}(J_2(1), 1)$; $1, \sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}}$; $\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ 或 $\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$

显然特征值为 $\lambda = 1$ (三重)

$$\text{又 } r(A - I) = 1 \quad r(A - I)^2 = 0$$

$$\Rightarrow J = \text{diag}(J_2(1), 1)$$

由有理标准型知识知道最小多项式为 $d_A(x) = (x - 1)^2$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{特征值为 } 1, \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{则奇异值为 } 1, \sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}}$$

\mathcal{A} 的二维不变子空间必然包含其特征子空间, 具体证明请仿照 23 年期末第四题 (3)

逐个检验二维线性空间就有 \mathcal{A} 的二维不变子空间

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ 或 } \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

2. 在四维欧式空间 \mathbb{R}^4 中, W 是由 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)$ 与 $\alpha_2 = (0, 1, 0, 1)$ 生成的子空间。

向量 $\alpha = (1, 1, -1, -1)$ 在 W 中的正交投影向量 β (即满足 $\alpha - \beta \in W^\perp$ 且在 W 中的向量 β) 是_____

解: $(0, 0, 0, 0)$

先标准正交化 α_1, α_2 , 注意其已经正交, 只需单位化

又注意到 α 实际上已经正交于 α_1, α_2

则 $\beta = (0, 0, 0, 0)$

在这里补充不同内积定义下的酉空间上求正交投影的方法:

(1) $(u, v) = u^* G v$ 时, 这里 G 为复正定阵, 给定 W 一组标准正交基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

对任意 $\alpha \in V$, α 在 W 上的正交投影存在唯一

且 $P\alpha = (\alpha_1, \alpha)\alpha_1 + (\alpha_2, \alpha)\alpha_2 + \dots + (\alpha_n, \alpha)\alpha_n$

(2) $(u, v) = u G v^*$ 时, 这里 G 为复正定阵, 给定 W 一组标准正交基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

对任意 $\alpha \in V$, α 在 W 上的正交投影存在唯一

且 $P\alpha = (\alpha, \alpha_1)\alpha_1 + (\alpha, \alpha_2)\alpha_2 + \dots + (\alpha, \alpha_n)\alpha_n$

3. 复方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & i & 1 \\ -i & 0 & i \\ 1 & -i & 0 \end{pmatrix}$ 的酉相似标准形为_____

解: $\text{diag}(1, 1, -2)$

有特征值 $\lambda_1 = 1$ (二重) $\lambda_2 = -2$

又 $r(A - I) = 1$

$$\Rightarrow J = \text{diag}(1, 1, -2)$$

二. 给定数域 \mathbb{F} 的 n 阶方阵 A , 定义 $V = \mathbb{F}^{n \times n}$ 上的线性变换

$$\mathcal{A}: X \rightarrow AX - XA.$$

如果 A 可以对角化, \mathcal{A} 是否也可以对角化? 请说明理由。

证: 可以对角化

A 可以对角化, 则存在可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

我们考虑构造一组基使得 \mathcal{A} 在这组基下为对角阵, 注意一组基经过可逆线性变换之后还是一组基

先取 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 自然基 $E = \{E_{ij} | 1 \leq i, j \leq n\}$

构造 $M = \{X_{ij} | 1 \leq i, j \leq n\}$ 其中 $X_{ij} = PE_{ij}P^{-1}$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(X_{ij}) &= AX_{ij} - X_{ij}A = PDP^{-1}PE_{ij}P^{-1} - PE_{ij}P^{-1}PDP^{-1} \\ &= P(DE_{ij} - E_{ij}D)P^{-1} = P(\lambda_i E_{ij} - E_{ij} \lambda_j)P^{-1} \\ &= (\lambda_i - \lambda_j)X_{ij}\end{aligned}$$

这就说明了 \mathcal{A} 在 $M = \{X_{ij} | 1 \leq i, j \leq n\}$ 下的矩阵为对角阵

三. 设 A 为 n 阶复方阵, k 为正整数。用 Jordan 标准形证明:

$$\text{rank}A^k - \text{rank}A^{k+1} \geq \text{rank}A^{k+1} - \text{rank}A^{k+2}$$

证: 相似的矩阵秩相同, 不妨考虑 Jordan 标准型

首先可逆阵自然满足等号成立 (特征值均非零)

或考虑 $\lambda \neq 0$ 时有 $r(J(\lambda)) = r(J^k(\lambda))$

再考虑特征值为 0 的 Jordan 块:

一阶 Jordan 块有 $J_1^k(0) = J_1(0)$, 秩不变

$J_n(0) = N_n$ 有性质

$$r(N_n^k) = \begin{cases} n-k, & k < n \\ 0, & k \geq n \end{cases}$$

$$\text{即 } r(N_n^k) - r(N_n^{k+1}) = \begin{cases} 1, & k < n \\ 0, & k \geq n \end{cases}$$

综合以上结果就有 $\text{rank}A^k - \text{rank}A^{k+1} \geq \text{rank}A^{k+1} - \text{rank}A^{k+2}$

四. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$

1. 求矩阵 A 的正交相似标准形.

2. 设 \mathbb{R}^3 上的线性变换 $\mathcal{A}: x \rightarrow Ax \in \mathbb{R}^3$. 证明: \mathcal{A} 是绕过原点的直线 l 的旋转变换,

并求变换的轴 l 及旋转角度 θ

解：1. $\det(A) = 1$

有特征值 $\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = -\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{5}}{3}i$ $\lambda_3 = -\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{5}}{3}i$

那么其正交相似标准型为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{\sqrt{5}}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

2. 先给出一般性方法

对三阶正交阵 A 且 $\det(A) = 1$ ，存在正交阵 T 使得

$$T^T A T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

即其正交相似标准型为旋转变换

旋转轴为特征值 1 对应特征向量的所在直线

旋转角有 $\cos\theta = \frac{\text{tr}(A)-1}{2}$ （由 A 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 相似立得）

对本题来说

$\lambda_1 = 1$ 对应特征向量为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

旋转轴为直线 $l: \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} t$ 这里 $t \in \mathbb{R}$

旋转角为 $\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$

五. 设 \mathcal{A} 是有限维欧式空间 V 上的线性变换。证明：

$$V = \text{Im}\mathcal{A} \oplus \text{Ker}\mathcal{A}$$

证：本题题目有误，反例可以由 23 年期末第三题给出

如： $\mathcal{A}: x \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x. x \in \mathbb{R}^2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Im}\mathcal{A}$ 且 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{ker}\mathcal{A}$ ，因为 $\mathcal{A}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

则 $\text{Im}\mathcal{A} + \text{ker}\mathcal{A}$ 不是直和

六. 设 A, B 为同阶实对称方阵，且 $A \geq B \geq 0$ （即 $A \geq 0, B \geq 0$ 且 $B - A \geq 0$ ）

证明： $\sqrt{A} \geq \sqrt{B}$

证：（本题解法来自 wxy 助教习题课讲义）

证法 1： $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ 仍然是对称阵，有正交相似标准型，即存在正交矩阵 P ，使得

$$P^T(\sqrt{A} - \sqrt{B})P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

设 $P^T\sqrt{A}P = (a_{ij}), P^T\sqrt{B}P = (b_{ij})$. 于是

$$a_{ij} = b_{ij}, i \neq j; a_{ii} - b_{ii} = \lambda_i, 1 \leq i \leq n$$

设

$$C = (c_{ij}) = P^T(A - B)P = (a_{ij})^2 - (b_{ij})^2$$

则 $c_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 - \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 = \lambda_i(a_{ii} + b_{ii})$.

因为 $P^T\sqrt{A}P, P^T\sqrt{B}P \geq 0, C \geq 0$

所以 $a_{ii}, b_{ii} \geq 0, \lambda_i(a_{ii} + b_{ii}) \geq 0, 1 \leq i \leq n$. 如果 $a_{ii} > 0$, 则有 $\lambda_i \geq 0$, 否则 $a_{ii} = b_{ii} = \lambda_i = 0$.

证法 2: 设 $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ 特征值 λ 的特征向量为 α , 则

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})\alpha = \lambda\alpha$$

即 $\sqrt{A}\alpha = (\sqrt{B} + \lambda I)\alpha, (\sqrt{A} - \lambda I)\alpha = \sqrt{B}\alpha$. 左乘转置就可以得到

$$\begin{aligned}\alpha^T(A - B)\alpha &= 2\lambda\alpha^T\sqrt{B}\alpha + \lambda^2\alpha^T\alpha \\ \alpha^T(A - B)\alpha &= 2\lambda\alpha^T\sqrt{A}\alpha - \lambda^2\alpha^T\alpha\end{aligned}$$

因此有

$$\alpha^T(A - B)\alpha = \lambda\alpha^T(\sqrt{A} + \sqrt{B})\alpha$$

如果 $\alpha^T(\sqrt{A} + \sqrt{B})\alpha > 0$, 则有 $\lambda \geq 0$. 否则 $\alpha^T\sqrt{A}\alpha = 0, \alpha^T\sqrt{B}\alpha = 0$. 根据定义也有 $\alpha^TA\alpha = 0, \alpha^TB\alpha = 0$. 由上式可以得到 $\lambda = 0$. 综上所述 $\lambda \geq 0$.

证法 3: 设有相合规范型 $P^T(\sqrt{A} + \sqrt{B})P = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$P^T\sqrt{A}P = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}, P^T\sqrt{B}P = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$$

则

$$A_1 + B_1 = I, A_2 + B_2 = A_3 + B_3 = 0 = A_4 + B_4$$

因为 A_4, B_4 半正定, 所以 $A_4 = B_4 = 0$. 再根据 22-23 期末第五题可以得到, $A_2 = A_3 = B_2 = B_3 = 0$. 存在 r 阶正交矩阵 P_1 , 使得 $P_1^T A_1 P_1 = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$, 取 $P_2 = P \text{diag}(P_1, I_{n-r})$, 有

$$P_2^T \sqrt{A} P_2 = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0), P_2^T \sqrt{B} P_2 = \text{diag}(1 - \lambda_1, \dots, 1 - \lambda_r, 0)$$

所以

$$P_2^T(\sqrt{A} - \sqrt{B})P_2 = \text{diag}(2\lambda_1 - 1, \dots, 2\lambda_r - 1, 0)$$

设 $C = \sqrt{A} + \sqrt{B}$,

$$\begin{aligned} P_2^T(A - B)P_2 &= P_2^T(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B})P_2 + P_2^T(\sqrt{B}\sqrt{A} - \sqrt{A}\sqrt{B})P_2 \\ &= \text{diag}(2\lambda_1 - 1, \dots, 2\lambda_r - 1, 0)P_2^{-1}P_2^{-T}\text{diag}(I_r, 0) \\ &\quad + P_2^T(\sqrt{B}\sqrt{A} - \sqrt{A}\sqrt{B})P_2 \end{aligned}$$

第二个式子是反对称矩阵, 所以对角元素为 0. $P_2^{-1}P_2^{-T}$ 是正定矩阵, 所以对角元素大于 0 , 根据 $A - B$ 是半正定的, 所以上式对角元素

$$2\lambda_i - 1 \geq 0$$

因此 $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ 是半正定矩阵.