

기본량과 단위

숫자 '5'만으로는 아무것도 말하지 못한다 — 5초인지, 5 m인지, 5 kg인지.

단위는 자연을 기술하는 과학의 문법이다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 NOW 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 단위 하나 헛갈렸다고 우주선이 정말 추락했을까? **개념 1**
- 세상 모든 물리량의 '기본 재료'는 몇 가지일까? **개념 2**
- 속도의 단위 m/s는 어디서 왔을까? **개념 3**
- 나노 기술의 '나노'는 얼마나 작은 걸까? **개념 4**
- 일기 예보의 25 °C는 켈빈으로 몇 K일까? **개념 5**

"자연 상수로 세운 단위는 모든 시대, 모든 문명에게 그 의미를 유지할 것이다." — 막스 플랑크, 자연 단위를 제안하며 (1899)

02 기본량과 단위

성취기준 10통과1-01-02

기본량의 의미 → 단위의 의미와 적용 사례

1 숫자만으로는 부족하다 — 단위의 힘

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 **m**인지 3 **km**인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 추진기를 분사한 효과(힘 × 시간) 데이터를 한 팀은 **야드파운드법 단위(파운드힘·초)**로 넘겼는데, 다른 팀은 이를 **미터법 단위(뉴턴·초)**로 받아 계산한 것이 원인이었다 — 숫자는 맞았지만 단위가 달랐고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다. 탐사선 한 대를 통째로 잃은 교훈: **단위는 과학의 문법이다.**

1999년, 화성 기후 궤도선

뉴턴 기준

≠

파운드힘 기준

지상 관제팀

소프트웨어팀

숫자는 맞았다 — 단위가 달랐다

측정값 = 수치 + 단위

5.0

+

m/s

'기준(단위)의 몇 배(수치)인가'를 함께 말해야
측정이 비로소 소통이 된다

단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 — 단위는 선택이 아니라 문법이다

그림 1 | 단위의 힘 — 수치와 단위는 한 몸이다

박찬
샘

"시험 답안에 단위 빼먹고 감점당한 적 있지? NASA도 당했다. '수치 + 단위'는 붙여 다니는 한 단어라고 생각해라."

● 날개 노트

물리량

길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

미터법과 야드파운드법

세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

● 한눈에 암기

측정값 = 수치 + 단위

단위 없는 숫자는


과학이 아니다!

2 자연의 알파벳 — 국제단위계의 기본량 7가지

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 **가장 기본이 되는 재료**를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. 국제단위계(SI)는 **길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)**의 7가지를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낫익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — **세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 조합으로 표현되기 때문이다**. 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.

국제단위계(SI)의 기본량 7가지 — 자연을 쓰는 알파벳



일곱을 곱하고 나누면 → 속도 m/s · 밀도 kg/m^3 · 힘 N — 모든 물리량이 나온다

기본량 7가지 = 길이 · 질량 · 시간 · 전류 · 온도 · 물질량 · 광도

그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 일곱 개면 자연을 다 쓴다

! 시험엔 이렇게

"다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에서는 속도·부피·밀도·힘이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 kg이라는 점도 단골 함정.

박찬
샘

"일곱 개 암기는 단위로 — ' $m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$ '를 리듬 붙여 열 번만 소리 내 읽어라. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다."

● 날개 노트

국제단위계(SI)

전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다.

기본량의 정의

2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

● 한눈에 암기

$m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$
기본량은 딱 7개!
질량은 g 아니고 kg!

✓ 바로바로 체크

- 1 국제단위계의 기본량은 7가지이다. (O , X)
- 2 질량의 SI 기본단위는 g이다. (O , X)
- 3 속도는 SI 기본량 중 하나이다. (O , X)

(하루하루 익히기) X E (하루하루) X Z O I 리용

3 조합의 기술 — 유도량과 유도단위

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양이 유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 m^3 , 밀도는 질량을 부피로 나눠 kg/m^3 가 된다. **단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다** — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 $kg \cdot m/s$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 $kg \cdot m/s^2$ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

화학에서 쓰는 **농도**도 유도량이다. 농도는 용액에 녹아 있는 용질의 양을 용액의 양으로 나눈 값(용질의 양 $\div$ 용액의 양)이라 g/L, 혈액 검사의 mg/dL 같은 단위가 붙는다. 밀도와 같은 '질량 $\div$ 부피' 꼴이지만, 밀도는 물질 전체의 질량을, 농도는 **녹아 있는 용질의 질량만** 센다는 점이 다르다.



이름 붙은 유도단위 — 힘 $N = kg \cdot m/s^2$ · 운동량 $kg \cdot m/s$ (III단원 예고!)

유도량의 단위는 정의의 요약본 — 단위를 읽으면 만든 방법이 보인다

그림 3 | 유도량 — 기본량을 곱하고 나누어 만드는 새 물리량(농도도 유도량이다)

알짜 정리 ① — 기본량과 유도량

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7가지: 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합: 속도 m/s, 부피 m^3 , 밀도 kg/m^3 , 농도 g/L, 힘 $N (= kg \cdot m/s^2)$

✓ 바로바로 체크

- 1 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다. (O , X)
- 2 밀도는 기본량이다. (O , X)
- 3 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다. (O , X)

(c/s/m·kg) O E (5000 m/s² ÷ 1000) X Z (2000 ÷ 1000) O I 1000

● 날개 노트

이름 붙은 유도단위

힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 계산법

공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

농도의 단위

$g/L \cdot mg/dL$ = 용질의 질량 $\div$ 용액의 부피. 질량 백분율(%)은 같은 단위끼리 나눈 비율이라 단위가 없다.


● 한눈에 암기

유도량 = 기본량의 조합
속도 m/s, 밀도 kg/m^3
단위가 곧 정의!

4 크기의 옷 — 접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 **나노**(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 **이름을 붙인 것**이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 $2 \mu\text{m}$ 로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '나노 기술'이라는 이름 자체가 **10^{-9} m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술**이라는 뜻이다. 앞으로 II단원에서 만날 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.



접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름 — n(10^{-9}) μ (10^{-6}) m(10^{-3}) k(10^3) M(10^6) G(10^9)

그림 4 | 접두어의 사다리 — 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

! 시험엔 이렇게

환산 문제의 급소는 **지수 부호** — 1 nm = 10^{-9} m이지, 10^9 m가 아니다. "2 μm = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로: 2×10^{-6} m. 끝.

박찬
샘

"의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유 — mg와 μg 은 접두어 한 칸, 곧 1000배 차이다. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다."

✓ 바로바로 체크

- 1 km는 1000 m이다. (O , X)
- 1 nm는 10^9 m이다. (O , X)
- 세균의 크기는 마이크로미터(μm) 단위로 나타내면 편리하다. (O , X)

(유허 2 5 5 공곤) 0 8 (6 -01) X Z O 1 5 5

● 날개 노트

나노 기술

10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg

의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

● 한눈에 암기

n → μ → m → (기준) →


k → M → G

한 칸 = 1000배!

5 단위는 생활 속에서 일한다

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — **일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.**

생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다. 기온의 °C(섭씨도)는 기본단위 K(켈빈)에서 만든 **SI 유도단위**다. 두 온도는 $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ 의 관계여서, 출발점만 다르고 눈금 한 칸의 크기는 같다(1 °C 차이 = 1 K 차이). 부피의 L(리터)는 SI는 아니지만 SI와 함께 쓰도록 허용된 단위(1 L = 10⁻³ m³)이고, 식품의 kcal는 SI가 아닌 단위라 J로 환산해 쓴다. 생활 단위가 편리해서 남아 있어도, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. 국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다.** 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, 측정 표준이다.



속도위반도, 약효도, 영양도, 요금도 — 일상의 판정 기준은 전부 단위 위에 서 있다

그림 5 | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

● 날개 노트

섭씨와 켈빈

$T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ — 보통 273으로 어렵한다. 0 °C ≈ 273 K, 0 K = -273.15 °C. 온도 차이 1 °C = 1 K.

생활 단위 3분류

°C = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI 단위(J로 환산)

kWh

일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

● 한눈에 암기

일상 = 단위의 세계
기준은 언제나 SI!
같은 자 = 통하는 세계

알짜 정리 ② — 기본량과 단위 한 장 요약

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 / 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)는 자연의 알파벳
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합(m/s, m³, kg/m³, N) / 접두어 = 크기의 옷(n·μ·m·k·M·G)
- ✓ °C는 SI 유도단위($T = t + 273.15$), L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI — 모두 SI로 환산되어 같은 자로 통한다

✓ 바로바로 체크

- 1 도로 표지판의 속도 단위는 km/h이다. (O , X)
- 2 °C와 kcal는 SI 기본단위이다. (O , X)
- 3 전 세계가 같은 단위 체계를 쓰면 과학과 무역에 유리하다. (O , X)

0 8 (SI)라 적어 '킬로그램 IS 극조. — X 킬로그램(L) X Z O I 리용

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

단위가 다르면 우주선이 떨어진다

자료

1999년 9월, NASA의 화성 기후 궤도선이 화성 궤도 진입 중 실종되었다. 사고 조사 보고서(NASA, 1999)의 요지: 탐사선의 자세를 잡으려고 추진기를 분사할 때마다 생기는 충격량(힘 $\times$ 시간) 데이터를 **소프트웨어팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)**로 산출했고, **항법팀은 이를 미터법 단위(뉴턴·초)**로 받아 계산했다. 1 파운드힘 $\approx$ 4.45 뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 실제의 약 1/4.45로 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.



그림 | 사고의 구조 — 숫자는 정확했지만 단위의 약속이 어긋났다

해석의 3단계

1. 무엇이 틀렸는가 — 수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, **단위의 약속**이었다. '측정값 = 수치 + 단위'에서 단위 쪽이 무너지면 수치가 아무리 정확해도 소용없다.
2. 왜 눈치채지 못했는가 — 두 단위의 비율이 4.45배로, 언뜻 보면 그럴듯한 크기의 숫자가 오간다. 0이 몇 개씩 차이나는 실수와 달리, **단위 혼동은 티가 잘 나지 않는다** — 그래서 더 위험하다.
3. 무엇이 재발을 막는가 — 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것. 국제단위계(SI)라는 공용어가 존재하는 이유가 이 사고 하나로 요약된다.

결론

단위는 형식이 아니라 안전장치다. 숫자에 단위를 붙이는 습관은 시험 감점을 막는 기술이 아니라, **탐사선 한 대를 통째로 잃는 실수를 막는 과학의 기본기**다.

! 시험엔 이렇게

이 사례는 "**단위(측정 표준)가 왜 필요한가**"의 근거 자료로 출제된다 — 03의 측정 표준과 이어지는 징검다리. "계산 실수가 원인이다"(X — 단위 혼동이 원인) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 단위 환산 3종

야드파운드법은 지금도 스포츠 중계·항공·해외 일기 예보에 남아 있다. 환산 관계를 써서 SI 쪽으로 바꿔 보자.

1. 투수의 공 95 마일/h $\rightarrow$ km/h (1 마일 $\approx$ 1.61 km) 답 약 153 km/h
2. 여객기 순항 고도 35000 ft $\rightarrow$ km (1 ft = 0.3048 m) 답 약 10.7 km
3. 해외 일기 예보 86 $^{\circ}$ F $\rightarrow$ $^{\circ}$ C ($t_{^{\circ}\text{C}} = (t_{^{\circ}\text{F}} - 32) \times 5/9$) 답 30 $^{\circ}$ C $\approx$ 303 K

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 측정값은 단위 없이 수치만 적어도 충분하다. (O , X)
- ② 부피와 밀도는 기본량을 조합해 만든 유도량이다. (O , X)
- ③ 1 nm는 10^{-9} m이다. (O , X)
- ④ 국제단위계(SI)의 기본량은 모두 ____가지이다.
- ⑤ 기본량의 조합으로 정의되는 물리량을 ____이라 한다.
- ⑥ 시간의 SI 기본단위는 ____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 국제단위계(SI)의 기본량과 기본단위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 2

- ① 질량 — g
 ② 온도 — $^{\circ}\text{C}$
 ③ 속도 — m/s
 ④ 부피 — m^3
 ⑤ 물질량 — mol

- ⑧ 유도량과 그 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

- ① 밀도의 단위 kg/m^3 는 kg과 m를 조합한 것이다.
 ② 유도량은 기본량과 관계없이 따로 정의된다.
 ③ 속도는 기본량이므로 m/s는 기본단위이다.
 ④ 힘의 단위 N은 기본단위로 풀어 쓸 수 없다.
 ⑤ 부피는 기본량이므로 m^3 는 기본단위이다.

- ⑨ 온도의 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 2·5

- ① 온도의 SI 기본단위는 $^{\circ}\text{C}$ 이다.
 ② 25°C 를 켈빈 온도로 나타내면 약 298 K이다.
 ③ 섭씨온도가 1°C 오르면 켈빈 온도는 273 K 오른다.
 ④ 0 K와 0°C 는 같은 온도이다.
 ⑤ $^{\circ}\text{C}$ 는 SI 단위로 바꿀 수 없는 비SI 단위이다.

- ⑩ 단위의 쓰임에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 1·5

보기

- ㄱ. 화성 기후 궤도선은 단위 혼동으로 실종되었다.
 ㄴ. 처방전의 약 용량은 흔히 mg 단위로 나타낸다.
 ㄷ. $^{\circ}\text{C}$ 는 국제단위계의 기본단위이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑪ **중요** **자료** 표는 물리량 (가), (나)의 정의이다. (가), (나)의 SI 단위를 순서대로 옳게 나타낸 것은? ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

물리량	정의
(가) 넓이	길이 × 길이
(나) 가속도	속도의 변화량 ÷ 걸린 시간

- ① m^2 , m/s ② m^2 , m/s^2 ③ m^3 , m/s^2
 ④ m^3 , m/s ⑤ m, m·s

- 12 **중요** **자료** 그림은 여러 물리량을 두 가지 질문에 따라 A~C로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. 속도는 A에 속한다.
 ㄴ. B에 속하는 물리량은 질량 하나뿐이다.
 ㄷ. C에 속하는 물리량은 6가지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 힘의 단위 N에 대한 학생 A, B, C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

학생 A : N은 과학자 뉴턴의 이름을 붙였으니 SI 기본단위 중 하나야.
학생 B : N을 기본단위로 풀어 쓰면 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 이야.
학생 C : 운동량의 단위 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$ 처럼, 유도량의 단위를 보면 그 양을 어떻게 정의했는지 알 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **탐구** 다음은 나무토막의 밀도를 구하는 활동이다.

[과정] (가) 자로 정육면체 모양 나무토막의 한 모서리 길이를 잰다.

(나) 전자저울로 나무토막의 질량을 잰다.

(다) 밀도 = 질량 ÷ 부피로 밀도를 구한다.

[결과] 한 모서리 길이: 0.1 m, 질량: 0.6 kg

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3·4

보 기

ㄱ. 나무토막의 부피는 0.3 m^3 이다.
 ㄴ. 나무토막의 밀도는 $600 \text{ kg}/\text{m}^3$ 이다.
 ㄷ. 질량을 g 단위로 바꾸어 밀도를 g/m^3 로 나타내면, 수치는 ㄴ의 1000배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4

A	B	C
반도체 회로 선폭	세균의 크기	알약 한 알의 질량
5 nm	2 μm	500 mg

보 기

ㄱ. B는 A의 400배이다.
 ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg 이다.
 ㄷ. A를 m 단위로 나타내면 $5 \times 10^9 \text{ m}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림 (가)~(라)는 생활 속에서 단위가 쓰인 예이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 5



- ① (다)의 kWh($\text{kW} \times \text{h}$)는 에너지의 단위이다.
 ② (가)의 km/h는 기본량의 단위이다.
 ③ (나)의 mg에서 m은 10^3 배를 뜻한다.
 ④ (라)의 °C는 SI 단위로 환산할 수 없다.
 ⑤ (가)~(라)의 단위는 모두 SI 기본단위이다.

- 17 **중요** **자료** 다음은 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료이다.

[자료] 소프트웨어팀은 추진기 분사의 충격량(힘 $\times$ 시간)을 파운드힘·초 단위로 계산해 수치 2만 넘겼고, 항법팀은 이 수치를 뉴턴·초 단위로 받아 2 N·s로 계산했다. (단, 1 파운드힘 $\approx 4.45 \text{ N}$)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 1, 자료 파헤치기

보 기
ㄱ. 실제 충격량은 약 8.9 N·s였다.
ㄴ. 항법팀은 충격량을 실제보다 작게 계산했다.
ㄷ. 사고의 원인은 두 팀의 계산 실수이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 측정값에 수치와 함께 단위를 꼭 써야 하는 까닭을 화성 기후 궤도선 사고를 예로 들어 '약속', '수치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-01-02 | 개념 1

- 19 **중요** **서술형** '거리 = 속력 $\div$ 시간'이라는 식이 틀렸음을 '양변', '단위', 'm/s'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 3

- 20 **서술형** 처방전의 '500 mg'을 '500 μg '으로 잘못 읽고 약을 준비하면 어떤 문제가 생기는지 '접두어', '1000배'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-01-02 | 개념 4·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 소금물 A, B의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4

소금물	녹인 소금	용액의 부피	용액의 질량
A	10 g	100 mL	107 g
B	20 g	100 mL	113 g


보 기

- ㄱ. 소금물의 농도(g/L)는 B가 A의 2배이다.
 ㄴ. A의 밀도는 $1.07 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 이다.
 ㄷ. B를 200 mL로 묽히면 농도는 400 g/L이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 접두어를 10의 거듭제곱 축 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 4




보 기

- ㄱ. 1 mm는 1 km의 10^6 배이다.
 ㄴ. 나노 기술은 10^{-9} m 규모를 다루는 기술이다.
 ㄷ. 1 GB는 1 kB의 10^6 배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 물질 A, B의 부피에 따른 질량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4



보 기

- ㄱ. A의 밀도는 $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 이다.
 ㄴ. 그래프 기울기의 단위는 kg/m^3 이다.
 ㄷ. 질량이 4 kg일 때 부피는 B가 A의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** (가)는 SI 기본단위 두 가지의 정의이고, (나)는 레이저로 목표물까지의 거리를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 2·3·4 (01 소단원 연계)

(가)

1 s	세슘-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 시간
1 m	빛이 진공에서 1/299 792 458 s 동안 나아간 거리

(나)



보 기

- ㄱ. 1 m는 다른 기본단위 없이 정의된다.
 ㄴ. (나)에서 목표물까지의 거리는 600 m이다.
 ㄷ. 빛의 속력의 단위 m/s는 (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	7	유도량	s(초)	⑤	①	②	③	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	④	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	④	⑤	②

1 X 개념 1
측정값 = 수치 + 단위. 단위 없는 숫자는 소통 불능이다 — 화성 궤도선이 증거.

2 O 개념 2·3
부피(m^3)·밀도(kg/m^3)는 기본량의 조합 — 유도량이 맞다. 기본량은 7가지뿐.

3 O 개념 4
나노(n) = 10^{-9} . 지수 부호까지가 정답이다.

4 7 개념 2
 $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ — 딱 일곱.

5 유도량 개념 3
기본량을 곱하고 나눠 만드는 양. 단위가 정의를 보여 준다.

6 s(초) 개념 2
시간의 기본단위는 초 — 세슘 원자의 진동으로 정의된다(01 복습).

7 ⑤ 개념 2
물질량의 기본단위는 mol — 기본량·기본단위의 짝 그대로다.

바로알기

① 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이다. ② 온도의 기본단위는 **K**이다($^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 SI 유도단위). ③ 속도는 유도량이고, m/s 는 유도단위이다. ④ 부피는 유도량이고, m^3 는 유도단위이다.

8 ① 개념 3
밀도 = 질량 ÷ 부피 → $\text{kg} \div \text{m}^3 = \text{kg}/\text{m}^3$. 질량(kg)과 길이(m)의 기본단위로 만든 유도단위다.

바로알기

② 유도량은 기본량을 곱하고 나누어(조합하여) 정의한다. ③ 속도는 길이 ÷ 시간으로 만든 유도량이고, m/s 는 유도단위이다. ④ N은 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 으로 풀어 쓸 수 있다. ⑤ 부피는 길이를 세 번 곱한 유도량이고, m^3 는 유도단위이다.

9 ② 개념 2·5
 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15 \rightarrow 25 + 273.15 = 298.15 \approx 298 \text{ K}$.

바로알기

① 온도의 SI 기본단위는 **K**이다. ③ $^{\circ}\text{C}$ 와 K는 눈금 한 칸이 같다 — 1°C 오르면 **1 K** 오른다. ④ $0 \text{ K} = -273.15^{\circ}\text{C}$ 이다. ⑤ $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 **SI 유도단위**이다.

10 ③

개념 1:5

ㄱ (옳음) 수치는 정확했지만 단위가 달랐다 — 보고서의 결론 그대로. ㄴ (옳음) 약 용량은 $\text{mg}(10^{-3} \text{ g})$ 단위로 적는다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 온도의 SI 기본단위는 **K**이다. $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 SI 유도단위이다($T = t + 273.15$).

11 ②

개념 3

정의를 단위로 그대로 옮긴다. (가) 넓이 = 길이 $\times$ 길이 $\rightarrow m \times m = m^2$. (나) 가속도 = 속도의 변화량 $\div$ 시간 $\rightarrow (m/s) \div s = m/s^2$.


바로알기

①·④ m/s 는 속도의 단위다 — (나)는 이것을 다시 시간(s)으로 나누므로 m/s^2 이다. ③·④ m^3 는 길이를 세 번 곱한 부피의 단위다 — 넓이는 m^2 이다. ⑤ 넓이는 m^2 이고, 시간으로 나누는 양은 곱($m \cdot s$)이 아니라 몫(m/s^2)이다.

12 ⑤

개념 2:3

ㄱ (옳음) 속도는 길이 $\div$ 시간 — 기본량이 아니므로 A.
ㄴ (옳음) 일곱 기본단위 중 접두어(k)가 붙은 것은 kg 하나뿐 — B는 질량. ㄷ (옳음) 나머지 $m \cdot s \cdot A \cdot K \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ 의 6가지가 C이다.



함정 체크

질량의 기본단위는 g이 아니라 kg — 일곱 기본단위 가운데 접두어가 붙은 유일한 단위다.

13 ④

개념 3

B (옳음) $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$. C (옳음) 운동량 = 질량 $\times$ 속도 $\rightarrow \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$. 단위는 정의의 요약본이다.

바로알기

A (틀림 →) N은 뉴턴의 이름을 붙인 **유도단위**의 별명이다. 정체는 기본단위의 조합($\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$)이고, 기본단위는 $m \cdot \text{kg} \cdot s \cdot A \cdot K \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ 의 7개뿐이다.

14 ④

개념 3:4 | 탐구

ㄴ (옳음) 부피 = $0.1 \text{ m} \times 0.1 \text{ m} \times 0.1 \text{ m} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 밀도 = $0.6 \text{ kg} \div (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 600 \text{ kg}/\text{m}^3$. ㄷ (옳음) $0.6 \text{ kg} = 600 \text{ g} \rightarrow 600 \text{ g} \div (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 6 \times 10^5 \text{ g}/\text{m}^3$ (600의 1000배). 같은 양도 단위가 바뀌면 수치가 바뀐다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 부피는 길이를 세 번 곱한다: $0.1^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 이다(0.1×3 이 아니다).

15 ①

개념 4

ㄱ (옳음) $B \div A = (2 \times 10^{-6}) \div (5 \times 10^{-9}) = 0.4 \times 10^3 = 400$ 배.

바로알기

ㄴ (틀림 →) $500 \text{ mg} = 500 \times 10^{-3} \text{ g} = 0.5 \text{ g} = 5 \times 10^{-4} \text{ kg}$ 이다. ㄷ (틀림 →) $5 \text{ nm} = 5 \times 10^{-9} \text{ m}$ 이다 — 나노는 작아지는 접두어다.

16 ①

개념 5

$\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h}$ — 일률에 시간을 곱한 에너지의 단위. 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

바로알기

② km/h 는 거리 ÷ 시간, 곧 속도(유도량)의 단위이다. ③ 밀리(m)는 10^{-3} 배를 뜻한다. ④ $^{\circ}\text{C}$ 는 그 자체가 SI 유도단위이고 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 로 바로 환산된다($25^{\circ}\text{C} \approx 298 \text{ K}$). ⑤ $\text{km/h} \cdot \text{mg} \cdot \text{kWh} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 는 모두 SI 기본단위가 아니다.

17 ③

개념 1 | 자료 파헤치기

ㄱ (옳음) 실제 충격량 = 2 파운드힘·초 $\approx 2 \times 4.45 \text{ N} \cdot \text{s} = 8.9 \text{ N} \cdot \text{s}$. ㄴ (옳음) 항법팀은 $2 \text{ N} \cdot \text{s}$ 로 계산했다 — 실제 ($8.9 \text{ N} \cdot \text{s}$)의 약 1/4.45로 작게 잡았다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 두 팀의 수치 계산은 정확했다. 사고의 원인은 단위의 약속이 어긋난 것(단위 혼동)이다.

18 모범 답안

개념 1

단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정한 **약속**이다. 화성기후 궤도선 사고에서 두 팀은 같은 수치를 주고받았지만, 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 해석해 추진기 데이터가 어긋났고 탐사선을 잃었다. 단위가 빠지거나 어긋나면 수치는 의미를 잃으므로 측정값에는 반드시 단위를 함께 써야 한다.

채점 요소	배점
① 단위는 기준에 대한 약속이라고 썼다.	2점
② 사고의 원인이 수치가 아니라 단위의 불일치라고 썼다.	2점
③ 그래서 수치와 단위를 함께 써야 한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"계산 실수로 숫자가 틀렸기 때문이다." — 수치는 정확했다. 어긋난 것은 단위다.

19 모범 답안

개념 3

식이 옳다면 양변의 단위가 같아야 한다. 좌변(거리)의 단위는 m인데, 우변은 $\text{속력}(\text{m/s}) \div \text{시간}(\text{s}) = \text{m/s}^2$ 이 되어 양변의 단위가 다르므로 틀린 식이다. 옳은 식은 거리 = 속력 × 시간으로, $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ 이 되어 단위가 맞는다.

채점 요소	배점
① 좌변(거리)의 단위가 m임을 썼다.	2점
② 우변의 단위가 $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ 임을 썼다.	2점
③ 양변의 단위가 달라 틀린 식이라고 결론지었다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"공식을 외운 것과 다르기 때문이다." — 단위를 비교하지 않으면 근거가 없다.

20 모범 답안

개념 4·5

밀리(m)는 10^{-3} , 마이크로(μ)는 10^{-6} 이므로 **접두어** 한 칸 차이로 양이 **1000배** 달라진다. $500\ \mu\text{g}$ 은 $500\ \text{mg}$ 의 $1/1000$ 이므로, 필요한 약의 $1/1000$ 만 준비하게 되어 약효를 기대할 수 없다. 그래서 처방전의 단위는 반드시 확인해야 한다.

채점 요소	배점
① $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$ (접두어 한 칸)임을 썼다.	2점
② 두 양이 1000배 차이 난다고 썼다.	2점
③ 필요한 양보다 훨씬 적게($1/1000$) 준비하게 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"약이 1000배 많아져 위험하다." — μg 이 mg 보다 작은 단위이므로 양은 $1/1000$ 로 줄어든다.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 농도 = 용질 ÷ 용액: A $10\ \text{g} \div 0.1\ \text{L} = 100\ \text{g/L}$, B $20\ \text{g} \div 0.1\ \text{L} = 200\ \text{g/L} \rightarrow 2$ 배. ㄴ (옳음) 밀도 = 용액 전체 질량 ÷ 부피 = $107\ \text{g} \div 100\ \text{mL} = 1.07\ \text{g/mL} = 1.07 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$.

바로알기

ㄷ (틀림 $\rightarrow$) 물을 더해 묽혀도 용질은 $20\ \text{g}$ 그대로다. $20\ \text{g} \div 0.2\ \text{L} = 100\ \text{g/L}$ — 부피가 2배가 되면 농도는 절반이 된다. 농도는 용질만, 밀도는 용액 전체의 질량을 센다.

22 ④

개념 4 | 2점

ㄴ (옳음) 나노 = 10^{-9} — 이름이 곧 규모다. ㄷ (옳음) $G(10^9) \div k(10^3) = 10^{9-3} = 10^6$ 배.

바로알기


ㄱ (틀림 $\rightarrow$) $10^{-3} \div 10^3 = 10^{-6}$ — $1\ \text{mm}$ 는 $1\ \text{km}$ 의 10^{-6} 배이다($1\ \text{km}$ 가 $1\ \text{mm}$ 의 10^6 배).

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A: $8\ \text{kg} \div (4 \times 10^{-3}\ \text{m}^3) = 2 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$. ㄴ (옳음) 기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도 $\rightarrow \text{kg/m}^3$. ㄷ (옳음) $4\ \text{kg}$ 일 때 A는 $2 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$, B는 $4 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$ — B가 2배.

품평 자료 분석



기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도
A: $8 \div (4 \times 10^{-3}) = 2 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$
4 kg일 때 부피: A 2, B 4 $\rightarrow$ B가 A의 2배

합정 체크

부피 축의 ' $\times 10^{-3}\ \text{m}^3$ '를 빼먹고 $8 \div 4 = 2\ \text{kg/m}^3$ 로 읽으면 ㄱ을 놓친다. 축의 단위까지 읽는 것이 자료 해석이다.

24 ②

개념 2·3·4 | 2.5점

ㄷ (옳음) $\text{m/s} = \text{길이(m)} \div \text{시간(s)}$ — (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위다.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) $1\ \text{m}$ 의 정의에는 시간의 기본단위 s 가 쓰인다 — 길이의 기준이 시간의 기준에 기대고 있다. ㄴ (틀림 $\rightarrow$) $2\ \mu\text{s}$ 는 왕복 시간이므로 편도는 $1 \times 10^{-6}\ \text{s}$. 거리 = $3 \times 10^8\ \text{m/s} \times 1 \times 10^{-6}\ \text{s} = 300\ \text{m}$ 이다($600\ \text{m}$ 는 왕복 거리).

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위는 약속이자 안전장치 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7: $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ / 유도량 = 조합 (m/s , kg/m^3 , $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$)
- ✓ 접두어: $n(10^{-9})$ $\mu(10^{-6})$ $m(10^{-3})$ $k(10^3)$ $M(10^6)$ $G(10^9)$ — 비교는 지수 뺄셈

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. SI 기본량 7가지의 기본단위를 모두 쓰면?
2. 밀도의 단위 kg/m^3 는 어떤 정의에서 나왔나?
3. 물이 어는 0°C 는 몇 K인가? $^\circ\text{C}$ 는 SI의 어떤 단위인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

$1 \text{ m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cd}^{-1} = 273 \text{ K} (273.15), \text{SI}$

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"기본량 7가지를 단위와 짝지어 소리 내어 말해 보자. 하나라도 막히면 28쪽으로! — 박찬샘"