

측정과 어림, 측정 표준

정확히 재는 기술과 대충 헤아리는 지혜 — 과학은 둘 다 쓴다.

그리고 그 모든 재기의 바닥에는 '모두의 자', 측정 표준이 깔려 있다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 완료 ✓ 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 NOW 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 측정과 어림 — 언제 재고, 언제 헤아릴까? 개념 1·2
- 내 체중계와 병원 체중계, 누가 맞을까? 개념 3
- 1 kg의 기준은 왜 금속 원기에서 자연 상수로 바뀌었을까? 개념 4
- 시력 1.0, 혈압 120 — 이 숫자들은 누가 정했을까? 개념 5
- 공복 혈당 126, 초미세먼지 75 — 기준값은 어떻게 판단을 만들까? 교과서 탐구

"측정하여 숫자로 표현할 수 없다면, 당신의 지식은 빈약하고 불만족스러운 것이다." — 윌리엄 톰슨(켈빈 경)

03 측정과 어림, 측정 표준



성취기준 10통과1-01-03

측정·어림의 의미 → 측정 표준의 유용성·필요성

1 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙인다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 **수치와 단위로 나타내는 활동**, 곧 재려는 양이 **기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일**이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다**. 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 **더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정으로 줄일 수는 있다**. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.



측정 = 물리량을 수치 + 단위로 — 오차는 피할 수 없지만 줄일 수는 있다

그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간, 오차도 함께 태어난다

박찬샘

"실험 시간에 세 번 재서 평균 내라고 하는 게 귀찮은 형식이 아니었다 — 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다."

● 날개 노트

오차

참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

정밀도

같은 양을 얼마나 작은 눈금까지 가려 재는가. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

● 한눈에 암기


측정 = 기준과 비교
오차는 0이 안 된다
반복·평균으로 줄인다!

2 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 **대략적으로 헤아리는 것**이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 **빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게** 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 **말이 되는 값인지** **검산**하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 잴 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다(복도 길이는 줄자로 m 단위, 종이 두께는 버니어 캘리퍼스로 mm 단위).

어림의 기술 — 쪼개서, 대입하고, 곱한다 (교실 안 공기의 질량은?)



교실 공기가 어른 네 명 몸무게보다 무겁다 — 어림은 이런 '뜻밖의 규모'를 드러낸다

어림 = 쪼개기 → 대입 → 곱하기. 목표는 정답이 아니라 '자릿수(규모)'다

그림 2 | 어림의 3단계 — 교실 공기의 질량도 30초면 헤아린다

! 시험엔 이렇게

측정 vs 어림 구분이 단골 — 도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림. "어림은 부정확하므로 과학에서 쓰지 않는다"(X — 규모 판단·검산·도구 선택에 필수) 선지를 조심.

박찬
샘

"어림꾼의 비밀 상수 세 개 — 공기 밀도 1.2 kg/m^3 , 물 밀도 1000 kg/m^3 , 지구 반지름 약 6400 km . 이 셋만 외워도 웬만한 페르미 문제는 푼다."

✓ 바로바로 체크

- 1 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 것이 측정이다. (O, X)
- 2 어림은 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이다. (O, X)
- 3 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다. (O, X)

(과학의 기초 100문 100답 100선) X E O Z O I 100

● 날개 노트

페르미 추정

큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.

어림이 유용한 순간

정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때.

에라토스테네스

기원전 3세기, 두 도시의 한낮 그림자 각도 차(약 7.2° , 원의 $1/50$)와 두 도시 사이 거리로 지구 둘레를 어림했다 — 어림과 측정이 만나 새 지식이 된 예.

● 한눈에 암기

도구로 재면 측정

머리로 헤아리면 어림

어림의 목표 = 자릿수!

3 모두의 자 - 측정 표준은 왜 필요한가

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 모두가 따르는 측정의 기준, 곧 측정 표준을 정한다. 측정 표준은 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자다. 이를 위해 표준은 네 가지를 함께 정한다 — 무엇으로 나타낼지(측정 단위), 어떻게 잴지(측정 방법), 무엇으로 잴지(측정 도구), 그리고 도구와 방법이 맞는지 확인하는 기준인 표준 물질.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다. 우리나라에서는 한국표준과학연구원(KRISS)이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기가 표준과 일치하는지 **교정**하는 체계를 운영한다. 주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 사회 기반 시설이다.




그림 3 | 측정 표준의 유용성 - 하나의 기준이 사회 전체로 흘러내린다

● 날개 노트

교정

도구의 눈금을 표준과 비교해
바로잡는 일. 병원 혈압계도
정기적으로 교정받는다.

KRISS

한국표준과학연구원 —
대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를
지키는 국가 기관.

표준 물질

성분이나 성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질. 예: 농도를 아는 포도당 용액으로 혈당 측정기를 확인한다.

● 한눈에 암기

표준 = 모두의 자
거래·의료·산업의 바닥!
지키는 곳 = KRISS

알 **알짜 정리 ①** — 측정·어림·표준

- ✓ **측정** = 기준과 비교해 수치+단위로 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기
- ✓ **측정 표준** = 모두의 자 — **단위·방법·도구·표준** 물질을 정해 같은 값 보장
- ✓ **표준의 효과**: **공정한 거래 · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업** (유지 기관: KRISS)

✓ 바로바로 체크

- 1 측정 표준은 누가 언제 재어도 같은 값이 나오게 하는 기준이다. (O , X)
- 2 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다. (O , X)
- 3 우리나라의 측정 표준은 한국표준과학연구원 이 유지한다. (O , X)

정답 102X (거래 금액·규격 불일치가 생긴다) 30

4 물체에서 자연 상수로 — 표준의 진화

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 수십 μg 씩 어긋나는 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 **플랑크 상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 **4개 기본단위가 함께** 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 SI 7개 기본단위 전부가 **값지도 변하지도 않는 자연 상수 위에** 서게 되었다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.




그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 마지막 '물체 표준'이 은퇴한 날

! 시험엔 이렇게

길이·시간·질량 3종 세트로 출제된다 — 미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수. 공통 논리는 늘 같다: 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

박찬
샘

"세브르의 국제도량형국 금고에는 은퇴한 원기가 지금도 있다 — 130년간 세계의 1 kg이던 금속 덩어리가 이제 역사 유물이다."

● 날개 노트

플랑크 상수(h)

양자 물리의 기본 상수.

2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

μg (마이크로그램)

10^{-6} g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

2019년 함께 바뀐 4개

kg ← 플랑크 상수(h) · A ← 기본 전하(e) · K ← 볼츠만 상수(k) · mol ← 아보가드로 상수(N_A). 출처: BIPM.

1 m의 변천

북극~적도 자오선 길이의 1000만분의 1(1790년대) → 미터원기(1889) → 빛이 나아간 거리(1983).

● 한눈에 알기

길이 → 빛

시간 → 세슘

질량 → 플랑크 상수!

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O, X)
- 2 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다. (O, X)
- 3 측정 표준은 점점 자연 상수 기반으로 진화해 왔다. (O, X)


O E (다양한) 측정 표준 (다양한) X Z O I 측정

5 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 220 V는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 1.0은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 120/80은 전 세계 병원이 같은 방식으로 재기로 한 값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — **표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.** 시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 kWh로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 공복 혈당 126 mg/dL 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청).

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다 — 디지털 시대에는 '신호의 표준'(04)까지 무대가 넓어진다.

기준값으로 판단까지 — 수치 + 단위 + 기준값 → 판단



기준: 에어코리아(한국환경공단) 초미세먼지 경보 기준 · 질병관리청 국가건강정보포털 당뇨병 진단 기준 (2026년 확인)

같은 단위·같은 방법으로 재야 기준값과 비교할 수 있다 — **표준이 판단을 만든다**

그림 5 | 기준값으로 판단하는 생활 속 측정 표준 — 수치·단위·기준값이 함께 정해져 있다

● 날개 노트

왜 220 V인가

같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

혈압 측정 표준

앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

● 한눈에 암기

표준 = 비교의 조건
일상 전체가 표준 위!
신호의 표준은 04에서

알짜 정리 ② — 측정과 어림, 측정 표준 한 장 요약

- ✓ 측정 = 도구로 수치+단위 / 어림 = 지식으로 규모 헤아리기 — 상황이 도구를 고른다
- ✓ 측정 표준 = 모두의 자: 거래·의료·산업의 신뢰 기반 (한국: KRISS)
- ✓ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛·세슘·플랑크 상수, 2019년 $\text{kg} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol}$ 재정의)
- ✓ 생활 속 표준: 220 V · 혈압 120/80 · A4 · kWh · $\mu\text{g}/\text{m}^3$ · mg/dL — 비교가 곧 유용성

✓ 바로바로 체크

- 1 우리나라 가정용 전압의 표준은 220 V이다. (O , X)
- 2 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다. (O , X)
- 3 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다. (O , X)

(과학자도 틀릴 수 있는 과학의 기초) X E O Z O I 47

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 어림 실전

자료

학교 수영장의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다면 몇 병이 될까? 자도 계산기도 없이, 어림의 3단계로 해아려 보자. (수영장을 직접 잴 수는 없지만, 우리는 그 규모를 이미 '알고' 있다.)




그림 | 어림의 결과 — 정답은 숫자가 아니라 '백만 병 규모'라는 판단이다

해석의 3단계

1. **쪼개다** — 병의 수 = 수영장 부피 ÷ 병 하나의 부피. 수영장 부피 = 길이 × 폭 × 깊이.
2. **아는 값을 넣는다** — 25 m 수영장: 길이 25 m, 폭 $\approx 15\text{ m}$, 깊이 $\approx 1.5\text{ m}$ → 부피 $\approx 25 \times 15 \times 1.5 \approx 560\text{ m}^3$. 병 하나 = 500 mL = 0.0005 m^3 .
3. **곱한다(나눈다)** — $560 \div 0.0005 \approx 1.1 \times 10^6$. 약 **백만 병**이다. 참값이 80만 병이든 130만 병이든, '백만 병 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다 — 어림의 목표는 이 자릿수다.

결론

어림은 세 걸음의 기술이다 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 그리고 결과는 '10⁶ 규모'처럼 **10의 거듭제곱(01 복습)**으로 말하는 것이 어림다운 보고법이다. 정밀한 측정이 필요해지는 순간(요금 정산, 소독약 투입량)에는 측정으로 넘어가면 된다 — 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

! 시험엔 이렇게

어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성** — ① 문제를 곱셈 구조로 쪼갠는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ 자릿수가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답 처리된다.

직접 해보기 — 나의 페르미 문제

"우리 학교 전교생의 머리카락을 다 이으면 몇 km일까?" — 머리카락 수(약 10만 가닥), 평균 길이, 학생 수로 쪼개서 어림해 보자. 그리고 친구의 어림과 비교해 보라. 대입값이 달라도 자릿수가 같게 나오는 것, 그것이 어림의 힘이다.

교과서 탐구

탐구 활동

생활 속 숫자 뒤의 약속 — 측정 표준 사례 탐색

목적

생활 속 측정 사례에서 측정 표준의 네 요소(단위·방법·도구·표준 물질)를 찾고, 표준이 없을 때의 문제를 설명한다.


준비 · 과정

1. 모듬별로 분야 하나(거래·요금·환경·의료)를 고르고, 그 분야에서 늘 재는 양 하나를 정한다.
2. 단위·도구·측정 방법·판단 기준값·도구 확인 방법을 공공 기관 누리집(KRIS·에어코리아 등)에서 찾는다.
3. 표로 정리하고 기준값을 수직선 위에 나타낸 뒤, '이 표준이 없다면?'을 모듬끼리 토의한다.

결과 (예시 결과 — 기준값은 실제 공개 기준)

분야	측정량(단위)	측정 도구	정해진 방법	판단 기준	맞는지 확인
거래	질량(kg·g)	전자저울	수평에 놓고 영점 맞춘 뒤	표시값 × 단가 = 값	표준 분동·정기 검정
전기 요금	전력량(kWh)	전력량계	이번 달 ~ 지난달 지침	사용량 구간별 요금	계량기 정기 검정
대기 환경	초미세먼지($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	대기 자동 측정소	1시간 평균 농도	75 이상 2시간 → 주의보	측정기 교정
의료	혈당(mg/dL)	혈당 측정기	8시간 이상 공복 후	126 이상 → 당뇨병 진단	농도를 아는 표준 용액

결과 그래프 — 기준값의 자리 (가로축 0~160, 값에 비례)



자료: 에어코리아(한국환경공단) 초미세먼지 예보 등급·경보 기준 · 질병관리청 국가건강정보포털 당뇨병 진단 기준 (2026년 확인)

해석의 3단계

1. 공통점 찾기 — 네 사례 모두 단위·방법·도구가 정해져 있고, 도구가 맞는지 확인하는 기준(표준 분동·표준 용액 같은 표준 물질, 교정·검정)이 있다. 이것이 측정 표준의 네 요소다.
2. 기준값의 역할 — $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ · $126 \text{ mg}/\text{dL}$ 같은 기준값은 주의보·진단처럼 판단을 낳는다. 같은 단위·같은 방법으로 잰 값이어야 기준값과 비교할 수 있다.
3. 표준이 없다면 — 측정소마다 측정기가 다르게 읽으면 같은 공기에도 주의보가 지역마다 달라지고, 혈당 측정기가 다르면 같은 사람의 진단이 병원마다 달라진다. 표준은 판단을 공정하고 믿을 수 있게 만든다.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① 방법 바꾸기 — 식사 직후 혈당을 공복 기준 126으로 판단? → 방법이 달라 그대로 비교할 수 없다.
- ② 조건 빼기 — 한 시각 $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이면 곧 주의보? → 75 이상이 2시간 지속되어야 한다.
- ③ 교정 빼기 — 늘 $20 \text{ mg}/\text{dL}$ 높게 읽는 측정기? → 정상인도 기준을 넘는다. 표준 용액으로 교정한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 측정에는 오차가 따르며, 반복 측정으로 오차를 줄일 수 있다. (O , X)
- ② 소풍에 필요한 물의 양을 경험으로 헤아리는 것은 측정이다. (O , X)
- ③ 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
- ④ 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 측정의 공통 기준을 측정 _____이라 한다.
- ⑤ 참값과 측정값의 차이를 _____라고 한다.
- ⑥ 우리나라의 국가 측정 표준을 유지하는 기관은 한국 _____연구원이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 다음 중 '어림'에 해당하는 활동으로 가장 적절한 것은? ●○○○
10통과1-01-03 | 개념 1·2
 - ① 자로 책상의 가로 길이를 재어 120.5 cm를 얻었다.
 - ② 체중계에 올라가 몸무게 58.2 kg을 읽었다.
 - ③ 인파를 보고 참가자 수를 약 2천 명으로 헤아렸다.
 - ④ 온도계로 물의 온도 36.5 °C를 측정했다.
 - ⑤ 초시계로 100 m 달리기 기록 15.3초를 잰다.

- ⑧ **중요** **탐구** 다음은 막대의 길이를 재는 활동이다.

[과정] (가) 5명이 같은 자로 막대 하나를 잰다.

(나) 다섯 측정값의 평균을 구한다.

[결과] 12.3, 12.5, 12.2, 12.4, 12.6 (단위: cm)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 1, 탐구


보기

- ㄱ. 측정값의 평균은 12.4 cm이다.
 ㄴ. 측정값이 서로 다른 것은 오차 때문이다.
 ㄷ. 정밀한 도구로 여러 번 재면 오차가 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **자료** 그림은 같은 연필의 길이를 눈금 간격이 다른 두 자 (가), (나)로 재는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 1



보기

- ㄱ. (나)는 (가)보다 더 정밀한 도구이다.
 ㄴ. (나)로 재면 오차가 없는 참값을 얻을 수 있다.
 ㄷ. (가)로 잰 값은 단위 없이 수치만 적어도 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑩ 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-03 | 개념 3·4

- ① 1 kg의 기준은 나라마다 달라도 된다.
- ② 누가 언제 재어도 같은 값을 얻게 하는 기준이다.
- ③ 킬로그램 원기가 지금도 1 kg의 정의이다.
- ④ 병원 혈압계는 교정 없이 써도 믿을 수 있다.
- ⑤ 측정 표준은 실험실에서만 필요하다.

- 11 어림에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-03 | 개념 2


보 기

- ㄱ. 어림은 정확한 값을 얻지 못하므로 과학 탐구에서는 쓰지 않는다.
 ㄴ. 페르미 추정은 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 방법이다.
 ㄷ. 계산기로 구한 답이 어림한 규모와 100배 다르면 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** **자료** 그림과 같은 체육관 안 공기의 질량을 어림하려 한다. 가장 적절한 어림값은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 2



- ① 약 3.6 kg ② 약 36 kg ③ 약 360 kg
 ④ 약 3600 kg ⑤ 약 36000 kg

- 13 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 3-5, 교과서 탐구

보 기

- ㄱ. 측정 표준은 단위뿐 아니라 측정 방법과 측정 도구도 함께 정한다.
 ㄴ. 표준 물질은 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기의 교정에 쓰인다.
 ㄷ. 공복 혈당 기준값은 식사 직후에 잰 혈당에도 그대로 적용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 다음은 측정 표준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○


10통과1-01-03 | 개념 3

- 학생 A : 측정 표준은 과학자들이 실험실 안에서만 쓰는 약속이야.
 학생 B : 표준은 한 번 정해 두면 따로 지키고 관리할 필요가 없어.
 학생 C : 병원 혈압계의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일을 교정이라고 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 15 **중요** **자료** 그림은 2019년 전후 1 kg의 기준을 정하는 방식을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-03 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (가)에서 원기의 질량이 조금 변해도 각국의 1 kg은 영향을 받지 않았다.
 ㄴ. (나)에서는 원기를 참조하지 않고도 1 kg을 구현할 수 있다.
 ㄷ. (가) → (나)는 기준을 변할 수 있는 물체에서 변하지 않는 자연 상수로 옮긴 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 길이, 시간, 질량의 현재 기준을 순서대로 옳게 짝지은 것은? ●○○○

10통과1-01-03 | 개념 4

- ① 빛 — 세슘 원자 — 플랑크 상수
 ② 빛 — 지구의 자전 — 플랑크 상수
 ③ 미터원기 — 세슘 원자 — 킬로그램 원기
 ④ 미터원기 — 지구의 자전 — 플랑크 상수
 ⑤ 빛 — 세슘 원자 — 킬로그램 원기

- 17 자료 표는 생활 속 측정 표준 (가)~(다)와 그 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 5 (I-02 연계)

측정 대상	단위	기준
(가) 전기 사용량	kWh	전력량계 지침의 차로 한 달 사용량
(나) 초미세먼지	μg/m ³	시간 평균 75 이상, 2시간 지속 → 주의보
(다) 공복 혈당	mg/dL	126 이상 → 당뇨병 진단

보 기

ㄱ. (가)의 kWh는 전력(W)의 단위이다.

ㄴ. (나)에서 한 번 잰 값이 80 μg/m³이면 바로 주의보가 발령된다.

ㄷ. (다)의 기준값이 병원마다 같아야 진단 결과를 서로 비교할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 서술형 1 kg의 기준이 금속 원기에서 플랑크 상수로 바뀐 까닭을 '복제 원기', '변한다', '자연 상수'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

- 19 중요 서술형 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 서로 다른 기준으로 값을 나타낼 때 생기는 문제를 한 가지 쓰고, 이를 막는 방법을 '측정 표준', '교정', '같은 값'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

- 20 서술형 가로 100 m, 세로 60 m인 운동장에 학생들이 뺑뺑이 서 있다. 한 사람이 차지하는 넓이를 약 0.5 m²로 볼 때, 학생 수를 어림하는 과정을 '쪼갬다', '자릿수'를 모두 포함하여 서술하고 어림값을 쓰시오. ●●●

10통과1-01-03 | 개념 2

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 학생 A~C의 활동이다.

- A 줄자로 운동장 한 변을 재어 85.4 m를 기록했다.
 B 도서관 장서 수를 '서가 수 × 칸 수 × 칸당 권수'로
 계산해 약 3만 권이라 헤아렸다.
 C 손을 물에 담가 보고 '약 40 °C쯤'이라고 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는
 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·2

보 기

- ㄱ. A의 활동은 측정이다.
 ㄴ. B와 C의 활동은 어림이다.
 ㄷ. B는 큰 문제를 쪼개어 곱하는 어림 전략을 썼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 세 물리량의 기준이 변해 온 과정을
 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 4

물리량	기준의 변화
길이	미터원기 → 빛이 진공에서 나아간 거리
시간	지구의 자전 → 세슘 원자의 진동
질량	킬로그램 원기 → 플랑크 상수(2019년)

보 기

- ㄱ. 세 경우 모두 '물체나 천체'에서 '자연 상수·
 원자'로 기준이 옮겨 갔다.
 ㄴ. 기준을 바꾼 공통 이유는 이전 기준이 변할 수
 있다는 것이었다.
 ㄷ. 새 기준으로는 장비를 갖춘 어느 실험실에서도
 단위를 구현할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 표는 1 kg 표준 추를 전자저울 (가), (나)에 네
 번씩 올려 읽은 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는
 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·3

저울	1회	2회	3회	4회
(가)	1.002 kg	0.999 kg	1.001 kg	0.998 kg
(나)	1.049 kg	1.051 kg	1.050 kg	1.050 kg

보 기

- ㄱ. (가)로 잰 값의 평균은 1.000 kg이다.
 ㄴ. (나)는 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.
 ㄷ. (가)를 교정하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 물탱크에 가득 찬 물의 질량을
 어림하는 데 쓸 자료를, (나)는 SI 기본량 세 가지와 그
 현재 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서
 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 2·4 (I-01·I-02 연계)

(가)

1.5 m

2 m

2 m

물의 밀도 $\approx 1000 \text{ kg/m}^3$

(나)

기본량	현재의 기준
길이(m)	빛이 진공에서 나아간 거리
시간(s)	세슘 원자의 진동
질량(kg)	플랑크 상수

보 기

- ㄱ. (가)의 물의 질량은 약 6×10^3 kg이다.
 ㄴ. (가)에서 쓴 밀도는 (나)와 같은 기본량이다.
 ㄷ. (나)에서 1 m는 시간과 무관하게 정의된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	0	표준	오차	표준과학	③	⑤	①	②	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	②	④	①	②	서술형	서술형	서술형	⑤	⑤	③	①

- 1 0** 개념 1
오차는 0이 안 되지만, 반복·평균·정밀한 도구로 줄인다.
- 2 X** 개념 2
도구 없이 경험으로 헤아리면 어렵이다.
- 3 0** 개념 4
2019년 재정의 — 마지막 물체 표준이 은퇴했다.
- 4 표준** 개념 3
측정 표준 = 모두의 자.
- 5 오차** 개념 1
참값과 측정값의 차이. 피할 수 없는 동반자다.
- 6 표준과학** 개념 3
한국표준과학연구원(KRISS) — 국가의 자를 지키는 곳.
- 7 ③** 개념 2
도구 없이 경험으로 '약 2천 명' — 어림의 전형이다.

바로알기

①·②·④·⑤ 자·체중계·온도계·초시계의 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 모두 측정이다.

- 8 ⑤** 개념 1 | 탐구
ㄱ (옳음) $(12.3 + 12.5 + 12.2 + 12.4 + 12.6) \div 5 = 62.0 \div 5 = 12.4 \text{ cm}$. ㄴ (옳음) 읽는 각도·눈금의 한계 때문에 같은 막대도 값이 틀려진다 — 오차다. ㄷ (옳음) 정밀한 도구와 반복 측정은 오차를 줄이는 두 무기다.

함정 체크

'오차를 줄일 수 있다'는 옳고, '오차를 0으로 만들 수 있다'는 틀리다 — 선지의 끝말까지 읽을 것.

- 9 ①** 개념 1
ㄱ (옳음) (가)는 1 cm 간격, (나)는 1 mm 간격 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) (나)로 재도 오차는 0이 되지 않는다 — 더 정밀한 도구는 오차를 줄일 뿐이다. ㄷ (틀림 →) 어느 자로 재든 측정값은 수치와 단위(cm)로 함께 기록한다.

10 ②

개념 3-4

측정 표준의 정의 그대로다. 시간·장소·사람이 달라도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준이다.

바로알기

① 1 kg의 기준이 나라마다 다르면 무역에서 거래 다툼이 생긴다 — 기준은 하나여야 한다. ③ 킬로그램 원기는 은퇴했고, 2019년부터 1 kg은 플랑크 상수로 정의한다. ④ 병원의 혈압계도 정기적으로 교정받아야 신뢰할 수 있다. ⑤ 측정 표준은 거래·의료·산업 등 일상 곳곳에 필요하다.

11 ④

개념 2

ㄴ (옳음) 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정 구조다.
ㄷ (옳음) 어림은 계산 도구 — 규모가 100배 다르면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 어림은 실험 전 예상값의 규모를 잡고 결과를 계산하는 데 쓰이므로 **과학 탐구에 꼭 필요하다**.

12 ④

개념 2

쪼갠다: 질량 = 부피 × 밀도. 부피 = $20 \times 15 \times 10 = 3000 \text{ m}^3$. 질량 $\approx 3000 \text{ m}^3 \times 1.2 \text{ kg/m}^3 = 3600 \text{ kg}$ (약 $3.6 \times 10^3 \text{ kg}$).

바로알기

③ 360 kg은 높이를 1 m로 넣은 값이다 — 세 길이를 모두 곱해야 한다. ①·②·⑤ 자릿수가 1000배·100배·10배 어긋난 값이다 — 어림의 생명은 자릿수다.

13 ③

개념 3-5 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) 측정 표준은 **측정 단위·측정 방법·측정 도구·표준 물질**을 함께 정한다. ㄴ (옳음) 농도를 아는 포도당 용액처럼 값이 정확한 표준 물질로 기기를 확인·교정한다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 기준값 126 mg/dL은 **8시간 이상 공복**이라는 정해진 방법으로 췌 값에만 쓴다.

14 ②

개념 3

C (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일이 교정이다.

바로알기

A (틀림 →) 측정 표준은 시장·병원·공장 등 **사회 전체**가 따르는 기준이다. B (틀림 →) 표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다 — KRISS가 국가 측정 표준을 유지하고 교정 체계를 운영한다.

15 ④

개념 4

ㄴ (옳음) 플랑크 상수는 어디서나 같은 값이므로 금고 속 원기가 필요 없다. ㄷ (옳음) 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)에서는 각국의 1 kg이 원기와 비교로 정해졌으므로, 원기의 질량이 변하면 **세계의 1 kg 기준이 함께 흔들린다**.

16 ①

개념 4

길이는 빛, 시간은 세슘 원자, 질량은 플랑크 상수 — 셋 다 변하지 않는 자연이 기준이다.

바로알기

②·④ 지구의 자전은 과거의 시간 기준이고, 지금 1초는 세슘 원자의 진동으로 정한다. ③·④ 미터원기는 과거의 길이 기준이고, 지금 1 m는 빛으로 정한다. ③·⑤ 킬로그램 원기는 2019년에 플랑크 상수로 바뀌었다.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 기준값이 같아야 어느 병원에서 췌혈당이든 같은 판단을 내리고 서로 비교할 수 있다 — 표준이 판단을 만든다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) kWh는 1 kW로 1시간 동안 쓴 전력량(에너지)의 단위이다($1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$). ㄴ (틀림 →) 주의보는 시간 평균 $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상이 2시간 지속될 때 발령된다 — 정해진 방법과 조건까지 기준이다.

18 모범 답안

개념 4

킬로그램 원기는 물체이므로 시간이 지나며 질량이 미세하게 변한다는 사실이 복제 원기와 비교할 때마다 수십 μg 씩 어긋나는 것으로 드러났다. 기준 자체가 변하면 측정을 믿을 수 없으므로, 언제 어디서나 값이 같은 자연 상수인 플랑크 상수로 1 kg을 다시 정의하였다.

채점 요소	배점
① 원기(물체)의 질량이 변한다는 것이 복제 원기와 비교에서 드러났다고 썼다.	2점
② 기준이 변하면 측정을 믿을 수 없다고 썼다.	2점
③ 변하지 않는 자연 상수(플랑크 상수)로 다시 정의했다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"원기가 너무 무거워서 옮기기 힘들기 때문이다." — 문제는 무게가 아니라 '기준이 변한다'는 것이다.

19 모범 답안

개념 3

저울마다 기준이 다르면 같은 물건의 질량이 가게마다 다르게 나와 거래 다툼이 생긴다(혈압계가 다르면 병원마다 진단을 믿을 수 없다). 이를 막으려면 국가가 측정 표준을 정해 유지하고, 시중의 저울·혈압계를 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정을 정기적으로 해야 한다. 그러면 언제 어디서 누가 재어도 같은 값을 얻는다.

채점 요소	배점
① 기준이 다를 때의 문제(거래 다툼, 진단 불신 등)를 썼다.	2점
② 측정 표준을 정하고 도구를 표준에 맞추어 교정한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 누가 재어도 같은 값을 얻는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"더 비싼 저울을 사면 된다." — 비싼 도구도 표준과 맞추는 교정이 없으면 다른 저울과 같은 값을 보장하지 못한다.

20 모범 답안

개념 2

문제를 '학생 수 = 운동장 넓이 ÷ 한 사람이 차지하는 넓이'로 쪼갬다. 넓이 = $100 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 6000 \text{ m}^2$ 이므로 $6000 \div 0.5 = 12000$, 약 1만 명이다. 어림에서 중요한 것은 정확한 값이 아니라 10^4 명이라는 자릿수다.

채점 요소	배점
① 넓이 ÷ 1인당 넓이로 쪼개는 식을 세웠다.	2점
② $6000 \text{ m}^2 \div 0.5 \text{ m}^2 \approx 1$ 만 명(10^4 명)을 구했다.	2점
③ 어림의 목표가 자릿수(규모)라고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"한 명씩 세어 봐야 정확히 알 수 있다." — 직접 세는 것은 어림이 아니다. 과정 없이 숫자만 쓴 답도 0점.

21 ⑤

개념 1·2 | 2점

ㄱ (옳음) 줄자의 눈금 + 수치와 단위 — 측정. ㄴ (옳음) B는 계산형 어림, C는 감각형 어림 — 둘 다 도구의 눈금 없이 해야했다. ㄷ (옳음) 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정 구조 그대로다.

합정 체크

B처럼 계산이 들어가도 도구로 잴 것이 아니면 어림이다 — '계산 여부'가 아니라 '도구·눈금 여부'로 가른다.

22 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 원기·자전 → 빛·원자·상수. ㄴ (옳음) 원기는 변하고 자전은 흔들린다 — 공통 결합. ㄷ (옳음) 자연 상수는 어디에나 있으므로 금고를 참조할 필요가 없다.

합정 체크

ㄱ ㄴ ㄷ 전부 옳은 문항도 실제로 출제된다 — '⑤는 답이 안 될 것'이라는 편견을 버릴 것.

23 ③

개념 1·3 | 2점

ㄱ (옳음) $(1.002 + 0.999 + 1.001 + 0.998) \div 4 = 4.000 \div 4 = 1.000 \text{ kg}$. ㄴ (옳음) (나)의 평균은 $(1.049 + 1.051 + 1.050 + 1.050) \div 4 = 4.200 \div 4 = 1.050 \text{ kg}$ — 1 kg 추를 늘 약 0.050 kg 크게 읽으므로 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 교정은 눈금을 표준에 맞추는 뿐이다 — 오차는 줄일 수 있지만 0으로 만들 수는 없다.

꼼꼼 자료 분석 — 23번

저울	1회	2회	3회	4회	평균
(가)	1.002	0.999	1.001	0.998	1.000 kg
(나)	1.049	1.051	1.050	1.050	1.050 kg

(가) 1 kg 물체에 $\pm 0.002 \text{ kg}$ 안으로 흩어짐 → 오차(피할 수 없음)

(나) 네 번 모두 약 0.050 kg 크게 읽음 → 표준에 맞추는 교정 필요

반복·평균은 흩어짐을 줄이고, 교정은 기준과의 어긋남을 바로잡는다

24 ①

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 부피 = $2 \times 2 \times 1.5 = 6 \text{ m}^3$, 질량 $\approx 6 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 6000 \text{ kg} = 6 \times 10^3 \text{ kg}$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 밀도는 질량을 부피로 나눈 유도량이다(단위 kg/m^3 , 소단원 02). ㄷ (틀림 →) 1 m는 시간의 단위(초)를 써서 정의된다 — 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리다(소단원 01).

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 측정(도구·수치+단위·오차) vs 어림(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)
- ✓ 측정 표준 = 모두의 자 — 거래·의료·산업의 신뢰 기반, 한국은 KRISS가 유지
- ✓ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛 · 세슘 · 플랑크 상수 — 2019년 kg 재정의)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 측정 표준이 함께 정하는 네 가지는?
2. 어림의 세 단계를 순서대로 말하면?
3. 2019년부터 1 kg을 정의하는 데 쓰는 자연 상수는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

이유: 다음을 3 개로 분 ← 1 개로 합 ← 2 개로 조인 2 개를 곱표, 1 개를 곱표, 1 개를 곱표

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"측정과 어림의 차이"를 예시 하나씩 들어 설명해 보자. 도구·눈금이라는 말이 안 나오면 43쪽으로! — 박찬샘"