


물질과 규칙성

우리 몸의 탄소, 스마트폰 속 규소, 반지의 금 — 이 모든 원소는 어디에서 왔을까?
138억 년 전 우주의 탄생에서 시작해, 물질이 만들어진 규칙을 추적한다.

● 원소의 여정 — 이 단원의 큰 그림



■ 이 단원의 학습 지도

01 **우주의 시작과 원소의 탄생** **NOW** 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 **별에서 만들어지는 원소** 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 **원소의 주기성과 화학 결합** 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 **물질의 전기적 성질과 신소재** 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 우주가 138억 년 전 '한 점'에서 시작했다는 걸, 과학자들은 대체 무엇을 보고 알아냈을까? **개념 1**
- 빅뱅 직후엔 원자도 없었다는데 — 수소와 헬륨은 언제, 어떤 순서로 만들어졌을까? **개념 2·3**
- 별에 가 본 적도 없는데 별의 성분을 어떻게 알까? 힌트: 빛에는 지문이 있다. **개념 4**
- "우주 어디를 봐도 수소 : 헬륨 = 3 : 1" — 이 단순한 숫자가 왜 빅뱅의 결정적 증거일까? **개념 5**

"우리는 별의 물질로 만들어졌다. 우리 몸의 모든 원자가 별을 거쳐 왔다." — 칼 세이건, 천문학자

01 우주의 시작과 원소의 탄생

성취기준 10통과1-02-01

스펙트럼 분석 → 우주 초기 원소 추론

1 우주의 시작, 빅뱅

약 138억 년 전, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

박찬샘

"풍선에 스티커를 붙이고 붙여 봐. 어느 스티커에서 봐도 다른 스티커가 다 멀어지지? 우주 팽창엔 '중심'이 따로 없다는 게 포인트!"

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 식어 가는 순서대로, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.

- 기본 입자 생성 — 빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 **쿼크**와 **전자** 등이 생겼다.
- 양성자·중성자 생성 — 쿼크 3개가 결합해 양성자·중성자가 되었다. 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**.
- 헬륨 원자핵 생성 — 빅뱅 후 **약 3분**, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다.
- 원자 생성 — 빅뱅 후 **약 38만 년**, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다.




그림 1 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 팽창으로 식을수록 작은 입자부터 차례로 결합한다

● 날개 노트

빅뱅 우주론(대폭발 우주론)

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

쿼크

물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나.

(심화) 양성자 = 업 2 + 다운 1, 중성자 = 업 1 + 다운 2

K(켈빈)

절대 온도의 단위. 0 K = -273 °C. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

● 한눈에 암기

기본 입자 → 양·중성자
→ 원자핵(3분)
→ 원자(38만 년)
"작은 것부터 뭉친다!"

5 중학 과학 다시보기

원소 (중3)

더 이상 다른 물질로 분해되지 않는, 물질을 이루는 기본 성분.

빛의 분산 (중1)

프리즘을 지난 햇빛이 색깔별로 나뉘는 현상 — 이 소단원의 '스펙트럼'이 여기서 출발한다.

3 우주가 투명해지다 - 우주 배경 복사

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 **원자가 완성되자** 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 **직진** 하게 되었다 — 우주가 **투명**해진 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 모든 방향에서 관측되는 희미한 전파로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 결정적 증거가 되었다.




그림 2 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간

! 시험엔 이렇게

"별과 은하는 언제?"가 함정 단골. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 수억 년이 지나 만들어진다 — 원자핵 생성(3분)~원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다!

알 **알짜 정리 ① — 빅뱅과 입자의 탄생**

- ✓ 빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 팽창, 온도·밀도는 감소
- ✓ 생성 순서: 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년)
- ✓ 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = 우주 배경 복사 (빅뱅의 증거 ①)

✓ 바로바로 체크

- 1 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다. (O, X)
- 2 우주 배경 복사는 원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛의 흔적이다. (O, X)
- 3 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에 만들어졌다. (O, X)

음원 1 X (별이 정자에 사를 들어 올릴음) 2 O (약 38만년에 퍼지별) 3 X (원자핵이 후의 열량)

● 날개 노트

자유 전자

원자에 묶이지 않고 홀로
돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘
충돌한다.

우주 배경 복사의 발견

1965년 펜지어스와 윌슨이
안테나 잡음을 조사하다 우연히
발견했고, 노벨 물리학상을
받았다.

● 궁금해?

우주 배경 복사의 온도

현재 약 2.7 K. 138억 년 동안
우주가 팽창하며 식은 결과다.

4 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

그런데 우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 **어떻게 확인할까?** 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다.

- **연속 스펙트럼** — 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛. 무지개처럼 **모든 색이 연속**으로 나타난다.
- **방출 스펙트럼** — 고온·저밀도의 기체가 내는 빛. 어두운 바탕에 **특정 위치의 밝은 선**(방출선)만 나타난다.
- **흡수 스펙트럼** — 광원의 빛이 **저온의 기체를 통과**할 때. 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 **검은 선(흡수선)**이 나타난다.

연속 스펙트럼
고온의 광원



방출 스펙트럼
고온·저밀도 기체



흡수 스펙트럼
광원 + 저온 기체 통과



같은 원소 → 방출선과 흡수선의 위치(파장)가 같다!

그림 3 | 스펙트럼의 세 종류 — 같은 원소의 선은 같은 위치에 나타난다

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 **파장(위치)**이 **정해져 있고**, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **항상 같은 위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 **원소를 구별하는 표지**가 된다. 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, **별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지** 알 수 있다.

예를 들어 **수소 기체 방전관**의 빛을 분광기로 보면 가시광선 영역에 **보라·파랑·청록·빨강의 밝은 선 4개**가 언제나 같은 자리에 나타난다. 이 수소의 선과 헬륨의 선은 우주 곳곳의 별과 은하의 스펙트럼에 공통으로 나타난다 — 수소와 헬륨이 우주의 **주요 구성 원소**라는 단서다. 별의 흡수선이 수소·헬륨의 선을 다 짝지우고도 **남으면**, 남은 선은 **다른 원소**의 것이다. (→ 교과서 탐구)

박찬
샘

"별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드야. 찍어서 대조만 하면 성분이 나온다 — 우리가 마트 계산대에서 하는 일이란 똑같지?"

● 날개 노트

파장

빛(파동)의 골에서 골까지 거리.
가시광선은 파장이 짧을수록
보라, 길수록 빨강.

분광기

빛을 파장별로 나누어
스펙트럼을 보여 주는 장치.

수소의 선스펙트럼

가시광선 영역의 밝은 선 4개 —
약 410·434·486·656 nm(보라
→ 빨강). 숫자보다 위치 대조가
핵심.

● 시험 단골 비교

방출 vs 흡수

어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
"바탕이 무엇인지"부터 보기!

5 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 **질량비가 수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1**이다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 : 중성자는 약 7 : 1이었고, 중성자는 거의 모두 양성자와 짝을 지어 헬륨 원자핵이 되었다(그림 4 ①). 이론의 예측과 관측 결과가 일치하므로, 수소·헬륨의 질량비는 앞서 개념 3에서 본 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다.

① 예측 — 입자 16개로 3 : 1 만들기 (빅뱅 후 약 3분, 헬륨 원자핵 생성)



② 관측 — 우주 전체의 원소 조성 (질량비, 별과 은하의 스펙트럼 분석)



그림 4 | 예측과 관측의 일치 — 양성자 : 중성자 $\approx$ 7 : 1에서 출발하면 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1(질량비)이 된다

! 시험엔 이렇게

질량비 3 : 1과 개수비 약 12 : 1을 바꿔치기하는 선지가 출제된다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 4배이므로, 개수비 12 : 1 $\rightarrow$ 질량비 12 : 4 = 3 : 1. 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인!

알 알파 정리 ② — 스펙트럼과 빅뱅의 증거

- ✓ 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선)
- ✓ 같은 원소 $\rightarrow$ 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 $\rightarrow$ 별빛 분석으로 구성 원소 파악
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거: ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

✓ 바로바로 체크

- 1 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이다. (O , X)
- 2 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다. (O , X)
- 3 수소·헬륨 질량비의 관측값이 이론 예측값과 일치하는 것은 빅뱅 우주론의 증거이다. (O , X)

0 ㉔ (T : ZT ㉔ 극대속력 T : ㉔ ㉔대속력) X Z (% ㉔ ㉔대속력) O T ㉔대

● 날개 노트

질량비와 개수비

He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량.

개수비 H : He = 12 : 1

$\rightarrow$ 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1

● 한눈에 암기

빅뱅의 증거는 세트!

① 우주 배경 복사

② H : He = 3 : 1

"증거를 모두 고르면?"

$\rightarrow$ 무조건 이 둘

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 01을 선택하면 알파 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

스펙트럼으로 별의 구성 원소 알아내기

자료

그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. S의 흡수선은 3개이다.



해석의 4단계

1. 별 S의 스펙트럼 종류 확인 — 연속 스펙트럼(별 표면의 빛) 위에 검은 선 → 흡수 스펙트럼. 검은 선은 별의 대기가 특정 파장을 흡수한 자리다.
2. 선의 위치 대조 — S의 흡수선 위치가 A의 방출선 위치와 일치한다. 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치! → 별 S의 대기에 원소 A가 있다.
3. 없는 원소 확인 — B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없다 → B는 검출되지 않는다.
4. 남는 선 확인 — A의 선 2개를 짝지우고도 S의 흡수선이 1개 남는다(?). A·B 어느 쪽과도 위치가 맞지 않으므로 → S의 대기에는 A, B 말고 다른 원소도 있다.

결론

별 S의 대기에는 원소 A와 또 다른 원소가 포함되어 있고, 원소 B는 포함되어 있지 않다(또는 검출 한계 이하이다). 실제 별빛에서 수소·헬륨의 선을 이렇게 찾아내고, 선의 세기까지 분석해 우주 전체의 수소·헬륨 비율(3 : 1)을 알아냈다.

! 시험엔 이렇게

이 자료가 나오면 ①스펙트럼 종류 → ②선 위치 대조 → ③없는 원소 → ④남는 선 순서로 접근한다. "흡수선 = 그 파장의 빛을 방출했다", 남는 선을 놓친 "S에는 A만 있다"가 최다 빈출 함정.

직접 해보기 — 간이 분광기로 '원소의 지문' 확인

간이 분광기(또는 CD 조각)로 여러 광원을 관찰해 보자. 형광등을 보면 몇 개의 밝은 선(방출선)이 뜨고, 백열등이나 햇빛을 보면 무지개처럼 이어진 연속 스펙트럼이 보인다. 형광등의 선 위치는 관 속에 든 기체의 종류에 따라 달라진다 — 방금 배운 '원소의 지문'을 내 눈으로 확인하는 셈이다. (주의: 태양을 직접 보지 말 것)

교과서 탐구

분광기 관찰

수소의 선스펙트럼을 관찰하고 별빛과 비교하기

목적

수소·헬륨의 선스펙트럼을 분광기로 관찰하고 별빛과 비교해, 수소·헬륨이 우주의 주요 구성 원소임을 확인한다.


준비·과정

준비물 분광기(또는 간이 분광기), 수소·헬륨 기체 방전관, 방전관 전원 장치, 백열등, 색연필

1. 분광기로 백열등의 빛을 보고 스펙트럼을 그린다.
2. 수소 방전관, 헬륨 방전관을 차례로 켜고 밝은 선의 색과 눈금(파장, nm)을 기록한다.
3. 별 S의 흡수 스펙트럼 자료에 2에서 얻은 선의 위치를 겹쳐 대조한다.

주의: 전원 장치는 고전압 — 켜진 방전관·전극을 만지지 않고, 교체는 전원을 끄고 식힌 뒤 선생님과 한다.

결과



해석의 3단계

1. 바탕 보기 — (가)는 연속, (나)·(다)는 어두운 바탕에 밝은 선 = 방출, (라)는 무지개 바탕에 검은 선 = 흡수 스펙트럼이다. 수소는 가시광선 영역에 선 4개, 헬륨은 이와 다른 자리에 선을 낸다.
2. 짝짓기 — S의 검은 선 중 4개는 (나)의 수소 선과, 6개는 (다)의 헬륨 선과 위치가 같다 → S에 수소·헬륨이 있다.
3. 남은 선 — 짝이 없는 검은 선 1개(?)가 남는다 → 수소·헬륨 말고 다른 원소도 조금 있다.

결론

우주 곳곳의 별과 은하의 스펙트럼에서 수소와 헬륨의 선이 공통으로 나타난다. 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨이 지금도 우주의 주요 구성 원소이다. (질량비 약 3 : 1은 선의 세기까지 정밀하게 분석해 얻는다 — 개념 5)

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① 광원 바꾸기 — 네온·나트륨 방전관 등으로 바뀌도 원소는 선의 개수가 아니라 위치로 가린다.
- ② 기체에 통과시키기 — 백열등 빛을 저온의 수소 기체에 통과시키면 (나)와 같은 자리에 검은 선 4개가 생긴다.
- ③ 별 바꾸기 — 헬륨 선 자리에 흡수선이 없으면 '헬륨은 검출되지 않는다', 짝 없는 선이 남으면 '다른 원소도 있다'.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 우주는 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 후 지금까지 계속 팽창하고 있다. (O , X)
- ② 빅뱅 직후 원자가 가장 먼저 만들어졌고, 시간이 지나며 원자가 쪼개져 원자핵과 전자가 되었다. (O , X)
- ③ 방출 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타나는 스펙트럼이다. (O , X)
- ④ 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 _____ 원자핵이 만들어졌다.
- ⑤ 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨의 질량비는 약 _____ : _____이다.
- ⑥ 원자가 만들어지면서 우주가 투명해질 때 퍼져 나간 빛의 흔적을 _____라고 한다.

STEP 2 내신 완성


학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ **중요** 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? ●○○○
10통과1-02-01 | 개념 2
 - ① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
 - ② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
 - ③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
 - ④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
 - ⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

- ⑧ 빅뱅 우주론에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-02-01 | 개념 1
 - ① 빅뱅 이후 우주의 크기는 변하지 않았다.
 - ② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 높아졌다.
 - ③ 외부 은하는 대부분 우리 은하로 다가온다.
 - ④ 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.
 - ⑤ 우주 팽창의 중심은 우리 은하이다.

- ⑨ **자료** 그림은 풍선 표면에 스티커 A, B, C를 붙이고 풍선을 불기 전과 분 뒤의 모습을, 표는 A에서 B, C까지의 거리를 나타낸 것이다. 이 모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○○

10통과1-02-01 | 개념 1




보기

- ㄱ. 풍선이 부풀면 B와 C는 모두 A에서 멀어진다.
- ㄴ. A에서 멀어진 거리는 C가 B보다 크다.
- ㄷ. 풍선 표면에서 팽창의 중심은 A이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **중요** **자료** 그림은 빅뱅 이후 서로 다른 두 시기 (가), (나)의 우주에서 빛이 나아가는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 3



보 기

- ㄱ. (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 원자에 흡수되기 때문이다.
 ㄴ. 우주가 (가)에서 (나)의 상태로 바뀐 것은 전자가 원자핵에 붙잡혔기 때문이다.
 ㄷ. (나) 시기에 퍼져 나간 빛은 현재 우주의 모든 방향에서 관측된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 4

- ① 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 지나면 흡수선이 생긴다.
 ② 고온의 별 표면이 내는 빛은 방출 스펙트럼이다.
 ③ 고온·저밀도 기체는 연속 스펙트럼을 낸다.
 ④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 다르다.
 ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 원소를 알 수 없다.

- 12 빅뱅 우주론의 증거로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-02-01 | 개념 3·5

보 기

- ㄱ. 우주 배경 복사가 관측된다.
 ㄴ. 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1로 관측된다.
 ㄷ. 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림 (가)는 수소 기체 방전관의 빛을, (나)는 별 S의 빛을 분광기로 관찰한 스펙트럼이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 4, 교과서 탐구



보 기

- ㄱ. 별 S의 대기에는 수소가 있다.
 ㄴ. (가)는 흡수 스펙트럼이다.
 ㄷ. 별 S의 흡수선은 모두 수소 때문에 생긴 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **탐구** 다음은 간이 분광기로 여러 광원의 빛을 관찰한 실험이다.

[과정] 간이 분광기로 (가) 백열등, (나) 기체 X가 든 방전관, (다) 기체 Y가 든 방전관의 빛을 차례로 관찰하고 스펙트럼을 그린다.

[결과] (가)에서는 무지개처럼 모든 색이 이어진 띠가, (나)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 3개가, (다)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 2개가 보였다. (다)의 선은 (나)의 어느 선과도 위치가 겹치지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 각각 한 가지 원소로 이루어진 기체이다.) ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 4, 탐구

보 기

- ㄱ. (가)는 연속 스펙트럼이다.
 ㄴ. X와 Y는 서로 다른 원소이다.
 ㄷ. 백열등의 빛을 저온의 기체 X에 통과시키면 (나)의 밝은 선과 같은 위치에 검은 선이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 다음은 우주의 수소와 헬륨에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)

학생 A : 우주에서 수소와 헬륨의 원자 개수비가 약 3 : 1이야.

학생 B : 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분 무렵 양성자 2개와 중성자 2개가 결합해서 만들어졌어.

학생 C : 질량비의 관측값이 빅뱅 우주론의 예측값과 일치해서 빅뱅의 증거가 돼.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 16 **중요** 수소와 헬륨만으로 이루어진 어떤 기체 40 g 속에 수소가 30 g, 헬륨이 10 g 들어 있다. 이 기체 속 수소 원자 수 : 헬륨 원자 수는? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의 4배이다.) ●●●

10통과1-02-01 | 개념 5

- ① 3 : 1 ② 4 : 1 ③ 6 : 1 ④ 9 : 1 ⑤ 12 : 1

- 17 **자료** 그림은 빅뱅 이후 만들어진 입자 (가)~(다)를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 2



보 기

- ㄱ. (가)는 더 이상 쪼갤 수 없는 기본 입자이다.
 ㄴ. (다)는 (나)보다 먼저 만들어졌다.
 ㄷ. (나)가 만들어진 시기의 우주 온도는 (다)가 만들어진 시기보다 높았다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주가 투명해진 까닭을 '자유 전자', '원자핵', '빛'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 3

- 19 **중요** **서술형** 우주 전체에서 관측되는 수소와 헬륨의 질량비가 빅뱅 우주론의 증거가 되는 까닭을 '예측', '관측', '3 : 1'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5

- 20 **서술형** 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다. 그 까닭을 '방출선', '흡수선', '위치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원의 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 위치가 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.
 ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.
 ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 빅뱅 후 약 3분 무렵 헬륨 원자핵이 만들어지기 전 (가)와 후 (나)의 입자 16개를 나타낸 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 양성자와 중성자의 질량은 같고, 중성자는 모두 헬륨 원자핵을 이룬다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)




보 기

- ㄱ. (가)에서 양성자 수 : 중성자 수는 7 : 1이다.
 ㄴ. (나)에서 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 3 : 1이다.
 ㄷ. (가)의 16개 중 중성자가 4개였다면, (나)에서 전체 질량 중 헬륨 원자핵의 비율은 25 %보다 작았을 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 원소 X, Y의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을, (나)는 S 대기의 원소 질량비를 나타낸 것이다. X, Y는 수소와 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자의 약 4배이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 4·5 (자료 두 개 엮기)




보 기

- ㄱ. S의 검은 선은 S 대기가 빛을 방출한 자리이다.
 ㄴ. S의 대기에서 Y의 원자 수는 X의 약 1/3이다.
 ㄷ. S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 빅뱅 이후 우주의 온도 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A, B는 각각 헬륨 원자핵과 원자가 만들어진 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 3 (I-02 기본량과 단위 연계)



보 기

- ㄱ. K(켈빈)는 SI 기본량인 온도의 단위이다.
 ㄴ. B 이후 빛은 자유 전자에 막힘 없이 직진하였다.
 ㄷ. B 시기의 온도는 현재 우주 배경 복사 온도의 1000배 이상이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	서슬형	서슬형	서슬형	㉟	㊱	㊲	㊳

1 O

개념 1

빅뱅 우주론의 핵심. 팽창하는 동안 온도와 밀도는 계속 낮아졌고, 그 순서대로 입자가 만들어졌다.

2 X

개념 2

순서가 반대다. 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). **작은 입자가 결합해 큰 입자가 되는 방향**이다.

3 X

개념 4

연속 스펙트럼 위의 검은 선은 **흡수** 스펙트럼. 방출 스펙트럼은 어두운 바탕 + 밝은 선이다.

4 헬륨

개념 2

양성자 2 + 중성자 2 = 헬륨 원자핵. 양성자 1개는 그 자체로 수소 원자핵이다.

5 3:1

개념 5

질량비 수소 : 헬륨 $\approx 3:1$. 이론 예측과 관측이 일치해 빅뱅의 증거가 된다.

6 우주 배경 복사

개념 3

원자 생성 → 우주 투명 → 그때 퍼진 빛이 식어 현재 약 2.7 K의 전파로 관측된다.

7 ㉔

개념 2

기본 입자(쿼크·전자) → 쿼크 3개 결합 = 양성자·중성자 → 양성자·중성자 결합 = 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자핵 + 전자 = 원자(약 38만 년).

바로알기

① 양성자가 먼저 생기고, 양성자·중성자가 결합해 원자핵이 되었다. ③ 기본 입자가 결합해 양성자·중성자가 되었으므로 기본 입자가 가장 먼저다. ④ 입자는 기본 입자부터 원자까지 작은 것부터 차례로 만들어졌다. ⑤ 헬륨 원자핵은 양성자·중성자가 생긴 뒤에 만들어졌다.

8 ㉕

개념 1

외부 은하는 대부분 멀어지고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다 — 우주가 팽창한다는 증거다.

바로알기

① 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 팽창하고 있다. ② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. ③ 외부 은하는 대부분 우리 은하에서 멀어지고 있다. ⑤ 우주 팽창에는 중심이 따로 없다.

9 ㉖

개념 1

ㄱ (옳음) A-B는 1 cm → 2 cm, A-C는 2 cm → 4 cm로 모두 늘었다. ㄴ (옳음) 같은 시간 동안 B는 1 cm, C는 2 cm 멀어졌다 — 먼 은하일수록 빨리 멀어지는 것과 같다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 풍선 표면에는 팽창의 **중심이 따로 없다** — B나 C에서 보아도 나머지 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창도 마찬가지다.

10 ④

개념 3

(가)는 빛이 자유 전자와 부딪쳐 꺾이는 원자 생성 전, (나)는 빛이 곧게 나아가는 원자 생성 후다. **ㄴ (옳음)** 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되자 빛을 가로막던 자유 전자가 사라졌다. **ㄷ (옳음)** 이때 퍼진 빛이 식어 지금 모든 방향에서 우주 배경 복사로 관측된다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 자유 전자와 끊임없이 충돌하기 때문이다. (가) 시기에는 아직 원자가 없다.

11 ①

개념 4

연속 스펙트럼의 빛이 저온 기체를 지나면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 생긴다 = 흡수 스펙트럼.

바로알기

② 고온의 별 표면이 내는 빛은 모든 색이 이어진 연속 스펙트럼이다. ③ 고온·저밀도 기체가 내는 빛은 밝은 선이 나타나는 방출 스펙트럼이다. ④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치에 나타난다. ⑤ 흡수선의 위치를 원소별 스펙트럼과 대조하면 원소를 알 수 있다.

12 ③

개념 3·5

빅뱅 우주론의 2대 증거 = ㄱ 우주 배경 복사 + **ㄴ** 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1. 둘 다 예측과 관측이 일치했다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 같은 원소의 방출선·흡수선 위치가 같은 것은 스펙트럼으로 원소를 알아내는 원리일 뿐, 빅뱅 우주론의 증거는 아니다.

13 ①

개념 4 | 교과서 탐구

(가)는 어두운 바탕에 밝은 선 4개 = 수소의 방출 스펙트럼, (나)는 무지개 바탕에 검은 선 = 별 S의 흡수 스펙트럼이다. ㄱ (옳음) S의 검은 선 4개가 수소의 선 4개와 위치가 같다 → S의 대기에 수소가 있다.

꼼꼼 자료 분석



- ① 어두운 바탕 + 밝은 선 → (가)는 방출, 무지개 + 검은 선 → (나)는 흡수
- ② 수소 선 4개 = S의 검은 선 4개(점선) → 수소 있음
- ③ 짙은 검은 선 1개(?) → 수소 말고 다른 원소도 있다

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)는 고온·저밀도의 수소 기체가 빛을 내어 생긴 방출 스펙트럼이다. **ㄷ** (틀림 →) S의 검은 선 5개 중 1개는 수소의 선과 위치가 맞지 않는다 → S의 대기에 수소 말고 다른 원소도 있다.

14 ⑤

개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 백열등은 고온의 광원 → 모든 색이 이어진 연속 스펙트럼. **ㄴ (옳음)** 원소마다 선의 위치가 정해져 있다. 선이 하나도 겹치지 않으므로 X와 Y는 서로 다른 원소다. **ㄷ (옳음)** 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치 → 저온의 X를 통과한 빛에는 (나)의 밝은 선 자리에 검은 선이 생긴다.

함정 체크

(나)·(다)는 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. '선의 개수'가 아니라 '선의 위치'로 원소를 가린다.

15 ④

개념 5 | 개념 2 연계

B (옳음) 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 → 헬륨 원자핵. **C (옳음)** 예측값과 관측값(질량비 약 3 : 1)이 일치하는 것이 빅뱅 우주론의 증거다.

바로알기

A (틀림 →) 약 3 : 1은 질량비이다. 헬륨 원자 1개가 수소 원자보다 약 4배 무거우므로 원자 개수비는 약 12 : 1이다.

16 ⑤

개념 5

원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개의 질량. 수소 원자 1개의 질량을 m 이라 하면 헬륨은 $4m$ 이다.

수소 : 헬륨 = $(30 \div m) : (10 \div 4m) = 30 : 2.5 = 12 : 1$.

질량비는 3 : 1이지만 원자 수의 비는 12 : 1이다.

바로알기

① 3 : 1은 질량비이고, 원자 수의 비는 12 : 1이다. ② 4 : 1은 헬륨과 수소 원자 1개의 질량비(헬륨 : 수소)이다. ③·④ 헬륨 10 g을 원자 1개의 질량(4배)으로 나누면 2.5이므로 $30 : 2.5 = 12 : 1$ 이다.

17 ②

개념 2

(가)는 양성자(= 수소 원자핵), (나)는 헬륨 원자핵, (다)는 수소 원자다. ㄷ (옳음) (나)는 약 3분, (다)는 약 38만 년 무렵에 만들어졌다. 우주는 팽창하며 계속 식었으므로 (나)가 만들어진 시기의 온도가 더 높다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가) 양성자는 쿼크 3개가 결합한 입자이다. 더 쪼갤 수 없는 기본 입자는 쿼크와 전자이다. ㄴ (틀림 →) (다) 원자는 (나) 헬륨 원자핵보다 나중에 만들어졌다.

18 모범 답안

개념 3

원자가 만들어지기 전에는 빛이 우주 공간의 자유 전자와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 약 38만 년 무렵 우주의 온도가 낮아져 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되자, 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진할 수 있게 되었으므로 우주가 투명해졌다.

채점 요소	배점
① 원자 생성 전에는 빛이 자유 전자와 충돌해 멀리 나아가지 못했다고 썼다.	2점
② 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진하게 되었다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"우주가 팽창하면서 빛이 밝아졌기 때문이다." — 자유 전자와 원자 생성이 빠진 답.

19 모범 답안

개념 5

빅뱅 우주론은 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1이 될 것이라고 예측하였다. 실제로 별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 관측한 값도 우주 어디서나 약 3 : 1이다. 이론의 예측과 관측 결과가 일치하므로 빅뱅 우주론의 증거가 된다.

채점 요소	배점
① 빅뱅 우주론이 질량비 약 3 : 1을 예측했다고 썼다.	2점
② 스펙트럼 관측 결과도 약 3 : 1이라고 썼다.	2점
③ 예측과 관측이 일치하므로 증거가 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"우주에 수소가 가장 많기 때문이다." — 예측과 관측의 일치가 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치에 나타난다. 따라서 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 비교하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다.

채점 요소	배점
① 원소마다 선이 나타나는 위치가 정해져 있다고 썼다.	2점
② 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같다고 썼다.	2점
③ 흡수선 위치를 원소별 스펙트럼과 비교한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"별빛을 분석하면 알 수 있기 때문이다." — 선의 위치를 비교하는 과정이 없는 답.

21 ③

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 고온 기체가 내는 빛 = 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. ㄴ (옳음) 방출선과 흡수선의 위치가 일치하므로 A와 B는 같은 원소일 수 있다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)의 검은 선은 B가 그 파장의 빛을 흡수한 자리다. '흡수선 자리에서 방출한다'는 최다 빈출 함정이다.

22 ①

개념 5 | 개념 2 연계 | 2점

(가)는 양성자 14개 + 중성자 2개. 중성자 2개가 양성자 2개와 결합해 (나)의 헬륨 원자핵 1개가 되고, 남은 양성자 12개가 수소 원자핵이다. $\neg$ (옳음) $14 : 2 = 7 : 1$.

바로알기


ㄴ (틀림 $\rightarrow$) 수소 원자핵 12개 : 헬륨 원자핵 1개 = $12 : 1$ 이다. $3 : 1$ 은 질량비($12 : 4$)이다. ㄷ (틀림 $\rightarrow$) 중성자가 4개면 헬륨 원자핵 2개(질량 8)와 수소 원자핵 8개(질량 8)가 되어 헬륨의 비율은 $8/16 = 50\%$ 로 25% 보다 크다. 중성자가 많을수록 헬륨이 많아진다.

23 ②

개념 4·5 | 2.5점

ㄷ (옳음) S의 검은 선 5개는 X의 선 3개, Y의 선 2개와 위치가 모두 같다 $\rightarrow$ S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

$\neg$ (틀림 $\rightarrow$) S의 검은 선은 S의 대기가 그 파장의 빛을 흡수하여 생긴 것이다. ㄴ (틀림 $\rightarrow$) 원자 수는 X(수소) $74 \div 1 = 74$, Y(헬륨) $24 \div 4 = 6$ 이므로 Y는 X의 약 $1/12$ 이다.

24 ⑤

개념 3 | I-02 연계 | 2.5점

$\neg$ (옳음) 온도는 국제단위계(SI)의 기본량 7가지 중 하나이고, 그 단위가 K(켈빈)이다(I-02). ㄴ (옳음) B(원자 생성) 이후 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 빛이 직진하게 되었다. ㄷ (옳음) $3000 \div 2.7 \approx 1100 \rightarrow 1000$ 배 이상.

합정 체크

약 3000 K는 원자가 만들어질 무렵(B)의 온도, 약 2.7 K는 그때 퍼진 빛이 팽창하는 우주에서 식은 지금의 온도다. 두 값을 바꿔 읽지 말자.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 입자는 기본 입자 $\rightarrow$ 양성자·중성자 $\rightarrow$ 헬륨 원자핵(약 3분) $\rightarrow$ 원자(약 38만 년) 순서로, 작은 것부터 차례대로 만들어졌다.
- ✓ 스펙트럼은 바탕부터 본다 — 어두운 바탕 + 밝은 선이면 방출, 무지개 바탕 + 검은 선이면 흡수.
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거 = ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 $3 : 1$. 이론의 예측과 관측이 일치한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅뱅 후 약 38만 년, 우주가 투명해진 것은 무엇이 만들어졌기 때문인가?
2. 무지개 바탕에 검은 선이 나타나는 스펙트럼의 이름은?
3. 빅뱅 우주론의 2대 증거 두 가지는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전단 1 원자 2 루스 아페트럼 3 양배율 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"틀린 문제를 적어 두는 사람과 그냥 넘기는 사람의 차이가, 시험장에서의 차이가 된다. — 박찬샘"