



01 Clasificar números

ENUNCIADO

Indicá el conjunto más pequeño al que pertenece cada número.

a) 7 b) -4 c) $\frac{5}{6}$ d) raíz cuadrada de 3 e) 0,125

RESOLUCIÓN

1. a) 7 es un entero positivo. Ya pertenece a los naturales, el menor conjunto de la lista que lo contiene.

$$7 \in \mathbb{N}$$

Propiedades: P1.

2. b) -4 es un entero negativo. No es natural; el conjunto más pequeño es el de los enteros.

$$-4 \in \mathbb{Z}$$

Propiedades: P1.

3. c) $\frac{5}{6}$ es un cociente de enteros con denominador no nulo. No es entero.

$$\frac{5}{6} \in \mathbb{Q}$$

Propiedades: P1.

4. d) 3 no es un cuadrado perfecto. Su raíz cuadrada es irracional.

$$\sqrt{3} \in \mathbb{I}$$

Propiedades: P1.

5. e) El decimal finito 0,125 puede escribirse como fracción.

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} \in \mathbb{Q}$$

Propiedades: P1, P5.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La consigna pide el conjunto más pequeño, aunque cada número también pertenezca a conjuntos más amplios.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



02 Reconocer propiedades

ENUNCIADO

Identificá la propiedad usada en cada igualdad.

$$8+11=11+8$$

$$(2 \cdot 5) \cdot 3 = 2 \cdot (5 \cdot 3)$$

$$k(m+n) = km+kn$$

RESOLUCIÓN

1. a) Los sumandos intercambian su orden; la operación sigue siendo una suma. Es la propiedad conmutativa de la suma.

$$8+11=19=11+8$$

Propiedades: P2.

2. b) Se conserva el orden 2, 5, 3 y solo cambia la agrupación. Es la propiedad asociativa del producto.

$$(2 \cdot 5) \cdot 3 = 10 \cdot 3 = 30$$

Propiedades: P2.

3. La otra agrupación produce el mismo resultado.

$$2 \cdot (5 \cdot 3) = 2 \cdot 15 = 30$$

Propiedades: P2.

4. c) k multiplica cada sumando del paréntesis. Es la propiedad distributiva.

$$k(m+n) = km+kn$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Cambiar el orden y cambiar la agrupación son operaciones diferentes.



Eta­pa 1 · Números y operaciones

PARADA DE CONTROL · SOLUCIONES PASO A PASO

03 Calcular con signos

ENUNCIADO

Calculá los tres apartados.

$$a) \ 12+(-19) \qquad b) \ -7-(-5) \qquad c) \ -3+9-12$$

RESOLUCIÓN

1. a) Los sumandos tienen signos diferentes. Restamos $19 - 12$ y conservamos el signo negativo, porque 19 tiene mayor valor absoluto.

$$12+(-19)=- (19-12)=-7$$

Propiedades: P3.

2. b) El opuesto de -5 es $+5$. Restar -5 equivale a sumar 5.

$$-7-(-5)=-7+5=- (7-5)=-2$$

Propiedades: P3.

3. c) Primero calculamos $-3 + 9$; luego restamos 12.

$$-3+9-12=6-12=-6$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Los resultados son -7 , -2 y -6 . En el apartado b), el doble signo negativo se transforma en una suma.



04 Eliminar paréntesis

ENUNCIADO

Simplificá la expresión.

$$-(x - 4) + (2x - 1)$$

RESOLUCIÓN

1. El signo menos delante del primer paréntesis equivale a multiplicar por -1. Se distribuye a los dos términos.

$$-(x - 4) = (-1)x + (-1)(-4) = -x + 4$$

Propiedades: P2, P4.

2. El segundo paréntesis está precedido por un signo más; sus signos se conservan.

$$-(x - 4) + (2x - 1) = -x + 4 + 2x - 1$$

Propiedades: P2.

3. Agrupamos términos en x y términos constantes.

$$(-x + 2x) + (4 - 1) = x + 3$$

Propiedades: P2, P3.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Si $x = 2$, la expresión original vale 5 y $x + 3$ también vale 5. Es una comprobación numérica, además de la derivación algebraica.



05 Multiplicar y dividir

ENUNCIADO

Calculá los tres apartados.

$$a) (-6)(-7) \quad b) 24 \mid (-3) \quad c) 9 \mid \left(-\frac{1}{3}\right)$$

RESOLUCIÓN

1. a) El producto de dos negativos es positivo. Multiplicamos sus valores absolutos.

$$(-6)(-7) = 6 \cdot 7 = 42$$

Propiedades: P4.

2. b) Los signos son diferentes; el cociente es negativo.

$$24 \mid (-3) = -(24 \mid 3) = -8$$

Propiedades: P4.

3. c) El recíproco de $-1/3$ es -3 . Dividir por $-1/3$ equivale a multiplicar por -3 .

$$9 \mid \left(-\frac{1}{3}\right) = 9 \cdot (-3) = -27$$

Propiedades: P6, P4.

4. Comprobamos el cociente multiplicándolo por el divisor.

$$(-27) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 9$$

Propiedades: P6, P4.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

El resultado del apartado c) es -27 . Dividir por un tercio triplica el valor absoluto; no lo divide entre tres.



PARADA DE CONTROL · SOLUCIONES PASO A PASO

06 Multiplicar fracciones

ENUNCIADO

Multiplicá y simplificá.

$$\frac{14}{15} \times \frac{9}{7}$$

RESOLUCIÓN

1. Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí.

$$\frac{14}{15} \times \frac{9}{7} = \frac{14 \cdot 9}{15 \cdot 7} = \frac{126}{105}$$

Propiedades: P6.

2. El máximo común divisor de 126 y 105 es 21. Dividimos ambos por 21.

$$\frac{126}{105} = \frac{126 \div 21}{105 \div 21} = \frac{6}{5}$$

Propiedades: P5.

3. También se puede simplificar antes de multiplicar: 14 y 7 por 7; 9 y 15 por 3.

$$\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 1} = \frac{6}{5}$$

Propiedades: P5, P6.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

6/5 es irreducible y vale 1,2. Las cancelaciones se hacen entre factores del numerador y del denominador.



07 Dividir fracciones

ENUNCIADO

Dividí y simplificá.

$$\frac{5}{12} \mid \frac{25}{18}$$

RESOLUCIÓN

1. La fracción divisora no es cero. Invertimos únicamente esa fracción y cambiamos la división por un producto.

$$\frac{5}{12} \mid \frac{25}{18} = \frac{5}{12} \cdot \frac{18}{25}$$

Propiedades: P6.

2. Multiplicamos numeradores y denominadores.

$$\frac{5 \cdot 18}{12 \cdot 25} = \frac{90}{300}$$

Propiedades: P6.

3. Simplificamos dividiendo numerador y denominador por 30.

$$\frac{90}{300} = \frac{3}{10}$$

Propiedades: P5.

4. Comprobamos multiplicando el cociente por la fracción divisora.

$$\frac{3}{10} \cdot \frac{25}{18} = \frac{75}{180} = \frac{5}{12}$$

Propiedades: P6, P5.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

El resultado es 3/10. Invertir la primera fracción cambiaría el problema.



08 Sumar y restar fracciones

ENUNCIADO

Calculá las dos operaciones.

$$a) \frac{7}{10} + \frac{11}{15} \quad b) \frac{5}{12} - \frac{1}{8}$$

RESOLUCIÓN

1. a) Buscamos un denominador común: el mínimo común múltiplo de 10 y 15 es 30.

$$\frac{7}{10} = \frac{21}{30}; \quad \frac{11}{15} = \frac{22}{30}$$

Propiedades: P5, P7.

2. Sumamos los numeradores y conservamos el denominador.

$$\frac{21}{30} + \frac{22}{30} = \frac{43}{30}$$

Propiedades: P7.

3. b) El mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24.

$$\frac{5}{12} = \frac{10}{24}; \quad \frac{1}{8} = \frac{3}{24}$$

Propiedades: P5, P7.

4. Restamos los numeradores.

$$\frac{10}{24} - \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Ambos resultados son irreducibles. En una suma o resta no se suman ni restan los denominadores.



09 Convertir decimales a fracciones

ENUNCIADO

Pasá a fracción: a) 0,6; b) 0,727272...

En b), el enunciado de la web muestra 0,72 seguido del período 72: representa el mismo decimal periódico 0,727272...

RESOLUCIÓN

1. a) Hay una cifra decimal. Escribimos seis décimos y simplificamos por 2.

$$0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Propiedades: P8, P5.

2. b) Llamamos u al número periódico. Al multiplicar por 100, el período se desplaza dos lugares.

$$u = 0,\overline{72}; \quad 100u = 72,\overline{72}$$

Propiedades: P8.

3. Restamos las dos igualdades: las partes decimales repetidas se cancelan.

$$100u - u = 72; \quad 99u = 72$$

Propiedades: P8, P3.

4. Dividimos por 99 y simplificamos por 9.

$$u = \frac{72}{99} = \frac{8}{11}$$

Propiedades: P5, P8.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

0,72 exacto sería 18/25. El período cambia el número y, por tanto, su fracción.



10 Convertir fracciones a decimales

ENUNCIADO

Indicá si el decimal es finito o periódico y calculá.

$$a) \frac{7}{25} \quad b) \frac{9}{11}$$

RESOLUCIÓN

1. a) Transformamos el denominador 25 en 100 multiplicando ambos términos por 4.

$$\frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 0,28$$

Propiedades: P5, P8.

2. El decimal es finito: el denominador irreducible es $25 = 5^2$.

$$25 = 5^2$$

Propiedades: P8.

3. b) En la división 9 entre 11, 90 entre 11 da 8 y deja resto 2. Luego 20 entre 11 da 1 y deja resto 9.

$$90 = 11 \cdot 8 + 2; \quad 20 = 11 \cdot 1 + 9$$

Propiedades: P8.

4. El resto 9 se repite; por eso vuelven a aparecer las cifras 81. El decimal es periódico.

$$\frac{9}{11} = 0,818181... = 0,\overline{81}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La fracción $9/11$ es irreducible y su denominador incluye el primo 11; su decimal no puede ser finito.



RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Conjuntos numéricos

Los naturales son enteros; los enteros son racionales; los racionales y los irracionales son reales. Un decimal finito es racional. La raíz cuadrada de un entero positivo que no es cuadrado perfecto es irracional.

$$N \subset Z \subset Q \subset R$$

P2 Propiedades de las operaciones

Conmutativa: cambia el orden. Asociativa: cambia la agrupación, conservando el orden. Distributiva: multiplica cada término de una suma o resta.

$$a+b=b+a; \quad (ab)c=a(bc); \quad k(m+n)=km+kn$$

P3 Suma, resta y opuesto

Restar un número equivale a sumar su opuesto. Con signos diferentes, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del de mayor valor absoluto.

$$a-b=a+(-b)$$

P4 Signos en productos y cocientes

Signos iguales dan resultado positivo; signos diferentes, negativo. En una división, el divisor debe ser distinto de cero.

$$(-a)(-b)=ab; \quad a \mid (-b) = -(a \mid b)$$



Eta­pa 1 · Números y operaciones

RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Fracciones equivalentes

Multiplicar o dividir numerador y denominador por un mismo número no nulo conserva el valor. Para simplificar por división entera, se usa un divisor común.

$$\frac{a}{b} = \frac{ka}{kb}, \quad b \neq 0, k \neq 0$$

P6 Producto y división de fracciones

Se multiplican numeradores y denominadores. Dividir por una fracción no nula equivale a multiplicar por su recíproco. Las cancelaciones corresponden a factores.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; \quad \frac{a}{b} \mid \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

P7 Suma y resta de fracciones

Se llevan las fracciones a un denominador común, por ejemplo el mínimo común múltiplo. Luego se operan los numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{m} \pm \frac{b}{m} = \frac{a \pm b}{m}$$

P8 Decimales finitos y periódicos

Un decimal finito se escribe sobre una potencia de 10. Para uno periódico, desplazar el período permite eliminarlo por resta. Una fracción irreducible tiene decimal finito si su denominador solo tiene factores primos 2 y 5.

$$0,6 = \frac{6}{10}; \quad 0,\overline{72} = \frac{72}{99}$$