

ニホンウナギ

Anguilla japonica

採集場所：茨城県



分類：条鰭綱ウナギ目ウナギ科

分布：東アジア

生息環境：河川の中流から下流

入部日付：2026/3

評価：絶滅危惧種 I B類 (環境省)

宇高生物部の不動のシンボル。先代が脱走によりお亡くなりになられたので本個体は二代目。

アオダイショウ

Elaphe climacophora

採集場所：那須塩原



分類：爬虫綱有鱗目ナミヘビ科

分布：北海道、本州、四国、九州

生息環境：森林、住宅街

入部日付：

評価：**要注目** (栃木県)

全長最大2mにもなる日本本土最大の蛇。幼蛇はマムシに似ている模様があるが成長するにつれて消えていく。体色は緑褐色であるが個体差が大きく、本個体は非常に暗化した個体。山口県ではアルビノの個体群が確認されている。

ヤエヤマサソリ

Liocheles australasiae

自己繁殖個体



分類：クモ綱サソリ目

オホシサソリ科

分布：八重山諸島、東アジア～オセ
アニアにかけて広く分布

生息環境：森林

入部日付：6/1

評価：なし

メスだけで繁殖することができるサソリ。いままで国内で本種のオス個体は発見されていない。最大でも3cmほどで、人間には毒はほぼ効かず無害なサソリ。

金魚

Carassius auratus

購入個体



分類：条鰭綱コイ目コイ科

起源：中国

原種の生息環境：池や河川など

入部日付：2024/8

評価：なし

この個体は「和金」と呼ばれる品種で、フナをそのまま赤色に染めたような見た目が特徴。普段はスペースの都合で釜川水槽に入っていて、水槽内で色彩的に紅一点をしている。性別は不明。

ヨツボシケンキシイ

Glischrochilus japonicus

採集場所：宇都宮



分類：昆虫綱甲虫目ケンキシイ科

分布：北海道～奄美大島

生息環境：樹液木

入部日付：2024/11

評価：なし

小型だが、大型個体はクワガタのような顎を持つ虫。
成虫だけでなく幼虫も樹液を食べて過ごし、幼虫は水気を多く含んだ泥のような環境でも生活できる。飼育下だとバナナが餌によい。

ムカシツチガエル

Glandirana reliquia

採集場所：那須



分類：両生綱無尾目アカガエル科

分布：関東～東北太平洋沿岸

生息環境：水田、池、溪流の周り等

入部日付：7/12

評価：絶滅危惧Ⅱ類 (栃木県)

2022年にツチガエルから分かれて新種記載された。ツチガエルとおたまじゃくしの状態でないと識別できないほど見た目が似ている。別名のイボガエルの通り体表がぼこぼこしていて非常に可愛い。

ラテラリスノコギリクワガタ

Prosopocoilus lateralis lorquini

自己繁殖個体



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：スラウェシ島

生息環境：森林

入部日付：8/10

評価：なし

フィリピンとスラウェシ島付近という特徴的な分布をするクワガタ。多くの亜種に分かれ、どの亜種も美しい模様をもつが、本亜種は上翅がクリーム、黒、赤の三色になる。

ヒライソガニ

Gaetice depressus

採集場所：大洗町



分類：甲殻綱十脚目イワガニ科

分布：北海道～九州

朝鮮半島、中国北部、台湾

生息環境：磯

入部日付：2024/10

評価：なし

茨城の磯で最も一般的に見られるカニ。

食欲はかなり旺盛で、餌をあげると大喧嘩が始まる。

ハサミはかなり立派なため、挟まれるとかなり痛い。

シマヘビ

Gaetice depressus

採集場所：宇都宮高校



分類：爬虫綱有隣目ナミヘビ科

分布：北海道～九州

生息環境：農地、河川敷、草地など

入部日付：7月

評価：**要注目** (栃木県)

名前の通りの縞模様と赤い目が特徴の蛇。脱走の名人で、重石も使って嚴重に蓋をしても、把握しているだけで過去2回の前科を持つ。人見知りなので出てきているところを見れるとラッキー。

ニホンアカガエル

Rana japonica

採集場所：宇都宮



分類：両生綱無尾目アカガエル科

分布：本州、四国、九州

生息環境：湿地周辺、森林

入部日付：8/16

評価：準絶滅危惧 (栃木県)

田や林などでみられる。繁殖期以外は水場から離れた場所にもいることがあり、湿気もあまりない場所で見つかることもある。

変温動物だが、早い地域だと12月に繁殖が始まり、ピークは2月。

サワガニ

Geothelphusa dehaani

採集場所：宇都宮



分類：甲殻綱十脚目サワガニ科

分布：北海道～トカラ列島

(北海道産は在来か不明)

生息環境：澄んだ小川

入部日付：8/16

評価：**要注目** (栃木県)

一生を淡水で過ごすカニ。子は直接カニの姿で産む。澄んだ小川の石の下などに多い。個体ごとに色は様々で、赤や青が強いものも存在する。

オオゴキブリ

Panesthia angustipennis spadica

採集場所：京都市



分類：昆虫綱網翅目オオゴキブリ科

分布：本州～九州

生息環境：森林

入部日付：8/7

評価：**要注目** (栃木)

名前の通り大きいゴキブリ。森林で暮らし、家の中に侵入してくることはほぼないので安心して温かい目で見守ってほしい。
大型個体は外国産にも劣らない迫力があるが、いまいち人気がない。

シロヘリミドリツノカナブン

Dicronorhina derbyana

購入個体



分類：昆虫綱甲虫目コガネムシ科

分布：サハラ砂漠以南アフリカ

生息環境：森林

入部日付：8/10

評価：なし

様々な体色や模様を持つ美しいカナブン。
あまり大きくないがオスの頭には角がある。
オスの成虫は成熟すると果物のようないいにおいがする。

ファブリースノコギリクワガタ

Prosopocoilus fabricei takakuwai



購入個体

分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：スラ諸島、ハルマヘラ島

生息環境：森林

入部日付：8/10

評価：なし

筆で描いたようなと形容される背中の模様が特徴のクワガタ。

二亜種に分けられ、この亜種のほうが大型になる。

飼育も比較的簡単なうえ、色彩や模様も美しく根強い人気がある。

シマスズメダイ

Abudefduf sordidus

採集場所：大洗町



分類：条鰭綱スズキ目
スズメダイ科

分布：八丈島～インド、太平洋沿岸

生息環境：岩礁帯や潮だまり

入部日付：2024/10

評価：なし

暖流に載って茨城までやってきたと考えられる、。
正確は凶暴で、なおかつ泳ぎも早く、ほかの魚を襲ってしまうこと
もある。可愛い顔に騙されてはいけない。

ミズカマキリ

Ranatra chinensis

採集場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱カメムシ目タイコウチ科

分布：日本全国

生息環境：ため池、川、プールまで
あらゆる水域

入部日付：7/9

評価：なし

水中でオタマジャクシなどをとらえて暮らしている。

陸上のカマキリと姿が似ているが、分類は違う。泳ぐのが遅く、捕らえるのは容易。力も弱い。

メキシカンファイヤーレッグ

Brachypelma boehmei

購入個体



分類：クモガタ綱クモ目
オオツチグモ科

分布：メキシコ南部

生息環境：乾燥した低木地帯

入部日付：2025年8月

評価：なし

見た目の似ている同属の別種が映画やゲームなどに出ていることから、タランチュラと聞くとこの姿を思い浮かべる人も多いだろう。大人しく丈夫、タランチュラらしい体型と良い蜘蛛である。

グリーンボトルブルー

Chromatopelma cyaneopubescens

購入個体



分類：クモガタ綱クモ目

分布：ベネズエラ北部

生息環境：乾燥地域の樹上

入部日付：2025年4月

評価：なし

名にある通り体色に青と緑が入っていて鮮やかな蜘蛛である。体長16cm程度とタランチュラとしては手ごろな大きさであり、巣を作り見栄えがいい上に大人しいと、初心者にもおすすめの種である。

チャコジャイアントゴールデンストライプ

Grammostola pulchripes

購入個体



- ・分類：クモ類クモ目筋状形類テラフォシ科
- ・分布：アルゼンチン、パラグアイ
- ・生息環境：地表性、乾燥した地域
- ・入部日付：2024年6月1日/2025年5月15日
- ・評価：なし

その名の通り、足の節には金色の縦模様が入っている。成長スピードは遅いが、2～3年で20～22cmと大型になる。タランチュラの中でも比較的小となしく、初心者にも扱いやすい種である。

セイブシシバナヘビ

Heterodon nasicus

購入個体



分類：爬虫綱有隣目ナミヘビ科

分布：アメリカ合衆国、カナダ

生息環境：草原～砂漠

入部日付：2025年6月

評価：なし

大人しく、オスの最大体長60cm程度と蛇にしては小型。そして何より特徴的なのは「猪鼻」の名前の由来にもなった鼻先の形により生まれる愛嬌。そのうえ飼いやすく、どこをとっても最高の蛇である。

トウキョウダルマガエル

Pelophylax porosus porosus

採集場所：下野市



分類：両生綱無尾目アカガエル科

分布：仙台平野～関東平野にかけて

生息環境：田、湿地など

入部日付：2024年9月

評価：準絶滅危惧(栃木県)

準絶滅危惧(環境省)

トノサマガエルとよく似ているが、腹に黒っぽいまだら模様がある、背中の隆条が小さい傾向があるなどの違いがある。緑色の模様があつたりなかったりする。

トノサマガエル

Pelophylax nigromaculatus

採集場所：福島県



分類：両生綱無尾目アカガエル科

分布：中国大陆、朝鮮半島、関東平野、仙台平野等を除く日本

生息環境：田、湿地など

入部日付：8月16日

評価：準絶滅危惧(環境省)

その名前は身の危険を感じると、空気を吸い込んで体を膨らませて体を大きく見せようとする姿が偉そうにふんぞり返る殿様を連想させたことという説がある。大型の個体は小型のヘビを捕食することもあるとか。

ヒガシニホンアマガエル

Dryophytes leopardus

採集場所：宇高



分類：両生綱無尾目アマガエル科

分布：東日本

生息環境：水辺、森林など

入部日付：2025年3月

評価：なし

一番身近な種。2025年にニホンアマガエルのうち東日本に生息する種が別種として発表された。ニホンアマガエルとは後ろ足の模様などが異なることが多いとされているが、完璧な見分け方ではない。

マレーゴビー

Oxyleotris marmoratus

購入個体



分類：条鰭綱スズキ目

ノコギリハゼ科

分布：インドシナ半島、フィリピン、
インドネシア

生息環境：河川、沼地、浸水林

入部日付：2025.8

評価：低懸念 (IUCN)

東南アジアに生息する世界最大のハゼで、大きいものは50cmを超える。シーラカンスのような迫力のある顔をしているが古代魚というわけではない。現地では食用魚として高値で取引されている。

ニホンイシガメ

Mauremys japonica

購入個体



分類：爬虫綱カメ目イシガメ科

分布：日本

生息環境：河川、池など

入部日付：2024年10月

評価：準絶滅危惧（環境省）

江戸時代以前からペットとして親しまれてきたカメ。
近年では生息域の開発や乱獲、外来種の影響で数を減らしている。
この個体は人に慣れていて、近づくと餌を欲しそうに寄ってくる。

ニホンスッポン

Pelodiscus japonicus

購入個体



分類：爬虫綱カメ目スッポン科

分布：日本

生息環境：池、河川など

入部日付：2025年6月1日

評価：なし

長らくチュウゴクスッポンだと考えられてきたが、別種だと判明。口（吻）が長く伸びている。甲羅は柔らかいく、腹側は白い。このサイズでも噛まれるとまあまあ痛い。ずっと砂に潜っていて、この1年水替え以外でマトモに姿を見ていない。

ホトケドジョウ

Lefua echigonia

採集場所：那須



分類：コイ目フクドジョウ科ホトケ
ドジョウ属

分布：青森県・中国地方西部を除い
た本州、四国東部に分布

生息環境：流れの緩やかな細流の砂
泥底や小さな水路、水たまりに住む

入部日付：2025年8月

評価：絶滅危惧種 I B 類 (環境省)

他のドジョウ類より太短い身体や中層を泳ぐ生態からタニノボリ
科に含まれることもある。水路整備の影響を受けて近年急激に数
を減らしている。

ヒョウモントカゲモドキ

Eublepharis macularius

購入個体



分類: トカゲ亜目 トカゲモドキ科

分布: パキスタン アフガニスタン

イラン、インドの北西部

生息環境: 乾燥した岩場や荒地、砂礫
地帯など、比較的乾燥した環境

入部日付: 2024 9/1

品種改良により、さまざまな色の個体がいる。この個体は、スーパーマックスノーという種類で、目が真っ黒で可愛らしい見た目であることから人気である。

アフリカツメガエル

Xenopus laevis

おそらく購入個体



分類：両生綱無舌亜目
無尾目ピパ科

分布：アフリカ中南部
静岡などに移入

入部日付：不明

評価：外来種

陸上に住む変えると異なり舌を用いず、両手で掻き込むようにして餌を食べる。現在生物部最古参。

名前は鶏肉で、水から出すと本当に鶏肉に見える。

アメリカザリガニ

Procambarus clarkii

採集場所：釜川

分類：エビ綱十脚目ザリガニ科

分布：北米

生息環境：水さえあればどこでも

入部日付：2025年8月

評価：条件付き特定外来生物



1920年ごろに食用として輸入されたウシガエルの餌として日本に侵略。100年もたつがその勢いは今も健在。小規模な生態系では特に脅威。ロブスターに近い仲間なので泥抜きさえすれば美味しく食べられる。

ミシシッピアカミミガメ

Trachemys scripta

採集場所：釜川



分類：爬虫綱カメ目ヌマガメ科

分布：北米

生息環境：池、川、沼など

入部日付：2024.5.19

評価：条件付き特定外来生物

ベビーサイズがミドリガメとして売られ、成長して大きくなりしすぎたものが自然に放された。圧倒的な丈夫さは勢力拡大の一因となっている。

アカオビシマハゼ

Tridentiger trigonocephalus

採集場所：大洗町



分類：条鰭綱スズキ目ハゼ科
チチブ属

分布：朝鮮半島、中国、北海道・
本州・四国

生息環境：内湾、潮間帯
入部日付：2025/7

磯でしばしば見かけるハゼ。赤い線が入っていることが特徴。
磯でみるときは白いが、部室に持ち帰ると大体黒化する。永続的な
ものではなく、その時々で体色が変わる。

トカラノコギリクワガタ

Prosopocoilus dissimilis elegans

自己繁殖個体



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：トカラ列島

生息環境：森林

入部日付：2024/7/7

評価：十島村条例により採集禁止

国内のクワガタでは珍しい明るい色により、根強い人気を持つクワガタ。本州のノコギリクワガタとは別種。この個体は採集が禁止される以前に採集された個体の子孫のため、違法採集したわけではない。

パプアキンイロクワガタ

Lamprima adolphinae

自己繁殖個体



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：ニューギニア島

生息環境：草地

入部日付：2024/8/10

評価：なし

雌雄ともに多彩な色が存在する美しいクワガタ。特に青色のものや、見る角度によって光沢が変わるような個体は人気が高い。オスは前足にある扇形の突起で植物を切断し、汁を吸う。

カブトムシ

Trypoxylus dichotoma septentrionalis

採集場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱甲虫目コガネムシ科

分布：日本全土

生息環境：雑木林

入部日付：2025/7

評価：なし

とても有名な昆虫ではあるが、小顔なのは案外知られていない。
宇高でも毎年たくさんの個体を目にするが、クワガタよりも活動期間が短い。海外ではかなり人気でそれなりの価格で取引される。

コクワガタ

Dorcus rectus

採捕場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：日本全国、中国、朝鮮半島

生息環境：生息木があればどこでも

入部日付：2024年11月

評価：なし

宇高のようなちょっとした緑でも増える最も身近なクワガタ。
大型個体の顎は立体感が出てなかなか格好いい。盛夏よりも初夏、
初秋のほうが見かけやすい。

ニホンヤモリ

Gekko japonicus

採捕場所：宇高

分類：爬虫綱有隣目ヤモリ科

分布：秋田県～九州、朝鮮半島、
中国東部

生息環境：人家やその周辺

入部日付：6月上旬



和名、学名ともに日本(japonicus)と付くが、平安時代に移入した外来種だと考えられており、年々北上している。かなり色を変えることができる。宇高内でよくみられる。

ヒガシニホントカゲ

Plestiodon finitimus

採捕場所：部員自宅



分類：爬虫綱有隣目スキנק科

分布：北海道～本州東部

生息環境：森林、草地、市街地等

入部日付：4月

評価：絶滅危惧Ⅱ類(栃木県)

幼体が鮮やかな青色の尻尾を持つトカゲ。よく混同されるカナヘビと違って鱗がすべすべしている。宇高内での個体数はそれなりに多く、毎年部室前の庭で数多くの幼体が観察できる。

コオイムシ

Appasus japonicus

採捕場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱半翅目コオイムシ科

分布：日本全国、中国、朝鮮半島

生息環境：水田などの浅い水場

入部日付：7/14

評価：準絶滅危惧種 (環境省)

準絶滅危惧種 (栃木県)

主に貝類を捕食する。タガメと似るが、前足がより小さく、成虫の体長もかなり小さい。よく刺してくる。卵を背負うので子負い虫。

タイコウチ

Laccotrephes japonensis

採捕場所：宇都宮市



分類：昆虫綱半翅目タイコウチ科

分布：本州～沖縄島

生息環境：小川、水田など

入部日付：7/21

評価：なし

【説明】 浅めの水深を好むため学校のプールではあまり見かけない水生昆虫。肉食性で、水生生物以外でも水に落ちた小型の昆虫なども食べる。和名の由来は腕の動きが太鼓を打っているように見えることから。

タガメ

Lethocerus deyrollei

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱半翅目コオイムシ科

分布：本州～南西諸島、東アジア

生息環境：農薬の影響がない水田、
ため池、沼など

入部日付：2025/8/23

評価：絶滅危惧Ⅱ類 (環境省)

準絶滅危惧種 (栃木県)

特定第二種国内希少野生動物種

田んぼの王者。大きな前足で獲物を捉える。現在外来種や農薬の影響で激減している。特に西日本では深刻な状況である。
栃木県での個体数はそれなりに多い。

トビズムカデ

Scolopendra mutilans

採集場所：宇都宮高校



分類：唇脚綱オオムカデ目
オオムカデ科

分布：本州～沖縄

生息環境：森林、農地、住宅地など

入部日付：4月上旬

評価：なし

個体によって大きく色合いが異なり、近縁のアオズムカデとぱっと見で見分けるのは困難。害虫を食べてくれる虫でもあり、手を出さない限り襲われはしないので見つけてもそっと見守ろう。

ミヤコヒキガエル

Bufo gargarizans miyakonis

購入個体



分類：両生綱無尾目ヒキガエル科

分布：宮古諸島、沖縄島と大東諸島に移入

生息環境：森林、草地、人家周辺など

入部日付：7/7

評価：準絶滅危惧種 (環境省レッドリスト)

宮古島市自然環境保全条例保全種

国内外来種 (大東諸島、沖縄に移入)

オレンジ色の体色が特徴の中型のヒキガエル。

アズマヒキガエルと白目に当たる部分の色がかなり異なり、それによって顔つきの印象もだいぶ変わるのでぜひ見比べてほしい。

アルゼンチンモリゴキブリ

Blaptica dubia

自己繁殖個体



分類：昆虫綱網翅目
オオゴキブリ科

分布：南米

生息環境：森林

入部日付：4/20ごろ

評価：なし

デュビアという流通名で餌用として広く親しまれているゴキブリ。卵ではなく直接幼虫を産む。幼虫はあまりゴキブリらしくない見た目をしているが、成虫はちゃんとゴキブリ。

ハイイロゴキブリ

Nauphoeta cinerea

採捕場所：マダガスカルゴキブリのケース内



分類：昆虫綱網翅目

ハイイロゴキブリ科

分布：熱帯地方、南西諸島(移入)

生息環境：人家、森など

評価：外来種

入部日付：不明

部室の別のゴキブリの水槽内で気が付いたら増えていた。
かつて爬虫類の餌として使われていたのが起源だと考えられるが、
壁を登るためその座はレッドローチにとって代わられた。

トルキスタンゴキブリ

Periplaneta lateralis

購入個体



分類：昆虫綱網翅目ゴキブリ科

分布：世界中、兵庫県など(移入)

生息環境：乾燥環境、人家など

入部日付：不明

評価：**外来種** (国内一部地域に移入)

爬虫類などの餌用として、レッドローチの名で広く出回っているゴキブリ。翅が生えているのがオスの成虫で、黒いのがメスの成虫。見た目と匂いと脱走時の被害を除いてはかなり餌として優秀な虫。

アズマヒキガエル

Bufo japonicus formosus

採捕場所：部員の友人宅



分類：両生綱無尾目ヒキガエル科

分布：近畿地方以東、山陰地方

北海道に移入

生息環境：森林、農地、公園など

入部日付：3/20

評価：準絶滅危惧種 (栃木県)

いかつい見た目にだが、すぐ人の存在に慣れ、人が来ると餌がもらえると学習すると寄ってくるなど愛らしいカエル。昨年度から宇高で繁殖を始めた。カエル嫌いの人にこそ、ちゃんと見てほしい種類。

フナ的一种

Carassius sp

採捕場所：釜川



分類：条鰭綱コイ目コイ科

分布：東北地方の太平洋側、関東

生息環境：河川の全域

入部日付：2023.8. 6

評価：準絶滅危惧種 (栃木)

絶滅危惧Ⅱ類 (環境省)

(キンブナならば)

フナ類は正確な同定が困難を極めるため、この表記となっている。
一番大きなフナは現在の釜川水槽で最古参で、釜川水槽で起きた
数々のトラブルをすべて乗り越えているかなりの猛者。

カラドジョウ

Misgurnus dabryanus

採捕場所：釜川



分類：条鰭綱コイ目ドジョウ科

分布：中国東部、朝鮮半島

本州各地に移入

生息環境：ドジョウと同じ

入部日付：不明

評価：**要注意外来生物**

外来のドジョウではあるが、在来のものとの見分けは困難。
在来ドジョウと交雑し、雑種も生まれるなど生態系への影響もみられる。釜川中流域でみられるドジョウの大半は本種か交雑個体。

夕毛ロコ

Gnathopogon elongatus elongatus

採捕場所：釜川



分類：条鰭綱コイ目コイ科

分布：日本全国

生息環境：主に田んぼや用水路

採捕場所：釜川

入部日付：2024.8. 10

用水路、田んぼでよく見かける魚。泥が堆積した環境に生息しているが、身は泥臭くなくて非常においしい。比較的流れの緩やかな場所を好むのか、釜川本流よりも周りの用水路でよくみられる。

ヒガシシマドジョウ

Cobitis sp.

採集場所：那須塩原



分類：条鰭綱コイ目ドジョウ科

分布：中部地方以东の本州

生息環境：砂底や砂礫底

入部日付：2024年8月

評価：準絶滅危惧種（栃木県）

白を基調にした模様が美しい小型のドジョウ。砂ごと口の中に入れ、餌を食べる姿が「砂を食む」ようにみえることから「スナハビ」「スナサビ」とも呼ばれる。

ギバチ

Tachysurus tookiensis

採集場所：釜川



分類：条鰭綱ナマズ目ギギ科

分布：富山以東の本州、神奈川

生息環境：河川の物陰

入部日付：2024．5月

評価：準絶滅危惧種（栃木県）

絶滅危惧種Ⅱ類（環境省）

ずっと土管に入っていておとなしそうに見えるが、ほかの魚と一緒に水槽に入れるとその魚を殺してしまうこともあるなど凶暴。単独で飼うには、餌付きもよく飼いやすい魚である。

セルフインプレコ

Pterygoplichthys gibbiceps

購入個体



分類：条鰭綱ナマズ目ロリカリア科

分布：南米アマゾン川全域

生息環境：河川の岩場

入部日付：2024.5. 29

評価：国外外来種（沖縄県を中心に定着）

大きな背びれが名前の由来。10年以上生き、最大で60cm程まで成長する。現地では食用になっている。

タイヤトラックスパイニーイール

Mastacembelus favus

購入個体



分類：条鰭綱タウナギ目トゲウナギ科

分布：南～東南アジア広域

生息環境：石の転がる川など

入部日付：2024.2

評価：低懸念 (IUCN)

【説明】メコン川流域では漁も行われ、市場に食材として並ぶ。もともと隠れてばかりで全体像を見られることはなかったが、最近は餌を見ると水面まで上がってくるまで慣れた。不思議な模様をぜひ堪能してほしい。

シノドンティス・バテンソーダ

Synodontis batensoda

購入個体



分類：常鰭綱ナマズ目サカサナマズ科
シノドンティス属

分布：ナイル川水系、西アフリカ

生息環境：河川の低層

入部日付：2024/1/6

ときどき逆さまになって泳ぐ姿を観察できる。逆さに泳ぐ理由はわかっていない。逆さに泳いだままほかの魚と喧嘩することもある。

カワムツ

Candidia temminckei

採集場所：釜川



分類：条鰭綱コイ目コイ科

分布：中部地方以西、朝鮮半島、
関東地方、宮城県に移入

生息環境：河川の全域

入部日付：7/20

評価：**国内外来種**

アユの放流に混ざりこみ関東地方に拡散した。

採集時は鮮やかな色彩をしているが、水槽内だと淡い色彩になる。
草の陰などに隠れるため、そのような場所を狙うと取りやすい。

ウグイ

Pseudapius hakonesius

採捕場所：釜川

分類：硬骨魚綱コイ目コイ科

分布：日本全土、朝鮮半島、ロシア

生息環境：河川のいたるところ

入部日付：7/20

評価：なし



通常時は銀色だが、春になると婚姻色で腹側がア鮮やかな赤になる。一緒の水槽に入れているほかの魚に比べてなぜか痩せやすいため、水槽全体として餌を多めにあげている。

オイカワ

Opsariichthys platypus

採集場所：釜川



【通常】



【オスの婚姻色】

分類：硬骨魚綱コイ目コイ科

分布：関東以西本州、朝鮮半島、
中国一部

生息環境：河川の中～下流

入部日付：7/20

評価：なし

通常時でも独特な模様と光沢をもち美しいが、夏になると繁殖期を迎え、オスは青を基調とした美しい色になる。
婚姻色は警戒心が強く、かなり採集がしにくい。

マダガスカルゴキブリ

Gromphadorrhina laevigata

おそらく購入個体



分類：昆虫綱網翅目

オオゴキブリ科

分布：マダガスカル島

生息環境：森林

入部日付：不明

評価：なし

宇高生物部のある意味名物となっているゴキブリ。
触ると墳気音で威嚇する。オスの成虫は角が生えており、喧嘩する
ようだがまだ見たことがない。昨年度のG-1グランプリ優勝種。

ノコギリクワガタ

Prosopocoilus inclinatus

採捕場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：日本全土、朝鮮半島、中国

生息環境：雑木林

入部日付：2025年7月

評価：なし

栃木県の平野部でも普通にみられるクワガタ。
宇高での個体数はかなり多い。血の気が多く、同種多種問わずほか
の虫と同居させるのは危険。

ナミゲンゴロウ

Cybister japonicus

採集場所：福島



分類：甲虫目ゲンゴロウ科

分布：北海道、本州、四国、九州

生息環境：自然の残った里山の沼やため池

入部日付：2024年7月29日

評価：絶滅危惧2類 (栃木県)

絶滅危惧2類 (環境省)

全国各地で個体数が減っている

特に西日本で深刻

里山を代表する昆虫だが、最近ではほとんど見られなくなった。同所的に生息する他のゲンゴロウよりも明らかに大型。匂いに敏感で、弱った魚や死んだ魚の匂いを感じるとソワソワし出す。集団でエサを食べる。

アカハライモリ

Cynops pyrrhogaster

採捕場所：那須塩原



分類：両生綱有尾目イモリ科

分布：東北地方～北関東

生息環境：田、池など

入部日付：8/1

評価：絶滅危惧Ⅱ類(栃木県)
準絶滅危惧(環境省)

水中で生活し続けると思われがちだが、生後5～6か月の幼体は上陸し、その後3～5年後水域に戻る。
フグと同じ毒を持っているが、人が触れた程度では普通影響は無い。

ナベカ

Omobranchus elegans

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目ギンポ亜目
イソギンポ科

分布：北海道南部以南九州南部まで、
西太平洋

生息環境：タイドプール、岩礁

入部日付：2026/4

磯で一般的にみられる魚。気が強いうえに好奇心も強く、ほかの魚を齧ってしまうこともしばしば。

かわいらしい見た目をしているが牙を持ち噛みついてくることも。

アカオビシマハゼ

Tridentiger trigonocephalus

採集場所：大洗町



分類：条鰭綱スズキ目ハゼ科
チチブ属

分布：朝鮮半島、中国、北海道・
本州・四国

生息環境：内湾、潮間帯
入部日付：2025/7

磯でしばしば見かけるハゼ。赤い線が入っていることが特徴。
磯でみるときは白いが、部室に持ち帰ると大体黒化する。永続的な
ものではなく、その時々で体色が変わる。

ショウジンガニ

Guinusia Dentipes

採集場所：大洗町



分類：軟甲綱十脚目ショウジンガニ科

分布：岩手県以南から九州、奄美群島、
韓国、中国北部

生息環境：潮間帯から水深20mの岩礁

入部日付：2026年7月30日

評価：なし

磯に普通に生息しており、採集は潮だまりを網でガサガサしてれば採れるが、すばしっこいため一度逃すと難しい。磯のカニの中では大型だが、ハサミが小さめ。エサによく食いつき、環境変化に強いので飼いやすい。

金魚

Carassius auratus

購入個体



分類：条鰭綱コイ目コイ科

起源：中国

原種の生息環境：池や河川など

入部日付：2024/8

評価：なし

この個体は「和金」と呼ばれる品種で、フナをそのまま赤色に染めたような見た目が特徴。普段はスペースの都合で釜川水槽に入っていて、水槽内で色彩的に紅一点をしている。性別は不明。

ヨツボシケンキシイ

Glischrochilus japonicus

宇都宮高校で採集した個体から累代



分類：昆虫綱甲虫目ケンキシイ科

分布：北海道～奄美大島

生息環境：樹液木

入部日付：2024/11

評価：なし

小型だが、大型個体はクワガタのような顎を持つ虫。
成虫だけでなく幼虫も樹液を食べて過ごし、幼虫は水気を多く含んだ泥のような環境でも生活できる。飼育下だとバナナが餌によい。

グアテマラタイガーランブ

Davus pentaloris



購入個体

分類：蜘蛛型綱クモ目オオツチグモ科

分布：グアテマラ～メキシコ

生息環境：森林？

入部日付：2025/12/9

評価：なし

赤色の模様が目立つタランチュラで、腹部の虎のような模様が流通名の元となっている。これでもタランチュラとしては小型の部類。

アンタエウスオオクワガタ

Dorcus antaeus antaeus

自己繁殖個体、インド産



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：ネパール、インド北部、ブータン、ミャンマー北部、中国(チベット自治区)

生息環境：森林

入部日付：2024/10

評価：なし

和名にもオオクワガタとつき、見た目も似ているが、国産のオオクワガタとは別のグループ。流通当初は数百万の値が付いたとされる。顎と体の太さから愛好家からの人気が非常に高い種。

ルイスツノヒョウタンクワガタ

Nigidius lewisi

採集場所：沖縄島名護市



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：和歌山県南部、四国、九州、
南西諸島、東南アジア

生息環境：森林

入部日付：2025/12/10

評価：なし

特異な生態をしたクワガタで、集団生活をし、また成虫が肉食性であり、多種の幼虫などを捕食する。実は長寿であり、飼育下で7年ほど生きたという話もある。成虫の雌雄の見た目はほとんど同じ。

ハスタートノコギリクワガタ

Prosopocoilus hasterti moinieri

購入個体、マライタ島産



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：マライタ島(ソロモン諸島)

生息環境：森林

入部日付：2026/2

評価：なし

ヒラタクワガタの仲間にも似ているがっちりとした体形と短い顎を持つ種。三亜種に分けられ、原名亜種は全身真っ黒、ガダルカナル亜種は上翅が茶色になり、本亜種は上翅にオレンジの縁取りが入る。

ラフェルトノコギリクワガタ

Prosopocoilus lafertei

自己繁殖個体、タンナ島産



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：ニューカレドニア島，ロイヤルティ諸島，ニューヘブリデス諸島

生息環境：森林

入部日付：2025/8

評価：なし

がっしりとした体形とクリーム色の翅が特徴のクワガタ。現地では非常に珍しく、初めて国内に入ってきたときは十数万円したらしいが、繁殖が容易なことから今では手軽に買える。

ニジイロクワガタ

Phalacrognathus muelleri muelleri

購入個体



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：オーストラリア

クイーンズランド州

生息環境：森林

入部日付：2026/1/3

評価：なし

世界一美しいクワガタとして有名なクワガタ。ほかのクワガタとは分類上の位置が異なる。多くの愛好家により様々な色の個体が生み出され、本個体はブラウンと呼ばれる茶色っぽい血統の個体。

スジブトヒラタクワガタ

Dorcus metacostatus

自己繁殖個体、奄美大島産



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：奄美大島、徳之島

生息環境：森林

入部日付：2025/8/10

評価：準絶滅危惧種(鹿児島県)

日本が世界に誇る特異なクワガタ。大型個体の背中にも名前の由来になった筋が残るという特徴を持つ。本個体はホワイトアイというアルビノの一種で、その名の通り目が白い。

リュウキュウカジカガエル

Buergeria japonica

採集場所：首里城



分類：両生綱無尾目アオガエル科

分布：トカラ列島～沖縄島

生息環境：森林や水場周辺

入部日付：2025/12/8ごろ

評価：なし

南西諸島に生息するカジカガエルの近縁種。カジカガエルより小型で、溪流以外の環境でも見られる。カジカガエル同様美しい声で鳴く。

ケラ

Gryllotalpa orientalis

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱直翅目ケラ科

分布：北海道～南西諸島

生息環境：土の中

入部日付：7/20

評価：なし

前脚が発達していて土を掘れるようになっており、基本的に土の中で過ごしている。ほった穴の中に水が入っても大丈夫のように泳げるし、成虫になると飛べるようになる。しかし飼育している個体は幼虫のためまだ飛べない。たまに掘っているのを見ることができる。

マーブルエンゼルフィッシュ

Pterophyllum scalare

購入個体



分類：スズキ目シクリッド科エンゼルフィッシュ属

分布：アマゾン川流域

生息環境：熱帯の淡水中

入部日付：2026/7/29

評価：なし

成魚になると10～15センチほどにもなる。結構気が強いので混泳には注意が必要。水質の変化に割と強いので飼いやすい。

クーリーローチ

Pangio kuhlii

購入個体



分類：コイ目ドジョウ科

分布：東南アジア

生息環境：淡水中

入部日付：2026/8/3

評価：なし

成魚になると8～10センチになる。夜行性で、昼間は流木の陰や砂の中に隠れていることが多い。穏やかな性格で混泳はしやすい。水槽内の汚れやフンなどを食べてくれるので助かる。

グローライトテトラ

学名*Hemigrammus erythrozonus*

購入個体



分類：カラシン目カラシン科
分布：南米ギアナ エセキボ川
生息環境：河川など
入部日付：2026/7/29
評価：なし

半透明の身体と一直線に入ったオレンジのラインが美しい。
飼育は容易であり、温和な性格のため混泳にも向いている。多数飼育すると群泳する姿を見ることが出来る。

ミナミヤモリ

Gekko hokouensis

採集場所：沖縄、恩納村



分類：有鱗目ヤモリ科ヤモリ属

分布：沖縄諸島

生息環境：常緑広葉樹林

入部日付：2025/12/8

評価：なし

成長すると10センチ以上になる。以前はオキナワヤモリと区別されていなかったが、2001年に別種であると判定された。オキナワヤモリと比べると、腹部に斑点がないといった違いがある。

ミズカマキリ

Ranatra chinensis

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱半翅目タイコウチ科

分布：日本全域

生息環境：水田や池沼など

入部日付：7/9

評価：なし

カマキリと姿は似ているが、分類は違う。
水生昆虫の割に泳ぐのは遅いが飛行能力は高い。
そのため、よくプールで見かける

タイコウチ

Laccotrephes japonensis

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱半翅目タイコウチ科

分布：本州～南西諸島

生息環境：小川、水田など

入部日付：7/21

評価：なし

肉食性の水生昆虫。

「タイコウチ」の由来は前脚の動きが太鼓を打っているように見えることからきている。

水質の悪化に強いいため飼いやすい。

コオイムシ

Appasus japonicus

採集場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱半翅目コオイムシ科

分布：北海道～九州

生息環境：水田などの浅い水域

入部日付：7/14

評価：準絶滅危惧種 (環境省)

準絶滅危惧種 (栃木県)

タガメに似ているが体長が小さい。

メスはパートナーのオスの背中に卵を産む。

「コオイムシ」の由来は、その姿が子を背負っているように見えることからきている。

ライギョ

学名 *channa argus*

採集場所：利根川



分類：条鰭綱キノボリウオ目
タイワンドジョウ科

分布：中国大陸及び朝鮮半島

生息環境：湖沼や河川の淀みなどの
止水域

入部日付：2026/6/20

評価：要注意外来生物

巨大な口で沢山の生き物を捕食する。

ライギョ

学名 *channa argus*

採集場所：利根川



分類：条鰭綱キノボリウオ目
タイワンドジョウ科

分布：中国大陸及び朝鮮半島

生息環境：湖沼や河川の淀みなどの
止水域

入部日付：2026/6/20


評価：要注意外来生物

巨大な口で沢山の生き物を捕食する。

ミドリフグ

学名*Dichotomysctere nigroviridis*

購入個体



分類：フグ目フグ科

分布：インド、タイ、ベトナムなど

生息環境：汽水域～海水域

入部日付：2026/4/27

評価：なし

幼魚の時期は汽水域に生息し、成長とともに海水域へ移動することが多い。野生個体は他の種のフグと同じように神経毒（テトロドキシン）を持っている。愛嬌のある動きと見た目が特徴的であり、ペットとしての人気も高い。

アベニーパファー

学名*Carinotetraodon imitator*

購入個体



分類：フグ目フグ科

分布：インド南西部、西ガーツ山脈
周辺

生息環境：川、池などの流れの緩やかな場所

入部日付：

評価：なし

世界最小級のフグ。平均的な個体は全長約2.5cm未満である。野生下では群れを成して行動することが多いが、気性が荒いため飼育下での混泳は推奨されない。愛らしい顔つきが特徴的。

シュレーゲルアオガエル

学名 *Zhangixalus schlegelii*

採集場所：栃木県塩谷町



分類：両生綱無尾目アオガエル科

分布：本州、四国、九州、五島列島

生息環境：湿地や水田

入部日付：

評価：準絶滅危惧種

説明

メレンゲ状の卵塊を土手や畔などの半地中に産むことで知られる。
背中に黄色の斑点を持つ個体もいる。

モリアオガエル

学名 *Zhangixalus arboreus*

採集場所：栃木県塩谷町

分類：両生綱無尾目アオガエル科

分布：茨城県を除く本州

生息環境：平地、山間の森林

入部日付：

評価：**要注意**（栃木県）



説明

神奈川、千葉県の個体は外来在来不明。背中に黒色の模様がある個体もいる。

メレンゲ状の卵塊を水にせり出た樹上に産むことが多い。産卵場所が天然記念物に指定されている場所もある。

ツチガエル

学名 *Glandirana rugosa*

採集場所：賀茂川



分類：両生綱無尾目アカガエル科

分布：東北地方太平洋側、関東地方、中部地方東部を除く本州、四国、九州

生息環境：水田、池、溪流など

入部日付：8/10

評価：なし

説明

幼生は幼生のまま越冬することがあることが知られている。

よく混同されるヌマガエルとは科から異なる。

ハワイで外来種として定着している。

マルガタゲンゴロウ

Graphoderus adamsii

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目ゲンゴロウ科

分布：北海道、本州、四国、九州

生息環境：自然豊かな池、沼

入部日付：5/5

評価：絶滅危惧II類

説明

とても数が減っている珍しい種類

カワアナゴ

学名 *Eleotris oxycephala*

採集場所：利根川



分類：条鰭綱ハゼ目カワアナゴ科

分布：茨城県と福井県を結ぶ線以南
の本州

生息環境：下流域から汽水域

入部日付：8/10

評価：なし

説明

美味しい魚である。オススメは天ぷら。あまり動かず、見た目も似ているので水槽内だと岩のように見える。

アゴハゼ

Chaenogobius annularis

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目ハゼ科

分布：北海道～種子島

生息環境：磯

入部日付：2026/7

評価：なし

磯でふつうにみられるハゼ。磯の生き物の中でも特に温度変化に強く、だいたいいつ行っても捕れる癒し枠。色彩は地味だが、模様の個体変異が大きくなかなか愛嬌のあるハゼ。

キャメルシユリンプ

学名 *Rhynchocinetes durbanensis*

購入場所：ペットフォレスト



分類：サラサエビ科サラサエビ属

分布：インド洋～西部, 中央太平洋

生息環境：浅瀬の岩場やサンゴ礁

入部日付：2025/1/15

評価：なし

説明 よくアクアリウムショップで買える一般的な海水エビ。

鮮やかな赤い体に白いバンド模様があり、背中にこぶのある独特な姿が愛らしい。水合わせを気を付ければかなり丈夫なので、海水槽初心者におすすめ。

シマゲンゴロウ

学名*Hydaticus bowringii*

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目ゲンゴロウ科

分布：北海道南部から本州、南西諸島

生息環境：環境の良い池、沼

入部日付：8/19

評価：**要注目**（栃木県）


背中の4本の黄色の縦縞模様と一対の丸い斑紋が特徴のとっても可愛いゲンゴロウである。

他のゲンゴロウ科と比べて腹が赤い。

ナミゲンゴロウ

学名*Ctbister chinensis*

採集場所：福島



分類：昆虫綱甲虫目ゲンゴロウ科

分布：北海道～九州

生息環境：とっても環境の良い池や沼

入部日付：2024/7/29

評価：絶滅危惧II類（環境省）

絶滅危惧II類（栃木県）

通称ナミゲンとも言われる。

農薬でとても数が減ってしまったゲンゴロウ。

後ろ脚をオールを漕ぐようにして泳ぐ。

ヒメゲンゴロウ

学名*Rhantus suturalis*

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目ゲンゴロウ科

分布：北海道から南西諸島まで

生息環境：どこにでもいる

入部日付：8/19

評価：なし

水たまりとかにもいるド普通種。体は黄褐色。
冬でも見られるらしい。

アオダイショウ

Elaphe climacophora

採集場所：栃木県、埼玉県

分類：爬虫綱有鱗目ナミヘビ科

分布：本州、四国、北海道、九州

生息環境：森林、住宅街、田園

入部日付：不明

評価：**要注目 (栃木県)**



説明

全長最大2mにもなる日本本土最大の蛇。幼蛇はマムシに似ている模様があるが成長するにつれて消えていく。体色は緑褐色であるが個体差が大きく、本個体は非常に暗化した個体。山口県ではアルビノの個体群が確認されている。

グリーンボトルブルー

Chromatopelma cyaneopubescens

購入個体



分類：クモガタ綱クモ目

分布：ベネズエラ北部

生息環境：乾燥地域の樹上

入部日付：2025年4月

評価：なし

名にある通り体色に青と緑が入っていて鮮やかな蜘蛛である。体長16cm程度とタランチュラとしては手ごろな大きさであり、巣を作り見栄えがいい上に大人しいと、初心者にもおすすめの種である。

メキシカンファイヤーレッグ

Brachypelma boehmei



購入個体

分類：クモガタ綱クモ目
オオツチグモ科

分布：メキシコ南部

生息環境：乾燥した低木地帯

入部日付：2025年8月

評価：なし

見た目の似ている同属の別種が映画やゲームなどに出ていることから、タランチュラと聞くとこの姿を思い浮かべる人も多いだろう。大人しく丈夫、タランチュラらしい体型と良い蜘蛛である。

チャコジャイアントゴールデンストライプ

Grammostola pulchripes

採集場所：購入個体



- ・分類：クモ類クモ目筋状形類テラフォシ科
- ・分布：アルゼンチン、パラグアイ
- ・生息環境：地表性、乾燥した地域
- ・入部日付：2024年6月1日
- ・評価：なし

説明

その名の通り、足の節には金色の縦模様が入っている。成長スピードは遅いが、2～3年で20～22cmと大型になる。タランチュラの中でも比較的小となしく、初心者にも扱いやすい種である。

セイブシンバナヘビ

Heterodon nasicus

購入個体



分類：爬虫綱有隣目ナミヘビ科

分布：アメリカ合衆国、カナダ

生息環境：草原～砂漠

入部日付：2025年6月

評価：なし

大人しく、オスの最大体長60cm程度と蛇にしては小型。そして何より特徴的なのは「猪鼻」の名前の由来にもなった鼻先の形により生まれる愛嬌。そのうえ飼いやすく、どこをとっても最高の蛇である。

ヒバカリ

Hebius vibakari

採集場所：栃木県宇都宮市

分類：爬虫綱有鱗目ナミヘビ科

分布：本州、四国、佐渡ヶ島、隠岐島、壱岐島、五島列島など

生息環境：森林、住宅街、田園

入部日付：2026年8月18日

評価：**要注目** (栃木県)



説明

最大でも65cmほどにしかならない小型の蛇。

今まで無毒と言われていたが最近は弱毒があるという説が有力になってきている。

ヒョウモントカゲモドキ

Eublepharis macularius

購入個体



分類: トカゲ亜目 トカゲモドキ科

分布: パキスタン アフガニスタン

イラン、インドの北西部

生息環境: 乾燥した岩場や荒地、砂礫

地帯など、比較的乾燥した環境

入部日付: 2023年9月7日

品種改良により、さまざまな色の個体がいる。この個体は、ブラッドタンジェリンというモルフで、明るいオレンジ色、所々に出る暗色班などが人気である。

イソギンポ

Parablennius yatabei

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目イソギンポ科

分布：北海道～九州

生息環境：岩礁、タイドプール

入部日付：2026/6

評価：なし

岩礁に生息し、潮だまりでも見られることがある。頭の上の角がふさふさしているのが特徴。気が強く、ほかの魚の鰭をかじってしまうこともしばしば。

チェリーバルブ

学名 *Puntius titteya*

採集場所：購入個体



分類：コイ目コイ科

分布：スリランカ

生息環境：浅く穏やかな川

入部日付：2026/7

和名にあるように、さくらんぼのように小さく、鮮やかな赤色の体の特徴の魚。明るい見た目に反して、水草の陰に隠れていることの多い臆病な魚でもある。

ポリプテルス・オルナティピンニス

学名 *Polypterus ornatipinnis*

採集場所：購入個体



分類：ポリプテルス目ポリプテルス科

分布：コンゴからタンザニアに
かけての河川

生息環境：穏やかな川・沼地

入部日付：数年前

評価：なし

4億年前から姿を変えず生息している古代魚ポリプテルスの仲間の1種。同じ水槽にいるポリプテルス・エンドリケリーとくらべて、黒くほっそりとしていて、ヘビらしさの強い魚だ。ぜひ見比べてみてほしい。

ポリプテルス・オルナティピンニス

学名 *Polypterus endlicheri endlicheri*

採集場所：購入個体



分類：ポリプテルス目ポリプテルス科

分布：西～中央アフリカの河川や湖沼

生息環境：穏やかな川や沼地

入部日付：数年前

評価：なし

爬虫類のような風格をもつ古代魚。背ビレや顔に注目すると、恐竜のような風格を感じることが出来る。同じ水槽にいるポリプテルス・オルナティピンニスと比べると、白っぽい色とガッシリとした体が特徴だ。

ヤエヤマアオガエル

Zhangixalus owstoni

購入個体



分類：無尾目アオガエル科チャンキザルス属

分布：石垣島、西表島

生息環境：水田、湿原周辺の森林

入部日付：2025.10.30

評価：なし

成長すると5センチほどになる、少し大型のカエル。
石垣島と西表島にのみ生息している。よく見かけるアマガエルよりもかなり青みがかっており、お腹は黄色でとても綺麗。
飼育環境によってかなり発色が変わってくる。

ミヤマヒダリマキマイマイ

学名 *Euhadra scaevola scaevola*

採集場所：日光



分類：腹足綱柄眼目オナジマイマイ科

分布：本州の関東西部から近畿地方

生息環境：自然豊かな山

入部日付：

評価：絶滅危惧Ⅱ類（環境省）

とにかくでかくてかっこいい。沢登りをしているときに採集した。
カタツムリの仲間の巻き方は種によって異なり、種類を知る手掛かりとなる。

ニホンカナヘビ

Takydromus tachydromoides

採集場所：宇都宮高校



分類：爬虫綱

分布：日本全域

生息環境：草原や藪地など

入部日付：8/21

評価：**要注目**（栃木県）

日本の固有種。

尻尾の長さは全体の3分の2と非常に長い。

ニホントカゲと違いウロコに光沢がなく、表面がカサカサしている。

マツモムシ

Ceratophyllum demersum

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱半翅目マツモムシ科

分布：北海道～九州

生息環境：池や沼など

入部日付：8/19

評価：なし

腹を上に向けて水面を泳ぐ。つまり人間で言う背泳ぎのような泳ぎ方をする。

刺されると本当に痛いので素手で触る際は注意しよう。

アメリカツノウズムシ

Girardia dorotocephala

採集場所：おそらく宇都宮高校



分類：有棒状体綱三岐腸目

サンカクアタマウズムシ科

分布：北アメリカ～中央アメリカ

生息環境：温暖な地域

入部日付：おそらく8/21

評価：**外来種**

俗にいうプラナリアの一種。切ると断片から頭や尻尾を再生して二匹になるという非常に強い再生能力の持ち主。おそらく生物部の庭に生えてる水草に引っ付いてこの水槽に現れたと思われる。国外外来種。

ギンヤンマ (ヤゴ)

Anax parthenope

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱蜻蛉目ヤンマ科

分布：日本・朝鮮半島など

生息環境：池

入部日付：8/19

評価：なし

よく見られるトンボだが、飛ぶのが速く捕まえるのは難しい。
和名の由来はオスの腹の青いところの下部が銀白色になっていることからきている。

コガムシ

Hydrochara affinis

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目ガムシ科

分布：北海道～九州

生息環境：池や沼や水田など

入部日付：8/19

評価：**要注目**（栃木県）

光沢のある黒い体で、赤褐色の脚を持っている。
見た目はゲンゴロウのなかまと似ているが、成虫は草食性である。

ヒメガムシ

Sternolophus rufipes

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目ガムシ科

分布：本州～南西諸島

生息環境：池や沼など

入部日付：8/19

評価：なし

光沢のある黒い体と、腹の裏側に牙のようなトゲがある。
コガムシと似ているが、比べると体が小さい。
他のガムシ科と同じで成虫は草食性。

コシマゲンゴロウ

Hydaticus grammicus

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目ゲンゴロウ科

分布：北海道～南西諸島

生息環境：水田や池など

入部日付：8/19

評価：なし

黄褐色の体に黒くて細かい縦筋模様がある。腹は赤色。
小さくて可愛いが、模様がかっこいい。
いるところではかなりたくさん見られる。

オオオサムシ

学名*Carabus dehaanii*

採集場所：葛城山



分類：昆虫綱甲虫目オサムシあ

分布：本州、四国、九州

生息環境：雑木林

入部日付：

評価：なし

一見するとただのでかいオサムシだが、エリトラが少し青みがかっていて、渋くてとてもカッコいい。

ヤマトオサムシ

学名 *Carabus yamato*

採集場所：葛城山



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：中部地方から近畿地方

生息環境：森林

入部日付：

評価：なし

日本固有種の珍しいオサムシ。小昆虫やミミズを主食とする。
一般的なオサムシと同じく飛ぶことができない。

ドウキョウオサムシ

Carabus uenoi

採集場所：葛城山

分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：近畿地方の一部

生息環境：山地の森林や高所

入部日付：

評価：絶滅危惧II類（環境省）



交尾器がたいへん巨大であることから道鏡という平安時代交尾器が大きい僧侶にちなんで名前が付けられた。。ミミズを食べて暮らしている。

イワワキオサムシ

学名 *Carabus iwawakianus*

採集場所：葛城山



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：近畿地方～紀伊半島

生息環境：森林

入部日付：

評価：なし

他のオサムシ科と同じく羽が退化しており空を飛ぶことはできない。
和名は岩湧山という山から来ている。

ミミズが主食。

ニホンスッポン

学名*Pelodiscus japonicus*

採集場所：思川

分類：爬虫綱カメ目スッポン科

分布：本州、四国、九州

生息環境：川

入部日付：

評価：



かなり美味。捌くのが大変だが、その分美味しさは格別である。
首がとてもよく伸び、またかむ力が非常に強いため、扱うときは噛まれないように注意が必要。

マイマイカブリ

学名 *Carabus blaptoides*

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：北海道、本州、九州

生息環境：河川敷、雑木林

入部日付：

評価：なし

日本固有種。その人気は凄まじく、海外から採集者がやってくるほどである。8亜種に分かれており、北に行くほど小さく、美麗になり、南に行くほど大きく、黒くなる。

メタリフェルホソアカクワガタ (ハルマヘラ亜種)

Cyclommatus metallifer aenomicans

自己繁殖個体、ハルマヘラ産



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：ハルマヘラ島、バチャン島、
カシルタ島

生息環境：森林

入部日付：2026/2

評価：なし

体の光沢と、胴体よりも長い顎が特徴のクワガタ。本亜種はやや顎が太くなるという特徴を持つ。紫外線に当たると青くなることが知られているが、遺伝的に青い個体も存在する。昼行性。

ヨロイイソギンチャク

Anthopleura Uchidai

採集場所：平磯海浜公園



分類：イソギンチャク目ウメボシイ
ソギンチャク科

分布：九州から北海道

生息環境：干潟

入部日付：2026/9/5

評価：なし

干潟に多く生息する灰色のイソギンチャクで、人が触っても全く害はない。表面に小石や砂を身に着けて擬態し、引き潮のときには体を縮めて水分を保つ。非常に丈夫で飼育が簡単な種類である。

クサフグ

Takifugu Alboplumbeus

採集場所：平磯海浜公園



分類：条鰭類

分布：北大西洋北西部の東アジア地域、黄海から台湾島にかけての中国・朝鮮半島周辺から日本列島周辺

生息環境：海水域や汽水域の浅い砂浜や岩礁

入部日付：2026/9/5

評価：なし

皮膚や内臓に強い神経毒であるテトロドトキシンを持ち、免許なしでの調理で中毒、死亡する事故が多い。日本では河口付近の川や海岸でも多く見られ、最も身近なフグである。

ヒライソガニ

学名 *Gaetice Depuressus*

採集場所：茨城県大洗町



分類：軟甲綱十脚目モクズガニ科

分布：北海道以南、東アジア

生息環境：潮間帯の岩礁

入部日付：2026年5月

評価：なし

さまざまな模様の個体がいる。イソガニとよく似ているが、ひとまわり小さく、甲が頭部から腹部に向かうに連れて細くなっていることなどから見分けることができる。磯で普通に見られる。

コバンザメ

学名 *Echeneise naucrates*



分類：スズキ目コバンザメ科コバンザメ属

分布：東太平洋を除く全世界の熱帯, 亜熱帯の海

生息環境：沿岸のサンゴ礁周辺から外洋

入部日付：2026年8月26日

評価：特になし

説明 水族館の巨大な水槽でサメやマンタの腹を見ればよくくっついてる事でおなじみの魚。頭に文字通り小判のような吸盤がついてるのが一番の特徴であり愛すべきポイント。宿主がいなくても普通に生きていける。褐色や白色の個体など、多種多様な個体もいて探してみるのも面白い。

シリケンイモリ

学名 *Cynops ensicauda*

購入個体



分類：両生綱有尾目イモリ科

分布：南西諸島

生息環境：田、小川、湿地、池など

入部日付：2026年3月

評価：準絶滅危惧

尾が細く尖っている様からシリケン（尻剣）と名付けられた。
野生下では、雨後に林道に出て轢死したり側溝に落ちて出られなくなる
ことが問題になっている。

アマミマルバネクワガタ

学名 *Neolucanus protogenetivus*
protogenetivus



採集場所：奄美大島
分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：奄美大島、徳之島

生息環境：森

入部日付：なし

評価：国内希少野生動植物種
絶滅危惧Ⅱ類(環境省)

日本産のマルバネだと顎の発達は控えめだが、かっこいい。虫屋の採集圧と、生息地の減少の懸念によりよって採集禁止になってしまった。

サキシマヒラタクワガタ

Dorcus titanus sakisimanus

自己繁殖個体 石垣島産



分類：クワガタムシ科

分布：八重山列島

生息環境：森林

入部日付：2026/9/3

評価：竹富島憲章により竹富島では採集禁止

日本のヒラタクワガタの中で最大級の亜種であり、飼育・採集ともに簡単な部類なためオススメのクワガタ。この個体は灯火で採集した個体の子孫である。飼育下では8cmをこえる個体もいる。

ブラジリアンブラック

Grammostora pulchra

購入固体



分類：クモ綱クモ目オオツチグモ科

分布：ブラジル、ウルグアイ

生息環境：森林

入部日付：2026年5月

評価：無し

大型で真っ黒になるタランチュラ。タランチュラの中でかなり成長は遅く、メスは成体になるまで約6年掛かる。しかし、その分寿命が長く、穏やかな性格と丸々とした見た目からペットとして人気である。

サンタレムピンクヘアード

Acanthoscurria geniculata

購入固体



分類：クモ綱クモ目オオツチグモ科

分布：ブラジル（アマゾン）

生息環境：熱帯雨林

入部日付：2026年3月

評価：無し

成体は脚を伸ばすと20cmに届くほどの大型のタランチュラ。白黒の脚に薄いピンク色の毛が生えている。このタランチュラはとにかく餌を食べ、成長が早い。幼体をたくさん産むため値段がかなり安く、世話も簡単な部類なため初めてのタランチュラにおすすめである。

コバルトブルー

Melopoeus lividus

購入固体



分類：クモ綱クモ目オオツチグモ科

分布：タイ、ミャンマー

生息環境：森林の地中

入部日付：2026年1月

評価：無し

青色のタランチュラとして有名なこの種だが、実はオスは茶色の体をしており、販売されている個体の多くはメスである。この種はアジアに生息するタランチュラ“アースタイガー”の一種であり、凶暴で毒が強い。基本的に土に潜っている。

ゲーティサファイアオーナメンタル

Poecilotheria metallica

購入個体

分類：クモ綱クモ目オオツチグモ科

分布：アーンドラプラデーシュ州

生息環境：樹上

入部日付：2026年4月

評価：無し



青色の体と黄色の体節が魅力的なタランチュラ。インドの一部の地域の森林にのみ生息しており、希少価値が高い。毒が強く、足も速いため取り扱いには注意が必要である。

アンティルピンクトウー

Caribena versicolor

購入個体



分類：クモ綱クモ目オオツチグモ科

分布：カリブ海 小アンティル諸島

生息環境：樹上

入部日付：2026年5月

評価：無し

幼体は綺麗な青色、成体は緑の背甲にピンクの脚とかなり美しいタランチュラ。性格は穏やかで値段も高くなく、ペットとして人気だが、乾燥と蒸れにかなり弱いため飼育には若干の慣れが必要。他のタランチュラは頑丈だが、この種は突然死がかなり多い。

ミツカドコオロギ

Loxoblemmus doenitzi

採集場所：高根沢町



分類：昆虫綱直翅目コオロギ科

分布：本州・四国・九州・中国

生息環境：草地など

入部日付：8/25

評価：なし

オスの顔は正面から見ると平らで、3つ突起がある。この突起が名前の由来となっている。「リッリッリッリッリッ」と鳴く。

エンマコオロギ

Teleogryllus emma

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱直翅目コオロギ科

分布：南西諸島を除いた日本全域

生息環境：草地など

入部日付：8/26

評価：なし

日本最大のコオロギ。顔に閻魔大王の眉のような白い模様が特徴。この特徴が和名の由来。決してデカくて偉そうだからという理由ではない。鳴き声は「コロコロリー」

カムルチー

学名 *channa argus*

採集場所：利根川



分類：条鰭綱キノボリウオ目
タイワンドジョウ科

分布：中国大陸及び朝鮮半島

生息環境：湖沼や河川の淀みなどの
止水域

入部日付：2026/6/20

評価：**要注意外来生物**

巨大な口で沢山の生き物を捕食する。一般的にライギョと呼ばれる仲間の一種。直接空気を取り込んで呼吸することができる。

オオオサムシ

学名*Carabus dehaanii*

採集場所：葛城山



分類：昆虫綱甲虫目オサムシあ

分布：本州、四国、九州

生息環境：雑木林

入部日付：8/21

評価：なし

一見するとただのでかいオサムシだが、エリトラが少し青みがかっていて、渋くてとてもカッコいい。

ヤマトオサムシ

学名 *Carabus yamato*

採集場所：葛城山



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：中部地方から近畿地方

生息環境：森林

入部日付：8/21

評価：なし

日本固有種の珍しいオサムシ。小昆虫やミミズを主食とする。
一般的なオサムシと同じく飛ぶことができない。

イワワキオサムシ

学名 *Carabus iwawakianus*

採集場所：葛城山



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：近畿地方～紀伊半島

生息環境：森林

入部日付：8/21

評価：なし

他のオサムシ科と同じく羽が退化しており空を飛ぶことはできない。
和名は岩湧山という山から来ている。

ミミズが主食。

ドウキョウオサムシ

Carabus uenoi

採集場所：葛城山

分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：近畿地方の一部

生息環境：山地の森林や高所

入部日付：8/21

評価：絶滅危惧II類（環境省）



交尾器がたいへん巨大であることから道鏡という平安時代の交尾器
が大きい僧侶にちなんで名前が付けられた。ミミズを食べて暮らし
ている。

クロオサムシ

Carabus albrechti tohokuensis

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：北海道、中部地方以北

生息環境：山地の林など

入部日付：8/26

評価：なし

羽が退化しているため飛ぶことはできないが、足が速い。

雑食性で、ミミズや死骸などを主に食べる。

地域ごとに亜種に分かれている

クロナガオサムシ

Carabus (Leptocarabus) procerulus

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：本州・九州

生息環境：林の中など

入部日付：8/26

評価：なし

体に光沢がなく、前翅の筋が目立たない、地味でワクワクしない。
と思うかもしれないが、腐ってもオサムシなのでシルエットがかっこいい。肉食性のオサムシ。

マイマイカブリ

学名 *Carabus blaptoides*

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：北海道、本州、九州

生息環境：河川敷、雑木林

入部日付：8/19

評価：なし

日本固有種。その人気は凄まじく、海外から採集者がやってくるほどである。8亜種に分かれており、北に行くほど小さく、美麗になり、南に行くほど大きく、黒くなる。

ショウリョウバッタ

Acrida cinerea

採集場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱直翅目バッタ科

分布：本州、四国、九州、南西諸島

生息環境：草地など。

入部日付：9/5

評価：なし

いそうなところに行けば大体いる普通種。オスとメスの体格差が大きく、メスの方が大きい。飛ぶ時にオスは「キチキチキチキチ」と鳴る。写真は標本。

クサヒバリ

Sivistella bifasciata

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱直翅目ヒバリモドキ科

分布：本州～南西諸島

生息環境：藪など

入部日付：8/26

評価：なし

小型のコオロギの仲間。この個体は長翅型と呼ばれるものであり、通常の個体より翅が長く、飛翔能力が高い。稀に見られる。鳴き声は「フィリリリリリリ」。

ヒメギス

Eobiana engelhardti subtropica

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱直翅目キリギリス科

分布：北海道～九州

生息環境：平地の丈の低い草地など

入部日付：8/26

評価：なし

胸の側面に斜めの白い模様がある。背中側が茶色の個体と緑の個体がいる。本個体は茶色。鳴き声は「シリシリシリシリリリ」。

オンブバッタ

Atractomorpha lata

採集場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱直翅目オンブバッタ科

分布：日本全土

生息環境：草地など

入部日付：9/5

評価：なし

よくメスの背中にオスが乗っかっている。これがおんぶしているように見えることが名前の由来。ショウリョウバッタに似ているが、触覚が緑色という点が違う。

ハイイロゲンゴロウ

Eretes griseus

採集場所：塩谷町



分類：昆虫綱甲虫目ゲンゴロウ科

分布：日本全土

生息環境：池や沼など

入部日付：8/28

評価：なし

黄褐色の体に黒い斑点と帯びが特徴。この黒い斑点が綺麗に並んでオサムシみたいでかっこいい。灰色要素はあまりない。

ガムシ

Hydrophilus acumina

採集場所：塩谷町



分類：昆虫綱甲虫目

分布：北海道～九州

生息環境：深めの池や沼など

入部日付：8/28

評価：準絶滅危惧（環境省）

準絶滅危惧（栃木県）

ゲンゴロウと同じくらいの大さの虫。たまにゲンゴロウにメスと
思われて追いかけて回されている。幼虫は肉食だが成虫は草食。飼育
すると水槽の水草を食べ尽くす

モツゴ

学名

採集場所：釜川



分類：条鰭綱コイ目

分布：関東から九州、朝鮮半島、中国、台湾

生息環境：川の下流、湖

入部日付：不明

評価：なし

大きな川の川底近くを泳いでいる。水質悪化に強く、飼いやすい。口が小さく、顔の先端が細いことから「クチボソ」とも呼ばれる。東北では国内外来種になっている。

ヒガシニホントカゲ

Plestiodon finitimus

採集場所：宇都宮



分類：爬虫綱有隣目トカゲ科

分布：北海道～本州東部

生息環境：森林、草原など

入部日付：2024/4

評価：絶滅危惧Ⅱ類(栃木県)

人家の周りでもよく見かけることの多いトカゲ。幼体の尾は青いが、生体になると茶色になる。ニホントカゲと比べ表面がすべすべしており、やや太め。宇高にも多く生息している。

イダテンカジカ

Ocynectes maschalis

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目カジカ科

分布：九州～北海道

生息環境：岩礁、潮だまりなど

入部日付：2026/8/30

評価：なし

磯でよく見るカジカの仲間。北方系で暑さには比較的弱い。
口先がとがらず、丸っこくなっているのが特徴。

ヘビギンポ

Enneapterygius etheostoma

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目ヘビギンポ科

分布：日本各地の沿岸、
朝鮮半島～ベトナム

生息環境：岩礁や潮だまり

入部日付：2026/8/30

評価：なし

藻類や小動物を食べる。ヘビギンポと呼ばれる種の中には複数種が含まれ、今後の研究次第で細かく分けられる可能性がある。

アヤアナハゼ

Pseudoblennius marmoratus

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目カジカ科

分布：本州～九州、朝鮮半島沿岸

生息環境：岩礁や潮だまり

入部日付：2026/8/30

評価：なし

磯でよく見かけるが、暑さに弱いため冷やさないと大抵死んでしまう。鮮やかな色彩や、突起などを持っているがこれは擬態のためと考えられる。

ダイナンギンポ

Dictyosoma temminckii

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目
ダイナンギンポ科

分布：青森県以南

生息環境：岩礁域

入部日付：2026/8/30

評価：なし

よくウツボやウナギと間違えられるが、分類的には全く異なる。
最大で30cm近くになり、大型個体はとても迫力がある。個体により
色彩変異が大きい。

ヒメハゼ?

Favonigobius gymnauchen

採集場所：大洗

分類：条鰭綱スズキ目ハゼ科

分布：北海道～南西諸島、

西部太平洋沿岸

生息環境：砂泥底や干潟など

入部日付：2026/8/30

評価：なし



砂地に生息する細長い体形をしたハゼ。背びれは大きく広げることができる。本来砂地に生息するはずだが、たまたま岩場で捕れた。

ニシキベラ

Thalassoma cupido

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目ベラ科

分布：本州～南西諸島

生息環境：岩礁

入部日付：2026/8/30

評価：なし

熱帯魚にも劣らないほど美しい色彩をしたベラだが、温帯の磯で普通にみられる。大洗付近だと潮だまりよりもやや深い場所に多い。

イトマキヒトデ

Patiria pectinifera

採集場所：大洗



分類：棘皮動物門アカヒトデ科
イトマキヒトデ科

分布：千島列島～黄海

生息環境：岩礁

入部日付：2026/8/30

評価：なし

磯でもっともふつうにみられるヒトデの仲間。
色彩には個体差がある。普通は腕が4本腕が四本や七本のものは珍しい。体の裏に生えている小さな足のようなものを使って移動する。

イワガニ

学名 *Pachygrapsus crassipes*

採集場所：大洗町



分類：軟甲綱十脚目イワガニ科

分布：北海道南部から琉球列島、韓国、
北アメリカ西岸からチリ

生息環境：潮間帯上部、岩礁

入部日付：2026/8/30

評価：なし

最も磯で見つけやすいカニ。海の中よりも水しぶきがかかるくらいの岩の上で多く見られる。甲の細かい横じまと赤みがかったハサミが特徴。

オウギガニ

学名 *Leptodius affinis*

採集場所：大洗町

分類：軟甲綱十脚目

分布：青森県以南、西太平洋、インド洋

生息環境：潮間帯

入部日付：2026/8/30

評価：なし



大きなハサミを持っているが、性格は臆病で、敵にあらうと死んだふりをする。この個体は甲になぜか貝殻がついている。脱皮直後の体が柔らかい時にくっついてそのまま固まったと思われる。

イソガニ

学名 *Hemigrapsus sanguineus*

採集場所：大洗町



分類：軟甲綱十脚目モクズガニ科

分布：北海道から九州、東アジア

生息環境：潮間帯の岩礁

入部日付：2026/8/30

評価：なし

ヒライソガニとは違い、個体によって模様の変化はほぼ無い。足の縞模様が特徴的。磯で普通に見られる。

イシガニ

学名 *Charibdis japonica*



採集場所：大洗町

分類：軟甲綱十脚目ワタリガニ科

分布：北海道南部以南、韓国、台湾

生息環境：水深45mまでの岩礁、砂泥底

入部日付：2026/8/30

評価：なし

この仲間は「ガザミ」とも呼ばれる。一番後ろの足がオールのようになっており、甲の横が突き出した形をしている。名前の由来は、甲が石のように硬いことから。ハサミがとても強力。

ウンモンフクロムシ

学名 *Sacculina confragosa*

採集場所：大洗町

分類：節足動物門顎脚綱フクロムシ目フクロムシ科

分布：北海道南部以南、ロシア、中国

生息環境：岩礁（イワガニやイソガニ）

入部日付：2026/8/30

評価：なし



卵のように見えるが、カニに寄生する節足動物である。本体はカニの体内にあり、黄色い部分は卵。カニに自分を卵だと思わせ、カニに守らせている。寄生先がオスであってもメス化させて卵を守る行動をさせるという面白い生態の生物。

カエルウオ

Istiblennius enosimae

採集場所：大洗



分類：条鰭綱スズキ目イソギンポ科

分布：本種中部以南～九州

生息環境：岩礁

入部日付：2026/8/30

評価：なし

イソギンポとよく似ているが、目の上の角のような突起がふさふさしていない。ニセカエルウオという近縁種があり、見分けるのは非常にむずかしい。好奇心旺盛でほかの魚をかじってしまうことも。

スジアオゴミムシ

Chlaenius costiger

採集場所：宇都宮



分類：昆虫綱甲虫目オサムシ科

分布：北海道～八重山諸島

生息環境：森林

入部日付：8/16

評価：なし

頭部と前胸が美しい光沢をもつゴミムシ。

手でつかむとにおいを出し、臭いはなかなか取れない。昆虫やミミズなどの死骸を食べる。

スジクワガタ

Dorcus striatipennis

採集場所：那須塩原



分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：北海道～九州、台湾、中国

生息環境：森林

入部日付：7/20

評価：なし

高地を好む小型のクワガタ。コクワガタによく似ているが、名前通り雌や小型個体では上翅のスジがはっきりしていることや、大型個体になると内歯が二股になることで見分ける。

トビズムカデ

Scolopendra mutilans

採集場所：宇都宮高校



分類：唇脚綱オオムカデ目
オオムカデ科

分布：本州～沖縄

生息環境：森林、農地、住宅地など

入部日付：2026/9/2

評価：なし

トビズとは鳶色の頭という意味だが、個体によって色彩変異が激しく色だけで見分けるのは困難。害虫を食べてくれる上、手を出さない限り襲われはしないので見つけてもそっと見守ろう。

アブラハヤ

Rhynocypris lagpwskii steindachneri

採取場所：宇都宮市釜川



分類：条鰭綱コイ目コイ科

分布：岡山県と福井県以东の本州

生息環境：泥底のある河川

入部日付：2025/9/3

評価：準絶滅危惧種（栃木県）

体表にラメがかかったような見た目をしている。

油のようにぬるぬるしたハヤ（小魚）であることが名前の由来。

暑さに弱く、夏場にエアコンなしでうまく飼うのは意外に困難。

オオゾウムシ

Sipalinus gigas

採集場所：宇都宮高校



分類：昆虫綱甲虫目オサゾウムシ科

分布：東南アジア～東アジア

生息環境：森林など

入部日付：9/1

評価：なし

日本の在来種では最大級のサイズ。脚は長くがっちりしていて力が強い。樹液に集まる。

ツシマヒラマクワガタ

Dorcus titanus castanicolor



繁殖個体 対馬厳原産

分類：昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：長崎県対馬

生息環境：森林

入部日付：2026/9/1

評価：なし

日本のヒラタクワガタの中で最大になる亜種。野生の最大個体は84mmである。細長い大顎が特徴で日本のパラワンオオヒラタとも呼ばれている。非常に人気で採集・飼育ともに簡単な部類とされている。

シェンクリングオオクワガタ

学名 *Dorcus schenklingi*



購入個体 高雄市六龜産

分類：虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：台湾

生息環境：低山地

入部日付：2026/4/12

評価：採集禁止(台湾)

台湾に生息するコクワガタのおばけのような見た目をしたオオクワガタ。天然記念物に指定されているため日本に出回っているのは昔に輸入された個体の子孫である。出回っている個体のほとんどは合望山であるが台湾に合望山という場所はないらしい。

タウルスヒラタクワガタ

Dorcus taurus cribriceps

購入個体 ミンダナオ島産



分類昆虫綱甲虫目クワガタムシ科

分布：インドネシア・マレーシア・
フィリピン

生息環境：森林

入部日付：2026/3/15

評価：なし

東南アジアに広く分布する中型のヒラタクワガタの仲間のフィリピン亜種。大顎の縁に生えている毛が特徴的であり和名はクシゲヒラタ。長歯型と短歯型があるが長歯型でも大顎は短め。

タウナギ

Monopterus albus

購入個体



分類：硬骨魚綱タウナギ目タウナギ科

分布：東南アジアから東アジア

生息環境：沼、水路、水田

入部日付：2025/12/8

評価：外来種

漢字で田鰻と書くがうなぎの仲間ではない。ウロコがなく粘膜で空気呼吸ができ、成長するとメスからオスへ性転換する変わった魚。巣穴を掘って暮らす。たまに背面泳ぎをしている。

クロカミキリ

Spondylis buprestoides

採集場所：高根沢町



分類：昆虫綱甲虫目カミキリムシ科

分布：北海道～沖縄

生息環境：針葉樹林など

入部日付：9/4

評価：なし

クワガタのメスのような見た目をしているがカミキリムシの仲間。体は黒色で光沢がない。顎で挟まれると痛そうだが、意外と痛くない。でも危ないので自分から噛まれに行ったりしないように。

クビキリギス

Euconocephalus thunberg

採集場所：宇都宮市



分類：昆虫綱直翅目キリギリス科

分布：北海道南部～南西諸島

生息環境：草原など

入部日付：8/27

評価：なし

名前の通り、噛み付いたら首を切られても噛みつくという武士さながらの魂を持った虫。雑食。クサキリとの見分け方は、頭の形。頭が尖っているのがクビキリギス。

キューバブロンズ

Phormictopus auratus

購入個体



分類：クモ綱クモ目オオツチグモ科

分布：キューバ

生息環境：密林

入部日付：2026/3/12

評価：なし

ブロンズという名前だが、金色の毛が特徴の中型のタランチュラ。この個体は幼体なためまだ金色になっていない。丈夫で成長が早く初心者におすすめであり、捕食シーンは迫力がある。