

「宇高標本箱」に入っている昆虫の報告

①まえがき

私たち生物部はここ半年間、宇高で昆虫を採集し続け、標本にしてきました。

今回は標本にした昆虫の種類をできるだけ同定し、報告します。

・意義

昆明・モントリオール宣言というものがあります。世界全体で生物多様性の保護と回復に努めるという内容の宣言で、日本も批准しています。このように、生物多様性を守るための取り組みが広く行われており、ここ、宇高の生物多様性も当然守るべきものです。しかし、保護活動を行うためには現状把握が必要であり、昆虫の調査はその方法の一つになります。

・なぜ昆虫標本が記録として優れているのか？

昆虫は多種多様な環境に適応するためにさまざまな種へと進化しています。そのため、ある環境に生息している昆虫の種類をできるだけ詳しく調べることでその環境に生息している植物、周りの環境の豊かさ、その場所の生態系を垣間見ることができるのです。昆虫を扱うにしろ写真や文章での記録でいいんじゃないか、と思う方もいるかもしれませんが、しかし、同じ場所によく似た昆虫が多く生息していることもあり、同定結果が誤ることも多くあります。また、分

類の変更によりある種が複数種へ分割されてしまった場合、記録したのはそのうちのどの種なのか？というのがわかりにくくなってしまう。そうしたときに、標本という物的証拠があれば、同定結果を後から再度確認することができるのです。

②方法

宇都宮高校生物部で2026年の始業式(4/26 ごろ)～終業式(7/17)にかけて採集され、標本が作製された昆虫に限り、外形態からの同定を行いその結果を示し、観察結果があるものは付記しました。

また、外形態のみからの同定が困難である種類には〇〇の一種というような表記を用い、類似種が複数いて決定が困難な場合は本校周辺で一般的にみられると思われる種の名前に？をつけて表記しました。また正確な同定ができないものの明らかに別種と思われるものは別種として扱い、大きさを付記しました。

同定結果は一般的に用いられている和名で示しました。

③結果

文化祭のテーマに合わせて結果のまとめから入りますと、あわせて285(+2)種類が確認され、うち特定外来生物2種、レッドリスト掲載種は少なくとも5種でした。

甲虫目

112(+2)種確認。富永(2026)記録種は 42 種、66 種が未記録種、4 種は不明。

・テントウムシ科

10 種確認。

ナミテントウ

生物室前の庭や第二グラウンドのユリノキ、和敬寮周辺など幅広く見られ、二紋型、四紋型、紅型、斑紋型の順で個体数が多い。



ナナホシテントウ

主に生物室の庭などで見られる。ナミテントウより少ない。



カメノコテントウ


ひょうたん池沿いのオニグルミの木でのみ発生。2026 年はクルミハムシの発生が多く、

本種も幼虫から成虫まで非常に多くみられた。



ヒメカメノコテントウ

生物室前の庭で多く見られ、幼虫も確認済み。



ベダリアテントウ

外来種。生物室前の前で見られた。




キイロテントウ

生物室前の前の庭を中心にみられる。




ニジュウヤホシテントウ

植物食。ナス科植物を食べる。生物室前の庭で主にみられる。



ヒメアカホシテントウ

生物室前の庭、第二グラウンドで確認済み。



ダンダラテントウ

生物室前庭の特定のヒメジョオンでしか観察したことがないが、本種とみられる蛹も確認できた。



左が本種とみられる蛹。生物室前にて。

ハラグロオオテントウ

講堂横のハルニレの下で死骸が確認された。



・コメツキムシ科

10(+1)種確認。

木の名前が書かれたプレートの裏で見つかることが多い。

トラフコメツキ

校内で伐採された木を置いている場所(以下材置き場)で見られた。



ホソサビキコリ？

本種ではない可能性があるが、体型や前胸の形から下に示す種とは別種と思われる。
生物室前の庭で見られた。



サビキコリ

生物室前の庭で見られた。



(サビキコリ的一种)

上で示した個体とは前胸後角の形が異なるため別種の可能性がある。



ヒゲナガコメツキ

桜の木の木名プレート裏で採集された。



アカアシオオクシコメツキ

さまざまな樹種の木の名前のプレート裏で見られる。



クシコメツキ属の一種

富永(2026)にも同じ表記で記録があるが、同種かは不明。
14 ミリほど。木名が書いてある看板の裏で見られた。



コメツキムシの一種

生物室と講堂の間の壁で採集された。
翅に全体的に微毛が生えている。11 ミリほど。



(コメツキムシの一種)

上に記載した種とよく似ているが、微毛の密度が異なるため別種の可能性がある。11 ミ

リほど。弓道場ネットで採集。



コメツキムシの一種

上2個体より小型。9ミリほど。弓道場ネットで採集。



オオクシヒゲコメツキ

オニグルミの看板裏で得られた。



- ・ ゴミムシダマシ科

8 種確認。

サトユミアシゴミムシダマシ

切り株、サクラなどの木、木名プレートの裏など広くみられる。



ホンドクロオオクチキムシ

富永(2026)ではオオクチキムシの和名で記録がある。

木の名前のプレート裏でよくみられる。



ホンドトビイロクチキムシ

木の名前のプレート裏で見つかる。



キマワリ

主に桜の木のうちや隙間で見られる。



コスナゴミムシダマシ

生物室前の庭で得られた。



ムナビロスナゴミムシダマシ

類似種も多く、数種を含む可能性がある。
宇高全域で、石の下などに生息している。



ゴミムシダマシ科の一種

材置き場で見られた。



ヒゲブトゴミムシダマシ

弓道場のネットで得られた



・ハムシ科

16 種確認。

リンゴコフキハムシ

オニグルミの木の周りで見られた。右個体は微毛がはげた姿。



アトボシハムシ

生物室前の庭で見られた。



クルミハムシ

オニグルミの木の周辺で見られた。

2026 年は大発生し、一時はオニグルミの葉がほとんど食べつくされ、地面には幼虫が散乱していた。



ヤツボシハムシ

生物室前の庭で見られた。



ウリハムシ

生物室前の庭はもちろん、宇高の様々なところで飛翔している個体が見られる。個体数は多い。



クロウリハムシ

生物室前の庭はもちろん、宇高の様々なところで見られるがウリハムシよりやや少ない。



ドウガネサルハムシ？

生物室の前の庭やひょうたん池付近で見られることが多い。



サンゴジュハムシ

弓道場のネットについているところを発見された。



ウリハムシモドキ

生物室前の庭で見られた。



キバラルリクビボソハムシ

生物室前の庭で見られた。本校に多いツユクサを食草とする。



ドウガネツヤハムシ？

採集地の生物室庭に生えているタラの木を食草とするため本種としたが、本種にしてはやや大型で別種の可能性もある。




ハムシ科の一種

生物室前の庭で見られた。3~4 ミリほど。



ヒゲナガハムシ亜科の一種

生物室前の庭で見られた。4~5 ミリほど。



ハムシの一種

生物室前の庭で見られた。青色の金属光沢がある。6 ミリほど。



ハムシの一種

生物室前の庭で得られた。7ミリほど。



ハムシの一種

イチモンジハムシなどに近い仲間と思われる。7ミリ前後。



・ジョウカイボン科

1種確認。

セボシジョウカイ

出現期の個体数はかなり多く、各所で見られる。



・ゲンゴロウ科

1 種確認。

コシマゲンゴロウ

近隣地域からプールに飛来した個体と思われる。



・オオキノコムシ科

2 種確認。

アカハバビロオオキノコ

ひょうたん池周りや弓道場で得られた。



ヒメオビオオキノコ

昨年度までは弓道場付近のキンモクセイに大量に生息していたが、今年になって切られ、その影響で観察しにくくなった。



・クワガタムシ科

2 種確認。

ノコギリクワガタ

材置き場の木材などで繁殖していると思われ、カシとハルニレの樹液に集まる。



コクワガタ

材置き場や切り株で繁殖し、ハルニレやカシの樹液に飛来する。

・ケシキスイ科

1 種確認。

ヨツボシケシキスイ

樹液ではふつうにみられる種類だが、隠れられる場所がないのか宇高だと珍しい。



・オサムシ科

12 種確認。

セアカヒラタゴミムシ

生物室前、第二グラウンドなどで見られる。前胸が黒化した型と赤い型どちらも見られる。



マルガタゴミムシ？

ニセマルガタゴミムシとの区別が難しく、光沢が弱い個体を本種とした。生物室前やひょうたん池などで見られる。



ニセマルガタゴミムシ？

マルガタゴミムシとの区別が難しく、光沢が強い個体を本種とした。生物室前やひょうたん池などで見られる。



オオホシボシゴミムシ

生物室前の庭で得られた。



ケウスゴモクムシ？

ヒメケゴモクムシの可能性もある。材置き場でみられた。



ゴモクムシ亜科の一種

ひょうたん池付近で得られた。



オオズケゴモクムシ？

生物室前の庭で得られた。



ゴモクムシの一種

頭がかなり大きいため上記の種とは別種の可能性が高い。



オオヒラタゴミムシ

富永(2026)では？付きで記録がある。

ひょうたん池付近で採集された。



オオマルガタゴミムシ

ひょうたん池の周りや材置き場で発見された。



コマルガタゴミムシ

生物室前でのピットフォールトラップで得られた。



コハンミョウ

ひょうたん池周りや生物室前の庭で見られた。



・カミキリムシ科

10 種確認。

キスジトラカミキリ

クリの花に集まっていた。



ルリカミキリ

弓道場付近で得られた。



ベニバハナカミキリ

栃木県レッドデータブック要注目種。ひょうたん池付近を飛んでいた。



ルリボシカミキリ

富永(2025)未記録種。

材置き場付近で見られた。まとめ中にゴキブリに食害されてしまった。



ゴマダラカミキリ

材置き場で採集された。



ウスバカミキリ

宇高の様々な場所で見られる。校内で見られるサイズにはかなり幅がある。



クビアカツヤカミキリ

線路沿いハルニレで採取。特定外来生物。本種とみられる食痕も見られ、20 を超える多数の個体が確認された。2025 年には侵入しており、それが羽化した形と思われる。



サビカミキリ？

生物部室の隅に落ちていた。



・コガネムシ科

18 種確認。

アカマダラハナムグリ

ハルニレで得られた。



クロハナムグリ

クリの花やヒメジョオンの花などで得られた。



ヒラタアオコガネ

桜の木やタラの木などで見られた。



ヒメトラハナムグリ

ヒメジョオンやクリの花で見られた。



コアオハナムグリ

ヒメジョオンやクリの花で見られた。



カナブン

カシやハルニレの樹液に見られる。



アオカナブン

カシの樹液で得られた。



セマダラコガネ

第二グラウンドや生物室前などで見られた。



ナガチャコガネ

弓道場まわりや、線路沿いのハルニレの周りに多く生息していた。



ヒメビロウドコガネ

生物室の前で得られた。




アカビロウドコガネ

生物室の前で得られた。



エンマコガネの一種

ひょうたん池周りや生物室前で得られた。



シロテンハナムグリ

カシやハルニレの樹液で得られた。



シラホシハナムグリ

ハルニレの樹液で得られた。



アオドウガネ

生物室前のタラの木などで得られる。



マメコガネ

生物室前のヤブガラシに集まっている。



カブトムシ

ハルニレやカシの木に集まる。2026 年は 7 月初めから発生している。



クロカナブン

ハルニレで得られた。



・タマムシ科

4 種確認。

ムツボシタマムシ

材置き場や弓道場で見られた。



ウバタマムシ

材置き場のアカマツの木材で得られた。栃木県レッドリスト要注目種。



タマムシ

校内の絵の木の切り株から発生している。



チビタマムシの一種

富永(2026)記録種の可能性あり。

生物室前で得られた。3ミリほど。



・ゾウムシ科

5 種確認。

ヒゲボソゾウムシの一種

弓道場で得られた。緑色の金属光沢がある。6~7 ミリほど。



ヒョウタンゾウムシの一種

富永(2026)記録種と同種の可能性がある。
生物室前の庭で得られた。6~7 ミリほど。



ゾウムシの一種

プールの壁面にくっついていて。6 ミリほど。



ゾウムシの一種

生物室前でのピットフォールトラップで得られた。3 ミリほど。



ゾウムシの一種

生物室前のピットフォールトラップで得られた。2.5 ミリほど。



・エンマムシ科

1 種確認。

コエンマムシ

カシの樹液で得られた。



・シデムシ科

1 種確認。

オオヒラタシデムシ

白亜館付近で得られた。



・オオキスイ科

1 種確認。

ヨツボシオオキスイ

ハルニレで得られた。クヌギやコナラなどの樹液でふつうにみられる種だが、そのような木が宇高にないせいか観察は難しい。




・カツオブシムシ科

3 種確認。

ヒメマルカツオブシムシ

生物部の標本を食害していた。



カツオブシムシ科の一種

クリの花で得られた。2.5 ミリほど。



カツオブシムシ科の一種

クリの花で得られた。2.5 ミリほど。




・ハネカクシ科

1 種確認。

ハネカクシの一種

クリの花で得られた。3 ミリほど。



・科まで同定できなかった甲虫

7 種確認。おそらくすべてが富永(2025)未記録。

甲虫目の一種

クリの花で採集。3 ミリほど。




甲虫目の一種

文化部棟で採集された。6 ミリほど。




甲虫目の一種

クリの花で採取された。3 ミリほど。



甲虫目の一種

カシの木で採集された。4 ミリほど。



甲虫目の一種

カシの樹液で採取された。2 ミリほど。



甲虫目の一種

生物室前の庭で採集された。1.5~2 ミリ。



甲虫目の一種

生物室前の庭で得られた。6.5 ミリほど。



双翅目

12~14 科、36 種確認。富永(2025)記録種は 7 種、未記録種は 25 種、4 種は不明。

・ガガンボ科

1 種確認。

ホリカワクシヒゲガガンボ

宇高で広くみられる。



・ミズアブ科

1 種確認。

ネグロミズアブ

講堂の前で採集された。



・ツリアブ科

1 種確認

クロバネツリアブ

生物室前や弓道場付近で観察された。



・ヒロクチバエ科

1 種確認。

キマダラヒロクチバエ

カシの樹液で見られた。




・ユスリカ科

1 種確認？

ユスリカの一種

この二個体が別種か同種かすら判断できなかったが、富永(2026)に記録がある種とは異なる。6/15 に弓道場で採集の個体は 5 ミリほど、7/2 に生物室前の庭で採集の個体は 4 ミリほど。



・カ科

1 種確認。

ヒトスジシマカ

生物室内など様々なところで見られる。



・ハナアブ科

7 種確認。

クロベッコウハナアブ

体育館の壁で見られた。



オオハナアブ

生物室前の廊下で採集された。



ミナミヒメヒラタアブ

生物室前のヒメジョオンで見られた。



ヒラタアブ亜科の一種

生物室前の庭で得られた。9 ミリほど。



ヒラタアブ亜科の一種

ハルニレで採集された。10.5 ミリほど。



ヒラタアブ亜科の一種

ひょうたん池付近で採集された。11.5 ミリほど。



ヒラタアブ亜科の一種

生物室前の庭で得られた。17 ミリほど。



・ アシナガバエ科

1 種確認。

アシナガバエの一種

富永(2026)記録種、ウデゲヒメホソアシナガバエの可能性はある。

生物室の前の庭で見られた。



・ クロバエ科、 イエバエ科、 ニクバエ科、 ヤドリバエ科

同定ができませんでした。富永(2026)にあるキンバエの仲間、オオクロバ

エ？の二種も今回記録されている可能性があります。あわせて 11 種確認。

有弁類の一種

中央廊下で得られた。11.5 ミリほど。



有弁類の一種

生物室前の庭で得られた。11 ミリほど。



キンバエの一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

恐らくクロバエ科。生物室前の廊下で得られた。10 ミリほど。



キンバエの一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

おそらくクロバエ科。生物室の前の庭で採集された。11.5 ミリほど。



キンバエの一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

おそらくクロバエ科。前二種と複眼の付き方が異なる。10.5 ミリほど。



有弁類の一種

生物室の前の庭で得られた。7.5 ミリほど。ニクバエ科の可能性が高い



有弁類の一種

生物室の前の庭で得られた。7 ミリほど。



有弁類の一種

生物室の前の庭で得られた。7.5 ミリほど。



有弁類の一種

生物室の前の庭で得られた。7 ミリほど。



有弁類の一種

生物室の前の庭で得られた。8ミリほど。



マルボシヒラタヤドリバエ？

類似種が複数おり、別種の可能性がある。生物室前の庭で見られた。



マルボシヒラタヤドリバエ近縁種？

生物室前の庭で得られた。腹部の紋や胸部の色など異なるため別種の可能性がある。7ミリほど。



・トゲアシモグリバエ科

1 種確認。

カトウトゲアシモグリバエ？

ハルニレの樹液で得られた。



・ ケバエ科

1 種確認。

ハグロケバエ？

生物室前の庭で得られた。腹部を欠損させてしまった。類似種が多く別種の可能性がある。



・ ムシヒキアブ科

4 種確認。

ナミマガリケムシヒキ？

富永(2026)にはマガリケムシヒキの和名で記録がある。

足の色の情報は本種だが、和名の由来の「曲がり毛」のはっきりしたものがみられなかったので別種の可能性がある。



ムシヒキアブの一種

ひょうたん池周辺で採集された。下記の種と非常によく似ているが、中脚脛節の剛毛が目立ち、より大型。産卵管含め 17 ミリほど。



ムシヒキアブの一種

弓道場のネットで得られた。上記の種とよく似ているが、中脚脛節の剛毛が目立たず、より小型。産卵管含めて 15 ミリほど。



シオヤアブ

通信棟の先生の駐車場で得られた。



・科まで同定できなかった種類

おそらく 5 種存在。おそらくすべて富永(2026)未記録種。

双翅目の一種

2 ミリほど。作成中の標本に集まってきた。



双翅目の一種

生物室や生物室前の庭で得られた。2.5 ミリほど。二個体は別種の可能性がある。



双翅目の一種

第二グラウンドで得られた。5.5 ミリほど。



双翅目の一種

生物室前の庭で得られた。15.5 ミリほど。



双翅目の一種

生物室前の庭で得られた。3 ミリほど。



半翅目

21 科 42 種確認。21 種が富永(2025)記録種、20 種が未記録、1 種は不明。

・カメムシ科

8 種確認。

キマダラカメムシ

外来種で、夏から秋にかけて非常に多くの個体数がみられ、本校で最も観察しやすいカメムシ。2024 年と比べて 2025 年のほうが多くみられた。



ウズラカメムシ

生物室前のイネ科植物で見られる。



クサギカメムシ

生物室前の庭で採集された。



ハナダカカメムシ

生物室前の庭で採集された。



アカスジカメムシ

生物室前の庭で採集された。



チャバネアオカメムシ

宇高で広くみられる。



ツヤアオカメムシ

生物室の前の庭で確認された。



アオクサカメムシ

生物室前の庭で確認された。



・ツチカメムシ科

4 種確認。

ヒメツチカメムシ

弓道場のネットで採集された。



ツチカメムシ

体育館の裏で採集された。



マルツチカメムシ

生物室の前の庭で見られた



ツチカメムシの一種

体型や足の形などが上記の種とは異なる。



・サシガメ科

3 種確認。

ヨコヅナサシガメ

外来種で個体数は多い。肉食だが桜の木で見られることが多い。



アカサシガメ

生物室の庭などで見られる。



シマサシガメ

弓道場のネットで採集された。



・ノコギリカメムシ科

1 種確認。

ノコギリカメムシ

生物室前の庭で採集された。



・ホソヘリカメムシ科

2 種確認。

クモヘリカメムシ

生物室前のイネ科植物に集まる。



ホソヘリカメムシ

生物室前の庭で得られた。



・ヒゲナガカメムシ科

1 種確認。

ヒゲナガカメムシ

生物室前でふつうにみられる。



・ヘリカメムシ科

4 種確認。

ヒメハリカメムシ

生物室前でよくみられる。



ホソハリカメムシ

ヒメハリカメムシと混生している。



ホオズキカメムシ

生物室前の庭で得られた。



オオツマキヘリカメムシ

ツマキヘリカメムシとの判別が難しく富永(2026)に記録のあった本種とした。




・ヨコバイ科

2 種確認。


ツماغロオオヨコバイ

生物室前や竹林付近などで見られる。



オオヨコバイ

生物室前に多い。



- ・アメンボ科

1 種確認。

ヒメアメンボ

プールで採取。本校でよくみられるアメンボは他に数種いる可能性がある。




- ・トゲアワフキムシ科

1 種確認。

ムネアカアワフキ

ひょうたん池付近の草地で採集。



- ・アワフキムシ科

1 種確認。

マルアワフキ

生物室前の庭で得られた。




・ハゴロモ科

1 種確認。

チュウゴクアミガサハゴロモ

外来種。2025 年度から見られ始め、2026 年では非常に個体数が多い。生物室前のクワ
と思われる木にて発生。



・コオイムシ科

2 種類確認。

タガメ

準絶滅危惧種(栃木県)、環境省絶滅危惧種Ⅱ類。本校には本種が繁殖できる十分な資源
がないため、近隣地域からの一時的な飛来であると思われる。



コオイムシ

プールに飛来した。環境省、栃木県ともに準絶滅危惧種。




・タイコウチ科

1 種確認。

ミズカマキリ

プールやひょうたん池に飛来する。



・ヒョウタンナガカメムシ科

2 種確認。

オオモンシロナガカメムシ

生物室の前や材置き場などで見られた。



ヒョウタンナガカメムシ科の一種

生物室前の庭で見られた。




・マダラナガカメムシ科

1 種確認。

イシハラナガカメムシ

生物室前の庭で採集された。




・ツノゼミ科

1 種確認。

トビイロツノゼミ

生物室前の庭で得られた。




・ヒラタカメムシ科

1 種確認。

トビイロオオヒラタカメムシ

ミズメの木で見られた。



・カスミカメムシ科

1 種確認。

カスミカメムシ科の一種

生物室前で確認された。




・ヒメヘリカメムシ科

3 種確認。

ヒメヘリカメムシ科の一種

生物室の前の庭で見られた。6 ミリほど。



ヒメヘリカメムシ科の一種

生物室の前の庭で見られた。7 ミリほど。



ヒメヘリカメムシ科の一種

生物室の前の庭で見られた。7 ミリほど。




・ゲンバイムシ科

1 種確認。

ゲンバイムシの一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

生物室前を飛んでいるところを捕獲されたため、生息している植物名が不明。羽先含めて3 ミリほど。



蜻蛉目

5 科 13 種確認。6 種が富永(2026)記録種、7 種が未記録種。

・ トンボ科

6 種確認。

ハラビロトンボ

生物室の前の庭で見られた。




オオシオカラトンボ

生物室の前の庭やひょうたん池で見られる。校内で繁殖している。



シオカラトンボ

生物室の前の庭やひょうたん池周りなど広くみられる。校内で繁殖している。




コシアキトンボ

オスはひょうたん池の周りを飛んでいる。未成熟個体またはメスとみられる個体は講堂付近で見られる。校内で繁殖している。




ショウジョウトンボ

富永(2025)未記録種。
生物室前の庭で見られた。



ノシメトンボ


材置き場などでよくみられる。



・ヤンマ科

ヤブヤンマ

中央廊下に迷い込んできた。生物室前の庭のビオトープに産卵に来たことがある。栃木県レッドリストで絶滅危惧種 2 類に指定されている。




・サナエトンボ科

2 種確認。

オナガサナエ

講堂前で採集された。



コオニヤンマ

部室の前の庭で採集された。



・イトトンボ科

2 種確認。

キイトトンボ

生物室前で見られた。



ホソミイトトンボ


生物室前で見られた。



・カワトンボ科

ハグロトンボ

材置き場付近など木が多く生えた場所で見られた。



・アオイトトンボ科

1 種確認。

アオイトトンボ

生物室前で見られた。腹の一部をゴキブリにより食害。




膜翅目

12 科 43 種確認。富永(2026)記録種は 13 種、未記録種は 30 種。

・ミフシハバチ科


アカスジチュウレンジハバチ

生物室前の庭で見られた。小楯板が橙色。



ルリチュウレンジ

生物室前の庭や第二グラウンドなどで見られた。



・ハバチ科

6 種確認。

カブラハバチ

生物室の前の庭で見られた。




セグロカブラハバチ 生物室前の庭で見られた。



チャイロハバチ

富永(2025)未記録種。

生物室前の庭で見られた。



ハバチの一種

弓道場で採集された。6.5 ミリほど。



ハバチの一種

ひょうたん池で採集された。10 ミリほど。



ハバチの一種

材置き場付近。11 ミリほど。




・ハバチ亜目

1 種確認。科まで同定不可だった。

ハバチ亜目の一種

和敬寮付近で採集。4 ミリほど。




・キバチ科

2 種確認。


オナガキバチ

材置き場で採集された。



ニホンキバチ

ミズメで採集された。




・ ツチバチ科

3 種確認。

アカスジツチバチ

額に黄色の斑紋があることで区別可能。生物室前の庭で見られた。




キオビツチバチ

生物室前の庭などで広く見られた。



ヒメハラナガツチバチ

生物室前の庭で見られた。




・スズメバチ科

9 種確認。

コガタスズメバチ

ハルニレの樹液やヤブガラシの花など広くみられる。




モンスズメバチ

生物室前のヤブガラシやカシの樹液などで得られた。



キイロスズメバチ

カシやハルニレの樹液、ヤブガラシなど広くみられる。



オオスズメバチ

ハルニレの樹液で女王を採集。



クロスズメバチ

校内で幅広くみられる。



セグロアシナガバチ

生物室前の庭で見られた。




コアシナガバチ

生物室前の庭で見られた。




スズバチ

ひょうたん池周辺のエノキ？ケヤキ？に集団で集まっていた。



ドロバチの一種

生物室前のヒメジョオンに集まっていた。体が曲がった状態で 11 ミリほど。




・ギングチバチ科

1 種確認。

ナミツチスガリ

生物室前の庭のヒメジョオンで見られた。




・アナバチ科

2 種確認。

アメリカジガバチ

アメリカ原産の外来種。生物室前の庭で見られた。



クロアナバチ

西体育館の二階で死んでいた。。




・ミツバチ科

5 種確認。


クマバチ

校内各所をたまに飛んでいる。




ニホンミツバチ

校内各所の花に集まる。本年は確認しただけで三か所に巣を作り、うち二か所が 7/24 時点で放棄されている。校内で見られるミツバチのほとんどは本種。




ミツバチ科の一種

弓道場ネットで得られた。7 ミリほど。



ミツバチ科？の一種

弓道場ネットで得られた。8 ミリほど。



ミツバチ科の一種

生物室前の庭で見られた。




・クモバチ科

1 種確認。

ナミヒメクモバチ？

弓道場ネットで得られた。




- ・アリバチ科

1 種確認。

アリバチの一種

オス。西体育館で得られた。




- ・ヒメバチ科

1 種確認。

ムラサキウスアメバチ

ひょうたん池付近のケヤキ？エノキ？で得られた。




- ・科まで同定できなかったハチ類

おそらくすべて富永(2026)未記録種。8 種存在。


ハチの一種

22 ミリほど。中央廊下で得られた。




ハチの一種

産卵管合わせて 19 ミリほど。材置き場で得られた。




ハチの一種

産卵管含めて 9 ミリほど。




ハチの一種

10.5 ミリほど。弓道場などで得られた。腹部の先端がオレンジ色。




ハチの一種

5.5 ミリほど。生物室前の庭で見られた。




ハチの一種

11 ミリほど。生物室前の庭で見られた。




ハチの一種

11 ミリほど。弓道場のネットで採集された。



ハチの一種

4.5 ミリほど。生物室前の庭で見られた。




・アリ科

2 種確認。


クロオオアリ

校内各所で見られる。



ヒガシクロヤマアリ

校内各所で見られた。



ゴキブリ目


2 科 2 種確認。すべて富永(2026)記録種。

・ゴキブリ科

1 種確認。

クロゴキブリ

校内各地で見られる。標本を食害する害虫。



・チャバネゴキブリ科

1 種確認。

モリチャバネゴキブリ

ひょうたん池周りで見られる。

直翅目


5 科 8 種確認。富永(2026)記録種は 4 種、未記録種は 4 種。

・バッタ科

3 種確認。

ツチイナゴ

化学室の前で得られた。



ショウリョウバッタ

生物室の前の庭で見られた。



クルマバツタモドキ

弓道場付近にできた草地で見られた。




・コオロギ科

1 種確認。

クマスズムシ

生物室の前の庭で見られた。




・ノミバツタ科

1 種確認。

ノミバツタ

ひょうたん池から弓道場にかけて見られた。



・ヒシバツタ科

2 種確認。


ハネナガヒシバツタ

プール付近やひょうたん池付近などで見られた。



ハラヒシバツタ

校内の幅広い場所で見られる。




・キリギリス科

1 種確認。

クビキリギス

生物室前で採集された。



アメメカゲロウ目

2科4種確認。1種が富永(2026)記録種、2種が未記録種、1種は記録されたか不明。

・ウスバカゲロウ科

3種確認。

カスリウスバカゲロウ属の一種


弓道場ネットで得られた。弓道場付近に巣を作っているのは本種と思われる。

富永(2026)で写真が記録されているモイワウスバカゲロウは翅の斑紋が目立たず、本種または下記のホシウスバカゲロウの可能性はある。




ウスバカゲロウ

こちらも弓道場周りで多く得られた。



ホシウスバカゲロウ

腹部がゴキブリの食害にあった。講堂の壁で採集。



・クサカゲロウ科

1 種確認。

クサカゲロウの一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

第二グラウンドで得られた。




カワゲラ目

1 科 1 種のみ確認。富永(2026)未記録。

・カワゲラ科

カワゲラの一種

15.5 ミリほど。生物室前で採取された。



カゲロウ目

2 種確認。どちらも科の同定ができなかった。どちらも富永(2026)未記録。


カゲロウの一種

弓道場で得られた。4 ミリほど。



カゲロウの一種

クリの花で得られた。4 ミリほど。



ハサミムシ目

1 科 1 種のみ確認。

・ハサミムシ科

ヒゲジロハサミムシ

生物室前やひょうたん池周りなど広くみられる。



鱗翅目

11 科 19 種確認。うち富永(2026)記録種は 9 種、未記録種は 5 種、記録され
たか不明な種は 5 種。

・スズメガ科

3 種確認。

キイロスズメ

校内を飛んでいるところを捕獲された。




セスジスズメ

生物室前の壁に止まっていた。食草のヤブガラシは生物室前に存在。



オオスカシバ

西体育館二階で死んでいた。




・シャクガ科

2 種確認。

ユウマダラエダシャク


東体育館裏で得られた。



シャクガの一種

富永(2026)記録種である可能性がある。

東体育館裏(白亜館付近)で採集。開長 53 ミリ。



・ヤガ科

5 種確認。

オオシマカラスヨトウ？


ハルニレの樹液で得られた。



ヤガ科の一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

通信等裏で採集された。開長 38 ミリ。



ヤガ科？の一種

富永(2026)記録種の可能性がある。


生物室前の庭で見られた。胴体長 11.5 ミリ。



ヤガ科の一種


富永(2026)記録種の可能性がある。

弓道場で得られた。頭から羽崎まで 10 ミリほど。



フクラスズメ

西体育館二階で死んでいた。食草のクワは生物室前にある。



・トリバガ科

1 種確認。

トリバガ科の一種

富永(2026)記録種の可能性がある。

生物室前の庭で見られた。胴体長 6 ミリほど。



・メイガ科

1 種確認。

アカマダラメイガ

弓道場付近で採集された。




・ヒトリガ科

1 種確認。

ハガタベニコケガ

弓道場ネットで得られた。




・セセリチョウ科

1 種確認。

イチモンジセセリ

生物室前の庭で見られた。




・アゲハチョウ科

1 種確認。

アオスジアゲハ

校内各所を飛んでいる。




・タテハチョウ科

2 種確認。


ツマグロヒョウモン

校内各所を飛んでいる。



アカボシゴマダラ

特定外来生物。ハルニレやカシの樹液に集まり、食草のエノキも本校に存在する。




・シロチョウ科

1 種確認。

モンシロチョウ

生物室前の庭で見られた。




・シジミチョウ科

1 種確認。

ヤマトシジミ

生物室前の庭で得られた。食草のカタバミは本校に生えている。



チャタテムシ目？

2 種確認。すべて富永(2026)未記録種。

チャタテムシの一種？

弓道場で得られた。羽含めて 5.5 ミリ位。



チャタテムシの一種？

弓道場で得られた。羽含めて 2 ミリほど。

④考察

半年にも満たない期間で 300 種近い種数を記録できていますが、富永先生が 2026 年に記録した 426 種のうち、本研究では 106 種しか確認できなかったこと、両者の観察方法や採集方法だと観察しにくい昆虫も多いことから、これらの調査からわかった以上に多くの昆虫が宇高に生息していると考えられます。

本研究ではレッドリスト掲載種も複数見られましたが、同時に近年の外来種の侵入も顕著です。キマダラカメムシは2023年、チュウゴクアミガサハゴロモが2025年に初めて本校で確認されたと記録されていますが、現在は両種とも本校で非常に多くの個体数が見られ、意図して虫を探さず生活していても目につくほどでした。また、本年は宇高で初めてクビアカツヤカミキリが確認されており、多数の個体が見られたことから2025年には侵入していたと思われます。また、2024年の生物室前のビオトープの建設により蜻蛉の繁殖場所が増えるなど、悪い変化だけでなくいい変化もあります。

この調査で確認された種類すべてが宇高を生息場所に行っているわけではありません。レッドリストに掲載された種のうち、コオイムシとタガメは一時的な飛来に過ぎないと思われます。こうした種は周りの環境が豊かなうちは継続して宇高で見られても、変化した場合にその住処を失い、宇高で見られなくなってしまう。レッドリスト掲載種に限らず、こうした種への生息環境を提供できると生物多様性の維持、拡大につながります。

さらに、本研究では特定の本木、または切り倒された木を食料または生息場所とする種がある程度数見られましたが、これは宇高の材木資源の枯渇とともに姿を消してしまいます。木を切り倒した後、植樹を続けていればこうした種の絶滅は防げますが、現在の宇高だと気を切り倒した後再び植えなおすような

取り組みは見られず、木の数は減る一方です。また、校内のほぼ全域に除草剤が撒かれてしまっているため、草本に依存した種の生息環境はほぼ生物室前と第二グラウンドにしかのこっていません。それらの昆虫を食べるトカゲやカナヘビなどの種も、これらの場所以外では十分な餌を確保しにくいでしょう。

これだけの種が記録されていながらも、本校の環境は決して安定とは言えません。

⑤反省と今後の展望

今回の研究では、採集し、標本を作れた生物に対象を限定しているため、実際に生息していると推測される種数に対して記録できた種数が明確に少ないものもあります。特にそれが顕著なのは鱗翅目で、先行研究ではじつに 210 もの種数が記録されているにもかかわらず、本研究では 19 種しか記録できておりません。ほかにもアリ類の採集、記録がほとんどできていません。また、ハネカクシ類やハチ類、ハエ類に代表される微小な種や類似種が多い分類群の種を十分に集められていたとは言えません。これは、標本にしやすい昆虫ばかりを優先的に採集し、小さすぎる虫をある程度見逃してしまったことが原因です。

今後もさらに採集、標本作製を続けることでより記録を網羅的な物へとしていきたいと思います。年月とともに環境も少しずつ変わってしまっているため、継続して調査、標本の作製を行うことが大切である。また、同定に関しても、

生殖器や羽などまで含めた詳細な比較や、情報が少ない種に関してはもっとさまざまな情報源を見るべきでしたが、時間の都合上それが叶いませんでした。

幸い、今回は標本資料が残っているので後から再同定が可能です。今回正確な種類が調べられなかった昆虫に関しては後人に期待します。

⑥協力者

生物採集 宇都宮高校生物部

⑦参考文献・参考サイト

- 富永 孝昭(2026) 宇高の杜の動物とプランクトン類 瀧苑 61 23-28
- 熊澤 辰徳, 須黒 達巳(2024) ハエハンドブック 文一総合出版
- 藤丸 篤夫(2023) ハチハンドブック増補改訂版 文一総合出版
- 尾園 暁, 二橋 亮(2024) トンボハンドブック 文一総合出版
- 阪本 優介(2018) テントウムシハンドブック 文一総合出版
- 三田村 敏正, 平澤 桂, 吉井 重幸, 北野 忠 タガメ・ミズムシ・アメンボハンドブック
文一総合出版
- 平嶋 義宏, 広渡 俊哉 教養のための昆虫学 東海大学出版部
- 虫ナビ
<https://mushinavi.com/old.html>
- 岐阜聖徳学園大学教育学部川上研究室 進化する昆虫図鑑
<http://www.ha.shotoku.ac.jp/~kawa/KYO/SEIBUTSU/DOUBUTSU/500KonchuTop/index.html>
- 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 自然環境学専攻 自然環境評価学研究室
関東を中心とした地表徘徊性昆虫
https://hyoka.nenv.k.u-tokyo.ac.jp/ground_beetle_zukan/
- 日本産コメツキデータ
https://elateridae.sakura.ne.jp/room_of_Elateridae.html

みんなで作る日本産蛾類図鑑

<http://www.jpmoth.org/>

栃木県版レッドリスト第4次(2023)

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/redlist.html>

環境省レッドリスト・レッドデータブック(2020)

<https://ikilog.biodic.go.jp/Rdb/booklist>