大腸内視鏡検査を受けられる方へ


ーマグコロール散を服用される前に、このパンフレットをよくお読みください。

年 月 日 時 分までにお越しください。


- ★ 受付にこの用紙と保険証をお出しください。
- ★ 当日の便の状態により順番が前後する場合があります。ご了承ください。 多少お待たせすることもありますから、時間に余裕をみておいでください。


◎ 検査について

この検査は、肛門から内視鏡を挿入して大腸の内腔を直接観察し、大腸の炎症性の病気(腸のただれ・きず)、大腸のポリープ、その他を診断する検査です。 検査は15~30分位で終わります。



大腸内をからっぽにして、検査を行います。 図のように、大腸の中に食物の残渣(便)が残っていると、検査のさまたげになり、検査が受けられなかったり、正確な診断が得られないことがあります。 そのようなことがないように、このパンフレットの指示を守り、検査にご協力ください。





- できるだけご家族の方などがおられるところでマグコロール散を服用してください。
- 検査1週間前からの排便状況をチェックし、マグコロール散の服用前日または 当日に排便のない方はあらかじめ医師または看護師に連絡してください。



まべ五稜郭消化器・内視鏡クリニック 院 長 間 部 克 裕

〒040-0001 函館市五稜郭町 34-12 サンセイメディカルプラザ2階

TEL: 0138-86-7633 / FAX: 0138-86-7635

予約変更・中止はホームページで行うか、 TEL: 0138-86-7633 まで電話をお願いします。

※ご都合により、検査が受けられない場合は早めに電話でご連絡ください。

≪食事について≫

【検査3日前~2日前】

〈避けてほしいもの〉

きのこ類、海藻類 (ひじき、わかめ、昆布、のり巻き)

繊維の多い野菜類 「ほうれん草、白菜、レタス

ほうれん草、白菜、レタス、キャベツ、ごぼう、にんじん、 サツマイモ、トマト、トウモロコシ、ネギ類

タネのある果物や野菜

(イチゴ、キウイ、メロン、スイカ、ブドウ、トマト など)

繊維の多い果物類

(バナナ、みかん、グレープフルーツ など)

玄米、ごま、しらたき、こんにゃく

【検査前日】

大腸検査食のみを召し上がりください。

【検査当日】

検査当日は絶食です。水分は脱水を防ぐためにしっかりお飲みください。

【飲んでいいもの】


【飲んではいけないもの】





マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分に広げてください。



①キャップを開け、約500mL (500の目盛)の水を入れて ください。 ②キャップ閉め、左右に よく振って粉末を十分に 溶かしてください。 ③全量が 1800mL (1800 の目盛) になるまで水を追加してくだ さい。

平らなところに置いて 1800 の 目盛まで水が入っていることを 確認してください。

大腸内視鏡検査の準備表

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実に行い検査にご協力ください。 指示どおり準備を行い、チェック欄に**√**印をつけてください。

Ħ	寺間		道 準 備	チェック
検	食事	T-ZUU POS	検査食(エニマクリンPO)を召し上がりください。	
查 前 日	○ 夕食以降、検査まで絶食になります。○ 水分は十分に摂ってください。			
	午後8時	775-31-31-00: A 10-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0	 ①水薬(ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%) 1 本をコップ 1 杯 (200mL) 程度の水に入れて飲んでください。 ②マグコロール散に水を入れて溶かし、約半分(900mL)を30分位で飲んでください。 ※特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。 	
検 査 当	朝食・昼食は食べないでください。			
	午前6時服用開始	77-31-JL %100g	残りのマグコロール散 (900mL) を 30 分位で飲んでください。 ※特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。	

- ◎ マグコロール散の服用時間に関係なく、排便をうながす為に水分をできるだけたくさん 飲んでください。
- ◎ 果実の入っていない"あめ"をなめたり、ガムを噛むのは可能です。

メモ