

# $Num_k$ und $Repr_k$

Tutorium 17, #4

## 1 $Num_k$

Ist  $w$  ein Wort, welches eine Zahl zur Basis  $k$  darstellt (z.B.  $FFF_{16}$  oder  $1001_2$ ), so ist  $Num_k(w)$  die Darstellung des Wortes / der Zahl im Dezimalsystem (Basis 10).

### 1.1 Definition

Sei  $w = w' \cdot x$ .

- $Num_k(\epsilon) = 0$
- $Num_k(w' \cdot x) = k \cdot Num_k(w') + num_k(x)$ ,  
(!) " + " steht hier für die Addition, nicht für irgendeine Konkatenation.
- $num_k(x) = x$

### 1.2 Beispiel

Sei  $w_1 = 5_8$  (5 zur Basis 8).

$$\begin{aligned} &Num_8(5) \\ &= 8 \cdot Num_8(\epsilon) + num_8(5) \\ &= 8 \cdot 0 + 5 \\ &= 5. \end{aligned}$$

Sei  $w_2 = 234_9$  (234 zur Basis 9).

$$\begin{aligned} &Num_9(234) \\ &= 9 \cdot Num_9(23) + num_9(4) \\ &= 9 \cdot ((9 \cdot Num_9(\epsilon 2)) + num_9(3)) + num_9(4) \\ &= 9 \cdot (9 \cdot (9 \cdot Num_9(\epsilon)) + num_9(2)) + num_9(3)) + num_9(4) \\ &= 9 \cdot ((9 \cdot 2) + 3) + 4 \\ &= (9 \cdot 9 \cdot 2) + (9 \cdot 3) + 4 \\ &= 162 + 27 + 4 \\ &= 193. \end{aligned}$$

Sei  $w_3 = B66_{16}$  (In Hexadezimal gilt  $B = 11$ , also  $w = 11 \cdot 6 \cdot 6$  in der Basis 16).

$$\begin{aligned} &Num_{16}(B66) \\ &= 16 \cdot Num_{16}(B6) + num_{16}(6) \\ &= 16 \cdot (16 \cdot Num_{16}(\epsilon B) + num_{16}(6)) + num_{16}(6) \\ &= 16 \cdot (16 \cdot (16 \cdot Num_{16}(\epsilon) num_{16}(B)) + num_{16}(6)) + num_{16}(6) \\ &= 16 \cdot (16 \cdot 11 + 6) + 6 \\ &= (16 \cdot 16 \cdot 11) + (16 \cdot 6) + 6 \\ &= 2816 + 96 + 6 \\ &= 2918 \end{aligned}$$

## 2 $Repr_k$

Während  $Num_k$  von anderen Systemen in Dezimal umwandelt, ist  $Repr_k$  dafür da, eine ein Wort  $w$  welches eine Zahl in dezimal darstellt in eine Zahl vom System  $k$  umzuwandeln. Um also von Hexadezimal auf binär zu kommen ist  $Repr_2(Num_{16}(w))$ , die Hintereinanderausführung von  $Num_{k_1}$  und  $Repr_{k_2}$ , nötig.

### 2.1 Definition

Sei  $w = x_{10}$  eine Dezimalzahl die in Basis  $k$  umgerechnet werden soll.

- Fall  $x < k : repr_k(x) = x$
- Fall  $x \geq k : Repr_k(x \text{ div } k) \cdot repr_k(x \text{ mod } k)$

(!) ”.” steht hier wieder für die Konkatenation

(!) In den Beispielen wird anstelle von ” $x \text{ div } k$ ” die Darstellung  $\frac{x}{k}$  genutzt. Hier soll es das selbe beschreiben, nämlich das Teilen mit Rest ( $\frac{74}{10} = 7, \frac{36}{7} = 5$ ), in der Klausur und auf den ÜBs bitte nicht so verwenden.

### 2.2 Beispiele

$w = 29$  und  $k = 3$ .

$$\begin{aligned} & Repr_3(29) \\ &= Repr_3\left(\frac{29}{3}\right) \cdot repr_3(29 \bmod 3) \\ &= Repr_3(9) \cdot 2 \\ &= Repr_3\left(\frac{9}{3}\right) \cdot repr_3(9 \bmod 3) \cdot 2 \\ &= Repr_3(3) \cdot 0 \cdot 2 \\ &= Repr_3(1) \cdot repr_3(0) \cdot 0 \cdot 2 \\ &= repr_3(1) \cdot 0 \cdot 0 \cdot 2 \\ &= 1 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 2 = 1002_3 \end{aligned}$$

$w = 53$  und  $k = 5$ .

$$\begin{aligned} & Repr_5(53) \\ &= Repr_5\left(\frac{53}{5}\right) \cdot repr_5(53 \bmod 5) \\ &= Repr_5(10) \cdot repr_5(3) \\ &= Repr_5\left(\frac{10}{5}\right) \cdot repr_5(10 \bmod 5) \cdot 3 \\ &= Repr_5(2) \cdot 0 \cdot 3 \\ &= 2 \cdot 0 \cdot 3 = 203_5 \end{aligned}$$