


Фторидные локусы Хойто-Гола: геномное окружение

Гены — стрелки по направлению транскрипции; ▼ — фторидный рибопереключател RF01734; числа под стрелками — межгенные промежутки, н. Первые две панели — один и тот же элемент в двух вариантах сборки; он собран в противоположной ориентации, поэтому схемы зеркальны.


Плазмида Rannonibacter (сборка Flye, кольцевая)

contig_49301 · 12 718 н.




та же плазмида в гибридной сборке (SPAdes)

NODE_1960_length_12700_cov_1.13983 · 12 700 н.



Конъюгативный элемент Hydrogenophaga: тандем CLC^f + CrcB

NODE_211_length_75051_cov_3.379069 · 75 051 н. (показан участок 39 000–46 000)




Оперон: экспортёр CLC^f + енолаза

NODE_1127_length_19921_cov_0.41065 · 19 921 н. (показан участок 14 000–19 200)



Компенсаторный оперон без экспортёра

NODE_6581_length_4333_cov_0.442371 · 4 333 н.



Обозначения

CrcB (экспортёр F⁻)

репликация плазмиды

DUF190

CLC^f (экспортёр F⁻)

мобилизация

прочее

енолаза

конъюгация T4SS

без домена

пирофосфатаза

резольваза/рекомбиназа