


Mouse (A: T_max)
T=4y → t_B=2.9y (-27%)




Rat (A: T_max)
T=4y → t_B=2.7y (-28%)




Rabbit (A: T_max)
T=13y → t_B=11.8y (-9%)




Dog (A: T_max)
T=24y → t_B=22.0y (-8%)




Cat (A: T_max)
T=30y → t_B=27.7y (-8%)




NMR (A: T_max)
T=31y → t_B=28.7y (-7%)




Pig (A: T_max)
T=27y → t_B=24.9y (-8%)




Horse (A: T_max)
T=57y → t_B=54.3y (-5%)




Chimpanzee (A: T_max)
T=59y → t_B=56.4y (-4%)




Elephant (A: T_max)
T=86y → t_B=85.0y (-1%)




Human (A: T_max)
T=122y → t_B=127.6y (+4%)




Mouse (B: T_ls)
T=2y → t_B=1.2y (-42%)




Rat (B: T_ls)
T=2y → t_B=1.6y (-36%)




Rabbit (B: T_ls)
T=8y → t_B=6.8y (-16%)




Dog (B: T_ls)
T=12y → t_B=10.9y (-10%)




Cat (B: T_ls)
T=15y → t_B=13.6y (-9%)




NMR (B: T_ls)
T=20y → t_B=18.3y (-9%)




Pig (B: T_ls)
T=15y → t_B=13.6y (-9%)




Horse (B: T_ls)
T=30y → t_B=27.7y (-8%)




Chimpanzee (B: T_ls)
T=40y → t_B=37.4y (-7%)



Elephant (B: T_ls)
T=60y → t_B=57.4y (-4%)



Human (B: T_ls)
T=78y → t_B=75.9y (-2%)



Summary: model t_B vs observed T | 11 species
Systematic ~40% underestimate in Variant A is explained by calibration on human T_ls

