

BMPI - poznámky k přednášce
v0.8

Václav Alt, Unicorn University

Podzim 2021

Obsah

1 Analytická geometrie	3
1.1 Základní pojmy	3
1.1.1 Bod a souřadnice	4
1.1.2 Vzdálenost bodů (délka úsečky)	5
1.1.3 Střed úsečky	5
1.1.4 Orientovaná úsečka, vektor	6
1.1.5 Skalární součin a odchylka vektorů	8
1.1.6 Dodatky	9
1.2 Geometrický útvar a jeho analytické vyjádření	9
1.3 Analytická geometrie v rovině	9
1.3.1 Přímka	9
1.3.2 Vzájemná poloha bodu a přímky	13
1.3.3 Vzájemná poloha přímek	13
1.3.4 Kuželosečky	14
1.3.5 Vzájemná poloha přímky a kuželosečky	16
1.4 Složitější úlohy	16
1.5 Analytická geometrie v prostoru	16
1.5.1 Rovnice přímky v prostoru	16
1.5.2 Vzájemná poloha přímek	16
1.5.3 Rovina a její rovnice	16
1.5.4 Vzdálenost bodu od roviny	19
1.5.5 Vzájemná poloha přímky a roviny	19
1.5.6 Vzdálenost přímky od roviny	19
1.5.7 Vzájemná poloha dvou rovin	19
1.6 Bonus	19
1.6.1 Koule a elipsoid	19

Toto je přepis pracovních poznámek k přednáškám z předmětu Matematický proseminář (BMPI) na Unicorn University. Zatím tu toho moc není a v tom, co tady je, je patrně hodně chyb. Taky tady nejsou moc hezké obrázky. Postupně budu poznámky vylepšovat. Nebo alespoň doplňovat. Připomínky jsou vítány.

Šíření těchto poznámek mimo rámec BMPI je zakázáno. Zakázáno!

Kapitola 1

Analytická geometrie

1.1 Základní pojmy

Polák říká [1]:

Analytická geometrie je založena na vyjadřování geometrických útvarů a vztahů mezi nimi pomocí metody souřadnic a vektorové algebry.

Jde tedy o geometrii, ale výhradně početně. V této kapitole nás čeká


- popis základních objektů (většinou lineárních): bod, přímka, rovina, kružnice (a případně elipsa)
- vyšetřování vztahů mezi nimi: vzdálenost, vzájemná poloha, úchylky

Připomeňte si pojem kartézského součinu a uspořádaných dvojic.


Definice 1. *Kartézská soustava souřadnic je soustava navzájem kolmých přímek, které se protínají v jednom bodě (počátku). Na všech osách obvykle volíme stejnou jednotku.*

Poznámky. • Pojmenováno po René Descartovi (latinsky Cartesius → kartézská soustava)

- Kartézská soustava v rovině: 2 kolmé osy v této rovině.
- Kartézská soustava v prostoru: 3 navzájem kolmé osy
- Společný bod se nazývá počátek - obvykle značíme 0 nebo O
- Osy obvykle značíme postupně x , y , z
- Celou soustavu značíme Oxy , resp. $Oxyz$
- Na každé ose volíme jednotkový bod I (J , K ,...). Pokud $|OI| = |OJ| = |OK|$, hovoříme o ortonormální soustavě.



Obrázek 1.1: Obyklé značení kvadrantů



Obrázek 1.2: Pravotočivá a levotočivá soustava

- Ve 2D rozdělí osy x a y rovinu na kvadranty, které obvykle značíme proti směru hodinových ručiček. První kvadrant je oblast, kde $x > 0$ a $y > 0$. Viz obrázek 1.1.
- Rozlišujeme také levotočivou a pravotočivou soustavu. Existuje řada pomůcek, jak si zapamatovat, která je která. Tady jen poznamenuji, že pravotočivá je ta normální (Obrázek 1.2).

1.1.1 Bod a souřadnice

Definice 2. Nechť A je bod v rovině (prostoru), ve kterém je zavedena kartézská soustava Oxy ($Oxyz$). Bodem A vedme rovnoběžky s osami: $p_1 \parallel y$, $p_2 \parallel x$. Přímka p_1 protne osu x v bodě odpovídajícím číslu $a_1 \in \mathbb{R}$, p_2 protne osu y v bodě odpovídajícím číslu $a_2 \in \mathbb{R}$ (v prostoru podobná konstrukce pomocí rovnoběžných rovin). Čísla a_1, a_2, \dots nazýváme souřadnice bodu A vzhledem k Oxy .

Poznámky. • v n -rozměrném prostoru udáváme polohu bodu zadáním n čísel - souřadnic.

- na $Oxy \dots$ můžeme nahlížet jako na kartéský součin $\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n = \mathbb{R}^n$. Prvky skalárního součinu jsou uspořádané n -tice.

1.1.2 Vzdálenost bodů (délka úsečky)

Tvrzení 1. Vzdálenost $|AB|$ bodů $A[a_1, a_2]$ a $B[b_1, b_2]$ je dána předpisem

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$


Lze přímočaře zobecnit do n rozměrného prostoru:

$$|AB| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

TODO: rozměrová analýza

Důkaz. Z obrázku 1.3 a Pythagorovy věty.

□



Obrázek 1.3: Vzdálenost dvou bodů

1.1.3 Střed úsečky

Tvrzení 2. Necht' $A, B \in \mathbb{R}^n$. Střed úsečky AB má souřadnice


$$S_{AB} = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \dots, \frac{a_n + b_n}{2} \right]$$

Důkaz. Z obrázku 1.4 je vidět, že například souřadnice S_1 je dána výrazem

$$S_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Pro ostatní souřadnice stejně.

□



Obrázek 1.4: Střed úsečky dvou bodů

1.1.4 Orientovaná úsečka, vektor

Definice 3. Orientovaná úsečka je úsečka doplněná o orientaci. Značíme \overrightarrow{AB} , bodu A říkáme počáteční bod, bodu B koncový bod. Velikost orientované úsečky je stejná jako velikost odpovídající úsečky, tj. $|\overrightarrow{AB}| = |AB|$. Orientovanou úsečku $|\overrightarrow{AB}|$ reprezentujeme n -ticí souřadnic:

$$\overrightarrow{AB} = [b_1 - a_1, b_2 - a_2, \dots, b_n - a_n]$$

Obvykle kreslíme jako šipku z bodu A do bodu B .

Definice 4 (Vektorový prostor). Necht V je neprázdná množina, jejíž prvky umíme sčítat a násobit reálným číslem. Předpokládejme navíc, že množina V je vůči těmto operacím uzavřená, tj.

- uzavřenost vůči sčítání

$$x + y \in V, \forall x, y \in V$$

- uzavřenost vůči násobení

$$\alpha x \in V, \forall x \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Množina V se nazývá reálný vektorový prostor a její prvky vektory, pokud platí:

1. sčítání vektorů je komutativní a asociativní, tj.

$$(\forall x, y, z \in V)[x + y = y + x; x + (y + z) = (x + y) + z]$$

2. násobení vektoru číslem je asociativní (na pořadí závorek nezáleží)

$$(\forall x \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})[\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x]$$

3. násobení číslem je distributivní ke sčítání prvků V (můžeme roznásobit závorku)

$$(\forall x, y \in V)(\forall \alpha \in \mathbb{R})[\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y]$$

4. násobení číslem je distributivní ke sčítání čísel (můžeme roznásobit závorku)

$$(\forall x \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})[(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x]$$

5. *existence nulového prvku: Existuje prvek $0 \in V$ takový, že pro každý prvek $x \in V$ platí $x + 0 = 0 + x = x$. Neboli*

$$(\exists 0 \in V)(\forall x \in V)[x + 0 = 0 + x = x]$$

6. *existence opačného prvku: pro každý prvek $x \in V$ existuje $y \in V$ takový, že platí $x + y = y + x = 0$. Neboli*

$$(\forall x \in V)(\exists y \in V)[x + y = y + x = 0]$$

Shrnutí. Definice vektorového prostoru je docela zdlouhavá. Body 1-4 říkají pouze to, že s vektory můžeme počítat tak, jak jsme zvyklí, tedy roznásobovat závorky, měnit pořadí sčítanců a podobně. Body 5 a 6 nám tuto "vektorovou aritmetiku" doplňují o ujištění, že existuje i mezi vektory jakási *nula* a že vektory vlastně umíme i odečítat (přičtením opačného vektoru).

Tvrzení 3. *Množina všech orientovaných úseček se sčítáním a násobením po složkách tvoří reálný vektorový prostor. Nulovým prvkem je $\vec{0} = [0, 0, \dots, 0]$, opačným prvkem k \vec{x} je $-\vec{x}$.*


Důkaz. Stačí ověřit všechny vlastnosti vektorového prostoru - většinu splněny díky obyčejné aritmetice. □

Poznámky. • Tvrzení "vektor je šipka" je nesprávné, ale "šipka je vektor" už je správně.

- Orientované úsečky tedy umíme sčítat a násobit číslem a dostáváme tak nové orientované úsečky.
- Bod můžeme chápat jako orientovanou úsečku s počátečním bodem v počátku. Tedy $A = [a_1, a_2, \dots, a_n] = \overrightarrow{OA}$
- Odteď budeme mluvit o vektorech a budeme mít na mysli orientované úsečky.
- Vektory budeme značit malými písmeny s šipkou, např. \vec{v} . V literatuře často ještě tučně **v**, nebo prostě v , je-li z kontextu zřejmé, o č se jedná.
- Graficky můžeme orientované úsečky sčítat doplněním na rovnoběžník, viz 1.5.

Definice 5 (Lineární kombinace). *Nechť V je reálný vektorový prostor a $\vec{v}, \vec{x}_i \in V$, $i = 1, \dots, k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že vektor \vec{v} je lineární kombinací vektorů \vec{x}_i , $i = 1, \dots, k \in \mathbb{N}$, pokud existují reálná čísla a_i taková, že platí*

$$\vec{v} = a_1 \vec{x}_1 + a_2 \vec{x}_2 + \dots + a_k \vec{x}_k = \sum_{i=1}^k a_i \vec{x}_i$$



Obrázek 1.5: Grafické sčítání vektorů.

Definice 6 (Lineární ne/závislost). Nechť $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k \in V$ jsou vektory a V je reálný vektorový prostor. Pokud je některý z vektorů \vec{x}_i lineární kombinací ostatních, říkáme že jsou lineárně závislé. V opačném případě jsou lineárně nezávislé.

Poznámky. • v n -rozměrném vektorovém prostoru existuje nejvýše n lineárně nezávislých vektorů.

- v n -rozměrném vektorovém prostoru: libovolná množina n lineárně nezávislých vektorů se nazývá báze. Každý vektor v tomto prostoru pak můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci bázevých vektorů.
- Na vektorový prostor se můžeme dívat jako na množinu, která je uzavřená vůči lineární kombinaci. Tedy množina V je vektorový prostor, pokud všechny lineární kombinace libovolných prvků patří opět do tohoto prostoru.

1.1.5 Skalární součin a odchylka vektorů

Definice 7. Skalárním součinem dvou vektorů $\vec{x}, \vec{y} \in V$ nazýváme operaci

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$$

Poznámky. • "skalární" je od slova skalár neboli číslo. Výsledkem skalárního součinu je číslo.

- velikost vektoru lze spočítat pomocí skalárního součinu.

$$|\vec{x}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i \cdot x_i} = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}$$

Tvrzení 4. Skalární součin dvou vektorů \vec{u}, \vec{v} je úměrný kosinu uhlu ϕ , jenž vektory svírají

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \phi$$

Poznámka. Pokud jsou vektory kolmé (říkáme ortogonální), mají nulový skalární součin, neboť $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \phi$$

1.1.6 Dodatky

- Orientované úsečky jsme zavedli jako $\overrightarrow{AB} = B - A$. Pokud budeme trvat na umístění orientované úsečky (vektoru) v jejím počátečním bodě, hovoříme o *vázaném vektoru*.
Oproti tomu množinu všech rovnoběžných orientovaných úseček stejné velikosti označujeme *volný vektor*. Většinu času budeme mít na mysli volný vektor.
- Mezi bázemi preferujeme takové, ve kterých jsou všechny vektory navzájem kolmé - *ortogonální*. Taková báze se kupodivu nazývá ortogonální. Pokud mají navíc všechny vektory ortogonální báze velikost 1, hovoříme o *ortonormální bázi*.

1.2 Geometrický útvar a jeho analytické vyjádření

Na úvod jsme poznamenali, že analytická geometrie se zabývá geometrickými útvary a vztahy mezi nimi. Nejprve si musíme říct, co vlastně geometrické útvary jsou. Existuje více způsobů, jak definovat geometrický útvar, my si uvedeme pouze jeden

Definice 8. *Geometrický útvar je množina bodů Euklidova prostoru (můžeme říkat \mathbb{R}^n).*

Poznámka. Často se pojmem geometrický útvar označuje i typ geometrického objektu (např. přímka, kružnice, ...).

Definice 9. *Analytické vyjádření geometrického útvaru je vztah, který splňují souřadnice všech bodů toho útvaru. Jinými slovy - útvar U má analytické vyjádření V právě tehdy, když platí výrok: Bod $X \in U \iff$ souřadnice X splňují vyjádření V .*

1.3 Analytická geometrie v rovině

Rovinou máme na mysli *reálný dvourozměrný eukleidovský prostor*, neboli \mathbb{R}^2 . V rovině se naučíme popisovat body, přímky a vybrané kuželosečky (kružnice a elipsa) a budeme vyšetřovat jejich vzájemné vztahy, zejména vzájemnou polohu.

1.3.1 Přímka

Poznámky. • Přímka je základní jednorozměrný geometrický útvar.

- *jednorozměrný* znamená, že nám stačí jeden parametr (někdy *stupeň volnosti*) k pokrytí celého útvaru.
- V rovině je přímka jednoznačně dána dvěma body. Tedy každými dvěma různými body prochází právě jedn přímka.
- V \mathbb{R}^2 máme 4 typy analytického vyjádření (rovnice přímky). Jsou navzájem ekvivalentní, ale mají různé užitečné geometrické interpretace. Mluvíme o parametrickém, obecném, směrnicovém a úsekovém tvaru rovnice přímky.

Parametrický tvar

Idea: mějme přímku p a na ní ležící bod A . Vycházíme z bodu A ve směru vektoru \vec{u} do libovolné vzdálenosti. Každý bod X přímky p pak je určen sadou rovnic

$$p : X = A + t\vec{u}$$

. Vektor \vec{u} se nazývá *směrový vektor přímky p* , číslo $t \in \mathbb{R}$ nazýváme *parametr*.

Poznámky. • Hovořím schválně o sadě rovnic - každý bod v rovině má dvě souřadnice, takže mám zvlášť jednu rovnici pro každou souřadnici:

$$\begin{aligned} p : x &= A_x + tu_x \\ y &= A_y + tu_y \end{aligned}$$

Pozor, parametr t je pro obě rovnice stejný.

- bod X leží na přímce $p \iff \exists t \in \mathbb{R} :$

$$X = A + t\vec{u}$$

- parametr slouží k natahování/zkracování směrového vektoru (nemůže změnit jeho směr jinak, než obrácením).
- Směrový vektor získáme ze dvou bodů přímky (přímka je určena dvěma body, viz výše) jakožto orientovanou úsečku danou těmito dvěma body.

Příklad. Přímka p je dána body $A = [1, 2]$ a $B = [-1, 1]$. Zapište parametrickou rovnici přímky p a najděte souřadnice průsečíku s osou y a tomu odpovídající hodnotu parametr t .

- směrový vektor

$$\vec{u} = B - A = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- rovnice

$$p : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- hledáme tedy

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$$

Stačí vyřešit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých:

$$0 = 1 - 2t$$

$$y = 2 - t$$

Řešením je $t = \frac{1}{2}$ a $\frac{3}{2}$

Obecný tvar

Obecná rovnice přímky má tvar

$$ax + by + c = 0,$$

$a, b, c \in \mathbb{R}$. Z parametrické rovnice získáme obecnou snadno vyloučením parametru t

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \end{array} \right\} \oplus / \cdot 2$$

$$x + 2y = 5$$

$$x + 2y - 5 = 0$$

Poznámky. • a, b jsou souřadnice tzv. normálového vektoru (tj. vektoru kolmého na směrový vektor a tedy i na přímku).

- Geometrická interpretace: patrnější, když má normálový vektor velikost 1, tj. $|\vec{n}| = 1$. Potom c má význam vzdálenosti přímky od počátku.

Příklad. Přímka $+$ je dána body $C = [-1, 0]$ a $D = [0, 1]$.

- směrový vektor

$$\vec{u} = \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- normálový vektor

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(všimněte si, že $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$). Velikost normálového vektoru je ovšem $|\vec{n}| = \sqrt{2}$. Vezměme tedy raději vektor

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

jehož velikost už je 1.

- obecná rovnice

$$q: \frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}y + c = 0.$$

Protože body C a D leží na přímce q a jejich souřadnice tak musí splňovat analytické vyjádření přímky q (tedy její obecnou rovnici), můžeme dosazením některého z nich chybějící parametr c dopočítat.

$$D \in q \implies \frac{1}{\sqrt{2}}0 - \frac{1}{\sqrt{2}}1 + c = 0 \implies c = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Takže

$$q : \frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.$$

Vzdálenost přímky q od počátku je však právě $c = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (lze ukázat např. pomocí Pythagorovy věty).

Poznámky. • Rovnice $ax + by + c = 0$ zůstává pro danou přímku platná i po přenášování libovolným $K \in \mathbb{R}$, $K \neq 0$ (ekvivalentní úprava). Ale pro $|\vec{n}| \neq 1$ není geometrický význam tak názorný.

$$\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \iff x - y + 1 = 0$$

- Normálový vektor nalezneme snadno ze směrového. Normálový vektor musí být kolmý na směrový, tj. $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

$$\vec{u} = (a, b) \rightarrow \vec{n} = (-b, a) \text{ nebo } \vec{n} = (b, -a)$$

Směrnice tvar

Směrnice tvar známe z kapitoly o funkcích, má podobu

$$p : y = kx + q,$$

kde číslo k se nazývá směrnice přímky, q obvykle absolutní člen (intercept).

Směrnice tvar má přímočarou geometrickou interpretaci: směrnice k má význam tangenty úhlu ϕ , který přímka svírá s osou x , tj. $k = \tan \phi$, zatímco q je y -souřadnice průsečíku přímky s osou y .

Poznámky. • $\tan \phi$ není definován pro $\phi = \frac{\pi}{2}$, takže rovnicí ve směrnice tvaru neumíme popsat přímku rovnoběžnou s osou y . Té totiž odpovídá konstantní hodnota x (nejedná se tím pádem o funkci) amůžeme ji zapsat takto

$$q : x = m$$

- Směrnice tvar získáme z obecného vyjádřením y

$$ax + by + c = 0 \rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

$$\text{tedy } k = -\frac{a}{b}, q = -\frac{c}{b}$$

Úsekový tvar

Úsekový tvar rovnice přímky

$$p : \frac{x}{r} + \frac{y}{s} = 1$$

je velmi podobný obecnému tvaru, ale přináší trochu jinou geometrickou interpretaci. Parametry r , resp. s , mají význam x -souřadnice průsečíku přímky s osou x , resp. y souřadnice průsečíku přímky s osou y , tedy $P_x = [r, 0]$ a $P_y = [0, s]$. Jsou to vlastně délky úseků, které přímka vymezi na souřadných osách - odtud pojmenování úsekový tvar.

Poznámka. Směrnice tvar získáme z obecného separováním absolutního členu c na druhou stranu rovnice a vydělením c

$$ax + by + c = 0 \rightarrow -\frac{ax}{c} - \frac{by}{c} = 1$$

tedy $r = -\frac{c}{a}$, $s = -\frac{c}{b}$.

1.3.2 Vzájemná poloh a bodu a přímky

Nabízí se pouze dvě možnosti: buď bod na přímce leží, nebo ne. Že bod na přímce leží poznáme přímo z definice: jeho souřadnice musí splňovat rovnici přímky. Pokud ji nesplňují, bod na přímce neleží.

Když už na přímce neleží, můžeme se ptát, jak daleko od přímky se nachází.

Definice 10 (Vzdálenost bodu od přímky). *Vzdálenost bodu X od přímky p je délka úsečky PX , která je kolmá na přímku p a bod $P \in p$.*

Tvrzení 5. *Vzdálenost bodu $A = (A_x, A_y)$ od přímky p lze spočítat jako*

$$d = \frac{|aA_x + bA_y + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

kde a, b, c jsou koeficienty obecné rovnice přímky p , tj.

$$p : ax + by + c = 0$$

Důkaz. Z obrázku (který tu není), definice 10 a základní trigonometrie: Doplňm. □

1.3.3 Vzájemná poloha přímek


Nechť p a q jsou přímky v rovině. Mohou nastat jen tyto tři možnosti:

- Přímky p a q jsou různoběžné - mají právě jeden společný bod. Značíme **TODO: nemůžu přijít na to, jak se ten symbol píše**
- Přímky p a q jsou rovnoběžné - nemají ani jeden společný bod. Značíme $p \parallel q$.
- Přímky p a q jsou totožné - mají nekonečně mnoho společných bodů. Značíme $p = q$.

Pokud bod náleží více geometrickým útvarům U_1, U_2, \dots, U_n , musí jeho souřadnice splňovat všechna odpovídající analytická vyjádření V_1, V_2, \dots, V_n .

Vzájemnou polohu (vztah) útvarů U_i vyšetříme tak, že řešíme jejich analytická vyjádření V_i jako soustavu rovnice.

Poznámky. • rovnoběžné přímky mají rovnoběžné směrové (normálové) vektory.



Obrázek 1.6: Řezy kuželovou plochou. Zleva: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola (dočasně zapůjčeno z [2])

- kolmé přímky mají kolmé směrové vektory (normálové).

Příklad. • první

- druhy

- třetí

1.3.4 Kuželosečky

Kuželosečky jsou křivky, které vznikají, překvapivě, řezy kuželovou plochou. Mohou nastat 4 možnosti:

- Rovina řezu je kolmá na osu kuželové plochy. Vzniká tak kružnice.
- Rovina řezu svírá s osou kuželové plochy úhel větší než je vrcholový úhel kuželu - kuželosečkou je elipsa.
- Rovina řezu svírá s osou kuželové plochy úhel shodný s vrcholovým - výsledkem je parabola.
- Rovina řezu svírá s osou kuželové plochy úhel menší než je vrcholový úhel kuželu. Křivka má tentokrát dvě ramena a nazývá se hyperbola.

Všechny možnosti ilustruje obrázek 1.6.

Není to ovšem jediný způsob, jak lze tyto křivky zavést - lze je definovat pomocí jistých charakteristických vlastností. Zde prozatím probereme jenom dvě: kružnici a elipsu.

Kružnice

Kružnici lze definovat jako množinu všech bodů roviny, které mají od pevného bodu - středu - stejnou vzdálenost r , zvanou poloměr. Tedy kružnici k o poloměru $r > 0$ se středem S lze zapsat takto:

$$k = \{X \in \mathbb{R}^2 : |XS| = r\}$$

Vzdálenost mezi dvěma body už umíme vyjádřit. Pro $S = [m, n]$ a $X = [x, y]$ můžeme tedy ekvivalentně psát

$$k = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - m)^2 + (y - n)^2} = r\}$$

Rovnice kružnice se obvykle zapisuje ve tvaru

$$k : (x - n)^2 + (y - n)^2 = r^2$$

Poznámky. • poznámka

Elipsa

Elipsa je množina bodů, které mají od dvou pevných bodů (ohnisek) stejný součet vzdáleností.

Zavedme obvyklé značení. Ohniska značíme E, F , střed elipsy S , vzdálenost ohnisek od středu e , tj. $|SE| = |SF| = e$. Elipsa má dvě kolmé osy - hlavní a vedlejší. Hlavní osa je delší a má délku $2a$, vedlejší osa je kratší a má délku $2b$. Často hovoříme o hlavní, resp. vedlejší, poloose se délkou a , resp. b .

Formálně můžeme elipsu zapsat takto:

$$e = \{X \in \mathbb{R}^2 : |XE| + |XF| = 2a\} \quad (1.1)$$

Zároveň je z obrázku (obrázek tu ještě není) vidět, že

$$a^2 = e^2 + b^2 \quad (1.2)$$

Přímým dosazením

$$\begin{aligned} |XE| &= \sqrt{(x - e_x)^2 + (y - e_y)^2} \\ |XF| &= \sqrt{(x - f_x)^2 + (y - f_y)^2} \end{aligned}$$

a sérií úprav s využitím (1.2) dostaneme rovnici elipsy:

$$e : \frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1 \quad (1.3)$$

Poznámky. • Ohniska vždy leží na hlavní ose. Nebo lépe: hlavní osa prochází ohnisky.

- Pokud $a = b$, můžeme rovnici (1.3) přepsat jako

$$\begin{aligned} \frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} &= 1 \quad / \cdot a^2 \\ (x - m)^2 + (y - n)^2 &= a^2 \end{aligned}$$

což je rovnice kružnice. Pokud jsou tedy poloosy stejně dlouhé, elipsa přejde v kružnici. Překvapivě.

- V této kapitole předpokládáme, že elipsa má hlavní osu pouze ve směru osy x nebo y . Jiné orientace vyžadují trochu složitější popis.
- Vzdálenost ohnisek e od středu S se nazývá *excentricita*.
- Má-li střed elipsy souřadnice $S = [m, n]$, mají ohniska souřadnice
 - $E = [m - e, n], F = [m + e, n]$ (hlavní osa ve směru x)
 - $E = [m, n - e], F = [m, n + e]$ (hlavní osa ve směru y)

Parametrické rovnice kuželoseček

1.3.5 Vzájemná poloha přímky a kuželosečky

Vyšetření vzájemné probíhá jako vždy - hledáme společné řešení rovnice přímky a rovnice dané kuželosečky. Omezíme se na kružnici a elipsu. Mohou nastat tři možnosti

- Soustava má dva řešení - tedy přímka má s kuželosečkou dva společné body. Říkáme, že přímka je *sečnou* kuželosečky.
- Soustava má jedno řešení - tedy přímka má s kuželosečkou jeden společný bod zvaný *bod dotyku*. Říkáme, že přímka je *tečnou* kuželosečky. Tečna je kolmá k průvodiči (úsečce spojující střed kružnice/elipsy a bod dotyku).
- Soustava nemá žádné řešení - přímka a kuželosečka nemají žádný společný bod. Tomu nijak neříkáme.

Příklad.

1.4 Složitější úlohy

1.5 Analytická geometrie v prostoru

1.5.1 Rovnice přímky v prostoru

Z důvodů (které možná uvidíme později) máme v prostoru k dispozici pouze parametrickou rovnici přímky. Jediný rozdíl je, že tentokrát potřebujeme tři souřadnice.

Příklad. Zapište rovnici přímky p dané body $A = [1, 2, -1]$, $B = [0, -3, 1]$. Postupujeme úplně stejně jako v rovině.

- Směrový vektor $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (-1, -5, 2)$.
- Rovnice:

$$\begin{aligned} p : x &= 1 - t \\ y &= 2 - 5t \\ z &= -1 + 2t \end{aligned}$$

1.5.2 Vzájemná poloha přímek

Vzdálenost mimoběžek

1.5.3 Rovina a její rovnice

Poznámky.

- Rovina je první dvourozměrný geometrický útvar. V analogii s popisem přímky výše to znamená, že k jejímu pokrytí potřebujeme dva parametry.
- Rovina v \mathbb{R}^3 je jakousi obdobou přímky v \mathbb{R}^2 . Rovnice roviny může mít 3 podoby: parametrickou, obecnou a úsekovou.
- Rovina je jednoznačně určena třemi body, které neleží v přímce.
- Rovinu obvykle značíme malým řeckým písmenem.

Parametrická rovnice

Idea je stejná jako v případě parametrické rovnice přímky. Zvolíme si výchozí bod \vec{A} a z něj se můžeme pohybovat ve směru *dvou lineárně nezávislých směrových vektorů* \vec{u} , \vec{v} . Rovina σ je pak dána rovnicí:

$$\sigma : X = A + r\vec{u} + s\vec{v} \quad (1.4)$$

nebo po složkách

$$\begin{aligned} \sigma : x &= A_x + ru_x + sv_x \\ y &= A_y + ru_y + sv_y \\ z &= A_z + ru_z + sv_z \end{aligned} \quad (1.5)$$

Příklad. Napište parametrickou rovnici přímky σ dané body $A = [1, 3, 2]$, $B = [-1, 0, 1]$, $C = [-3, 2, -1]$.

- směrové vektory

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (-2, -3, -1)$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{AC} = (-4, -1, -3)$$

- rovnice

$$\sigma : x = 1 - 2r - 4s$$

$$y = 3 - 3r - s$$

$$z = 2 - r - 3s$$

Poznámky.

- Směrové vektory opět získáme jako orientované úsečky ze souřadnice bodů, kterými je rovnice určena.
- Pokud se pokusíme sestavit rovinu ze tří bodů ležících na přímce, dostaneme dvojici kolineárních, a tedy i lineárně závislých, vektorů (jeden je násobkem druhého). Získáme tak maximálně parametrickou rovnici přímky.

Obecná rovnice

Obecná rovnice roviny má podobný tvar jako obecná rovnice přímky v rovině:

$$\sigma : ax + by + cz + d = 0 \quad (1.6)$$

Poznámky.

- Koeficienty a, b, c jsou souřadnice normálového vektoru $\vec{n}_\sigma = (a, b, c)$.
- Význam koeficientu d je opět vzdálenost roviny od počátku (opět pouze pokud $|\vec{n}_\sigma| = 1$)
- Obecnou rovnici přímky získáme z parametrické vyloučením parametrů. Tentokrát to ovšem může dát trochu víc práce.

Příklad.

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - 2r - 4s \quad / \cdot (-4) \\ y = 3 - 3r - s \\ z = 2 - r - 3s \quad / \cdot 5 \end{array} \right\} \oplus$$

$$-4x + y + 5z = 9$$

$$-4x + y + 5z - 9 = 0$$

Alternativně se můžeme pokusit nalézt souřadnice normálového vektoru $\vec{n} = (a, b, c)$. Normálový vektor musí být kolmý na všechny vektory v rovině. Stačí nám najít libovolný vektor, který bude kolmý na směrové vektory, tj.

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{u} &= 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{v} &= 0 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} -2a - 4b - c = 0 \quad / \cdot (-3) \\ -4a - b - 3c = 0 \end{array} \right\} \oplus$$

a zvolme např. $a = 1$

$$\begin{aligned} -3b - c &= 2 \\ -b - 3c &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= -\frac{1}{4} \\ c &= -\frac{5}{4} \end{aligned}$$

Neboli

$$\vec{n} = (1, -\frac{1}{4}, -\frac{5}{4})$$

Případně

$$\vec{n} = (-4, 1, 5)$$

Takže:

$$\sigma : -4x + y + 5z + d = 0$$

Koeficient d už dopočítáme snadno dosazením libovolného bodu ležícího v rovině.

Úseková rovnice

$$\frac{x}{r} + \frac{y}{s} + \frac{z}{t} = 1 \quad (1.7)$$

1.5.4 Vzdálenost bodu od roviny

Tvrzení 6. Vzdálenost bodu $A = (A_x, A_y, A_z)$ od roviny σ lze spočítat jako

$$d = \frac{|aA_x + bA_y + cA_z + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

kde a, b, c, d jsou koeficienty obecné rovnice roviny σ , tj.

$$\sigma : ax + by + cz + d = 0$$

1.5.5 Vzájemná poloha přímky a roviny

1.5.6 Vzdálenost přímky od roviny

1.5.7 Vzájemná poloha dvou rovin

1.6 Bonus

1.6.1 Koule a elipsoid

Vzájemná poloha koule a roviny

Literatura

- [1] J Polák. *Přehled středoškolské matematiky*. Prometheus, 2016.
- [2] Analytická geometrie. https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~portal/analyticka_geometrie/kuzelosecky.php. 2021-11-22.

Zatím trochu smutné, ale bude líp.