



L'Approche Miaro PAM Madagascar

L'approche Miaro est un programme intégré fourni au niveau de 9 communes des districts d'Amboasary et Ampanihy. Elle a pour objectif de prévenir la malnutrition chronique à travers un ensemble d'activités intégrées incluant :

- La supplémentation nutritionnelle pour les enfants de 6 à 23 mois et les femmes enceintes et allaitantes,
- La mise en place de jardins communautaires et de cases pour promouvoir et améliorer la diversification alimentaire des ménages, et
- La communication pour le changement social et comportemental promouvant les pratiques familiales clés.

L'approche Miaro bénéficie actuellement à plus de 22 676 enfants et à près de 22 862 femmes enceintes et allaitantes. Elle a, en outre, permis de **réduire la prévalence de la malnutrition chronique, d'améliorer la diversité alimentaire, d'augmenter la fréquentation des centres de santé pour les soins prénataux et d'améliorer les pratiques de soins aux enfants.**

LES REALISATIONS-CLES

- ✓ Mise en place d'une plateforme communautaire et d'un réseau d'agents communautaires formés pour la fourniture des services de nutrition à base communautaire
- ✓ Développement d'espaces de production maraîchère et la promotion de la diversification alimentaire à partir des produits locaux
- ✓ L'intégration de services de nutrition au sein de la plateforme du programme d'alimentation scolaire
- ✓ Déploiement d'activités de communication pour le changement social et comportemental avec la production d'outils adaptés aux cibles et la diffusion de messages pour la promotion d'une nutrition optimale

LA MALNUTRITION A MADAGASCAR



Madagascar enregistre une prévalence élevée et persistante de la malnutrition chronique (40 %), soit le **10ème taux le plus élevé au monde.**

Madagascar perd chaque année entre **7 et 14,5 % (743 millions et 1,5 milliard USD)** de son produit intérieur brut à cause de la malnutrition chronique et de la faim.



Moins de 25 % des enfants sont nourris avec le régime minimum acceptable pour leur groupe d'âge. L'anémie touche 37 % des femmes âgées de 15 à 49 ans et 17 % des nourrissons ont un poids insuffisant à la naissance.



La prévalence de l'émaciation est estimée à 6 %, avec des disparités régionales et des niveaux d'émaciation d'urgence sont signalés chaque année dans les districts du sud exposés à la sécheresse.