

SUVINISU SORDILEHE SORDID

2005.a. andmed

ANNE INGVER

Anne.Ingver@jpbi.ee



Jõgeva Sordiaaretuse Instituut

SORDILEHT 2005


12 sorti

Baldus (Holland), **UUS!**
Munk, Triso, Monsun (Saksa)

Helle, Meri (Soome-Eesti)

Manu, Mahti (Soome)

Tjalve, Vinjett, Zebra, SW Estrad
(Rootsi)



Jõgeva Sordiaretuse Instituut

ÜLDINFO

Külv: 3. mail 2005

Puhis: Maksim Star 025 FS

Väetis: N_{90} P_{20} K_{63} (Kemira Raps18)

Külvisenorm: 600 id.tera/m²

Umbrohutõrje: Monitor 25 g/ha

MCPA 1 l/ha


Kahjuritõrje: Actara 60g/ha

Koristus: 18-25 august




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Efektiivsed temperatuurid




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

SAAGIKUS kg/ha




Jõgeva Sordiaaretuse Instituut

KASVUAEG, päevi




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

MAHUMASS g/l




Jõgeva Sordiaaretuse Instituut

1000 TERA MASS g




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

PROTEIIN %




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

KLEEPEVALK %




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

GLUTEENI INDEKS %




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

GLUTEENI INDEKS % 1996-2005




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

LANGEMISARV sek




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

LANGEMISARV sek 1996-2005




Jõgeva Sordiaretuse Instituut

JAHUKASTE 1...9 palli



Jõgeva Sordiaretuse Instituut

PRUUNLAIKSUS (DTR) 1..9 palli



Jõgeva Sordiaretuse Instituut

KOKKUVÕTE

1. Kasvas korralik saak – sordilehe sortide keskmisena ligi 6 t/ha. Varajasi sorte mõjutas juulikuu alguse põud, mille tõttu lehed kuivasid ja saagitase jäi madalamaks.
2. Piisav niiskus tera täitumisel kasvatas tera suureks ja tuumakaks.
3. Proteiini- ja kleepevalgu sisaldus jäi madalaks ja mõnedel sortidel kvaliteedilt nõrgaks.




Jõgeva Sordiretuse Instituut

KOKKUVÕTE

4. Langemisarvud olid suhteliselt madalad ja nii juba kolmandat aastat, mida peamiselt on põhjustanud ebasoodne niiske ilmastik tera küpsemisel, kuid ka sortide valikul tuleks sellele näitajale enam tähelepanu pöörata

5. Haigused lööbisid põua tõttu hilja ja suuremat kahju ei põhjustanud.



Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Tänan !

