Suvinisu saagi ja kvaliteedi erinevus maheja tavakatses

Anne Ingver
77 66 908
Anne.Ingver@jpbi.ee



MAHEKATSE 2005-2006 võrdlus tavaviljeluse katsega



Katse tingimused 2005 ja 2006

MAHE: 0 väetist

0 keemilist tõrjevõtet

600 id.tera/m²

TAVA: $N_{90}P_{20}K_{38}$ (Kemira Power 18)

Puhtimine


Keemiline umbrohutõrje

Keemiline kahjuritõrje

13 nisusorti (sordileht)




Sademed, mm, 1991-2006






Kasvuaeg, päevi






Kasvuaeg, päevi, sordid






Saagikus, kg/ha







Saagikus kg/ha, sordid



Seisukindlus, 1...9 palli




Taime pikkus, cm






Mahumass, g/l






Mahumass g/l, sordid






1000 tera mass, g






1000 tera mass g, sordid






Proteiin, %






Proteiin, %, sordid






Kleepevalk, %






Gluteeniindeks, %






Gluteeniindeks, %, sordid






Langemisarv, sek






Langemisarv, sek, sordid






Jahukaste, 1...9 palli





Helelaiksus, 1...9 palli



Kokkuvõtteks

Mahekatses 2 a keskmisena oli parem:

+ 1000 tera mass, mahumass, kleepevalgu tugevus, jahukastekindlus, seisukindlus (pikkus vähenes), lühem kasvuaeg

Mahetingimustes vähenes:

 saak, proteiini ja kleepevalgu sisaldus, langemisarv, helelaiksuskindlus




Jahvatus ja küpsetus 2005-2006

- Kasutame Soome Viljasalve küpsetamise metoodikat,
- Laboratoorne Bühleri firma jahuveski ja küpsetuslabor
- Jahvatus –19 näitajat
- Jahu hinnang 6 näitajat (3 hinnangut)
- Taigen 12 näitajat
- Päts 14 näitajat (4 hinnagut)




Jahu väljatulek %






Jahu väljatulek %, sordid






Kliisisaldus %







Jahu veesidumisvõime %



Jahu veesidumisvõime %




Taigna moodustumise aeg, min, 2005 ja 2006






Taigna moodustumise aeg min






Taigna stabiilsus min, 2005 ja 2006







Taigna stabiilsus min




Taigna stabiilsus min, sordid



Pätsi maht ja gluteeniindeks




Pätsi maht cm³






Pätsi maht cm³, sordid






Elastsusindeks, cm



Struktuuriarv



Jahvatuse-küpsetuse kokkuvõte


Mahekatses 2 a keskmisena oli parem:

+ suurem jahu väljatulek, väiksem klii osakaal, lühem taigna moodustumise aeg,


Mahetingimustes vähenes:

 jahu veesidumisvõime, taigna stabiilsus, pätsi maht, saia elastsus







Baldus




Mahe 2006




Manu




Helle




Jõgeva Sordiaretuse Instituut




Mahe 2006




Estrad




Mahe 2006





Monsun






Munk







Zebra




Mahe 2006




Tjalve








Jõgeva Sordiaretuse Instituut



Vinjett



Mahe 2006



TÄNAN!

