Relevancia
Relogger

D M A

DISTANCIA HAMMING

	Edad	Ingresos	Color favorito
1	0.2	0.16	
2	0.6	0.5	
3	0.4	1	
4	0	0	
5	0.4	0.33	
6	0.32	0.25	

2. calcular distancias (Manhatan

$dist_M(T_6, T_1) = |0.32 - 0.2| + |0.25 - 0.16| = $ ~~1.02~~ 0.21

$(T_6, T_2) = |0.32 - 0.2| +$ -> 0.53

$(T_6, T_3) = 1.43$

$(T_6, T_4) = 0.57$

$(T_6, T_5) = 0.16$

3. Calcular la distancias Hamming

T_6 (rojo, mujer) -> Sumar con la manHata

color	Edad	Genero	
	1	1	-> 2.21
	0	0	-> 0.53
	1	1	-> 3.43
	1	0	-> 1.57
	0	1	-> 1.16

Buscar los 3 más pequeña -> 0.53, 1.57, 1.16

K-NN se puede utilizar como algoritmo de regresion

ID	Superficie	Habitaciones	Precio
T1	0	0	0
T2	0.21	0.5	
T3	0.42	0.5	
T4	1	1	1
T5	0.71	1	
T6	0.289	0.5	

$(T_6, T_1) = |0.28 - 0| + |0.5 - 0| = 0.78$

$(T_6, T_2) = |0.28 - 0.21| + |0.28 - 0.5| = 0.29$ ~~$= 0.0$~~

$(T_6, T_3) = |0.28 - 0.42| + |0.5 - 0.5| = 0.14$

$(T_6, T_4) = |0.28 - 1| + |0.5 - 1| = 1.22$

$(T_6, T_5) = (0.28 - 0.71| + |0.5 - 1| = 0.93$

$(T_6, T$

Clases

(0.09, 0.13, 0.79) $k = 3$

$\frac{600 + 700 + 850}{3} = 716.6$

La casa cuesta 716