Ta division par x suppose x ≠ 0. Elle conserve la solution 5, mais fait disparaître 0, qui vérifie aussi l'équation. Ramène tout à gauche : x(x − 5) = 0. Un produit nul donne **x = 0 ou x = 5**. Avant de diviser par une expression, vérifie si elle peut être nulle.

Les deux 20 % ne portent pas sur le même prix. La baisse vaut 4 800 F, après une hausse de 4 000 F. Les coefficients se multiplient : 1,20 × 0,80 = 0,96. Prix final : **19 200 F CFA, soit −4 %**.

12 est le bon numérateur, mais 30 n'est plus le bon total. Le tirage se fait seulement parmi les 12 + 3 = 15 basketteurs. Donc P = 12/15 = **4/5**. Ton 12/30 répondrait à une autre question : choisir une fille basketteuse parmi tous les élèves du club.

Tes exemples sont exacts, mais ne couvrent pas tous les cas. Écris les deux impairs consécutifs 2n + 1 et 2n + 3 : leur somme vaut 4n + 4 = 4(n + 1), donc un multiple de 4. **Ton cap :** tu sais calculer ; sécurise maintenant ce que tu supposes et ce que tu prouves. Pour chaque preuve, indique pourquoi elle vaut pour tous les cas.