

## Matemática 3

### PRÁCTICA 3: Variables Aleatorias Discretas. Funciones de Distribución: Binomial, Geométrica, Hipergeométrica, Poisson

1. Clasifique las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas:
  - a)  $X$ : “el número de accidentes automovilísticos por año en la ciudad de La Plata”.
  - b)  $Y$ : “el tiempo en horas que tarda en quemarse una lamparita”.
  - c)  $Z$ : “la cantidad de leche en litros que una vaca específica produce anualmente”.
  - d)  $W$ : “el número de huevos que una gallina pone mensualmente”.
  - e)  $N$ : “el número de permisos de construcción que emiten cada mes en una ciudad”.
  - f)  $Q$ : “el peso del grano producido por acre”.
2. Un embarque de 10 automóviles extranjeros contiene 4 con ligeras manchas de pintura. Una agencia recibe 6 de estos automóviles al azar, sea  $X$ : “número de automóviles que la agencia compra con manchas de pintura”.
  - a) Hallar la función de probabilidad (f.d.p.) de  $X$ .
  - b) Determine  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 2)$ ,  $P(X \leq 2)$ ,  $P(X \geq 2)$ .
3. El espesor de un entablado de madera, en pulgadas, que algún cliente ordena, es una variable aleatoria  $X$  con la siguiente función de distribución acumulada (F.d.a.):

Determine las siguientes probabilidades:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1/8 \\ 0,2 & \text{si } 1/8 \leq x < 1/4 \\ 0,9 & \text{si } 1/4 \leq x < 3/8 \\ 1 & \text{si } x \geq 3/8 \end{cases}$$

a)  $P(X \leq \frac{1}{8})$ .

b)  $P(X \leq \frac{1}{4})$ .

c)  $P(X \leq \frac{5}{16})$ .

d) Hallar la función de distribución de  $X$ .

4. La distribución de probabilidad de  $X$ : “número de imperfecciones por 10 metros de una tela sintética en rollos continuos de ancho uniforme” está dada por:

$x$	0	1	2	3	4
$f(x)$	0,41	0,37	0,16	0,05	0,01

- a) Hallar la función de distribución acumulada de  $X$ .
  - b) Determine  $F(2)$  y  $F(3,1)$ .
5. Para las variables aleatorias de los ejercicios 2 y 4 hallar  $E(X)$ ,  $E(X^2)$ ,  $V(X)$ .

6. Una compañía de materiales químicos envía cierto disolvente en tambores de 10 galones. Sea  $X$ : "número de tambores pedidos por un cliente elegido aleatoriamente". Suponga que  $X$  tiene f.d.p.

$x$	1	2	3	4	5
$f(x)$	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1

- a) Hallar  $E(X)$ ,  $V(X)$  y desviación estándar de  $X$ .
  - b) Sea  $Y$ : "número de galones ordenados".
    - b1) Hallar la f.d.p. de  $Y$ .
    - b2) Hallar  $E(Y)$ ,  $V(Y)$  y la desviación estándar de  $Y$ .
7. En un servicio telefónico, la probabilidad de que una llamada sea contestada en menos de 30 segundos es 0,75. Suponga que las llamadas son independientes.
- a) Si una persona llama 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 9 de las llamadas sean contestadas en menos de 30 segundos?
  - b) Si una persona llama 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 16 de las llamadas sean contestadas en menos de 30 segundos?
  - c) Si una persona llama 20 veces, ¿cuál es el número promedio de llamadas que serán contestadas en menos de 30 segundos?
8. Un amigo que trabaja en una gran ciudad tiene dos automóviles, uno pequeño y uno grande. Tres cuartas partes del tiempo utiliza el automóvil pequeño para trabajar, y la cuarta parte restante usa el automóvil grande. Si utiliza el automóvil pequeño, por lo general no tiene problemas para estacionarse y, por lo tanto, llega a su trabajo a tiempo con una probabilidad de 0,9. Si utiliza el automóvil grande, llega a tiempo a su trabajo con una probabilidad de 0,6.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo al trabajo?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo en 6 de 10 mañanas?, suponiendo que hay independencia entre un día y otro.
9. De un lote de 25 artículos, 5 de los cuales son defectuosos, se eligen 4 al azar. Sea  $X$ : "número de artículos defectuosos entre los elegidos".
- a) Obtener la función de distribución de probabilidad de  $X$  si los artículos se eligen con sustitución.
  - b) ¿Cuál es  $E(X)$  y  $V(X)$ ?
10. Con los datos del ejercicio 7, sea  $Y$ : "número de veces que hay que llamar hasta obtener la primera respuesta en menos de 30 segundos".
- a) ¿Cuál es la probabilidad de tener que llamar 4 veces para obtener la primera respuesta en menos de 30 segundos?

- b) ¿Cuál es el número promedio de llamadas necesarias hasta tener una respuesta en menos de 30 segundos?
11. La probabilidad de que una computadora con cierto sistema operativo se des- componga en un día es 0,1. Determine:
- la probabilidad de que la máquina se descomponga por primera vez en el duodécimo día, después de la instalación del sistema operativo, asumiendo independencia entre los días.
  - la media y varianza del número de días hasta que el sistema operativo se descompone.
12. El número de solicitudes de asistencia recibido por un servicio de remolque de vehículos sigue una distribución de Poisson con tasa  $c = 4$  por hora.
- Calcule la probabilidad de que se reciban 10 solicitudes entre las 16 y 17 h.
  - Si los operadores de las grúas se toman un descanso de 30 min, ¿cuál es la probabilidad de que no se pierda ninguna llamada de asistencia durante ese período?
13. El número de visitas realizadas en un día entre semana en una determinada página web se decide modelizar con una variable de Poisson de media 8.
- ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se reciban más de 4 visitas? ¿Y entre 7 y 10 visitas (ambos incluidos)?
  - ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger al azar una semana laboral (de lunes a viernes), haya 3 días con más de 4 visitas? (Sugerencia: considerar  $X$ : “número de días en la semana laboral con más de 4 visitas”)
14. En un lote de 10 microcircuitos, 3 están defectuosos. Se elige aleatoriamente cuatro microcircuitos para ser probados Sea  $X$ : ”número de circuitos probados que son defectuosos”.
- Determine  $P(X = 2)$ .
  - Determine  $E(X)$  y  $V(X)$ .
15. En referencia al ejercicio anterior, considere un lote de 1000 microcircuitos, 300 defectuosos. Se elige aleatoriamente 4 microcircuitos para ser probados. Sea  $X$ : “número de circuitos probados que son defectuosos”.
- Determine  $P(X = 2)$ .
  - Considere que hay independencia entre las extracciones, vuelva a calcular  $P(X = 2)$  usando distribución Binomial, ¿qué observa?