

Examen 2003 - 1er juin 2018

Elements de correction

Exercice 1 : $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $B = (e_1, e_2, e_3)$
base canonique.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1) On montre d'abord que C est une famille libre.
Pour cela on vérifie que le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $u_1 \quad u_2 \quad u_3$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

la famille libre C contient 3 vecteurs, donc
 $\dim(\text{Vect}(u_1, u_2, u_3)) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Par conséquent
 (u_1, u_2, u_3) est aussi une famille génératrice de \mathbb{R}^3
 et donc base pour \mathbb{R}^3 .

2) La matrice de passage de B à C est formée
 avec les composantes de u_1, u_2, u_3 dans la base B.

$$P_{BC} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $u_1 \quad u_2 \quad u_3$

3) $f(u_1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = u_1$.
↑
dans la base B

$f(u_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = u_2$.
↑
dans la base B

$f(u_3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =$
↑
ds la base B $= u_3 + u_1$
 $= u_1 + u_3$

En résumé, $f(u_1) = 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3$
 $f(u_2) = 0 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3$
 $f(u_3) = 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 1 \cdot u_3$

La matrice de f dans la base C est donc

$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
↑ ↑ ↑
 $f(u_1)$ $f(u_2)$ $f(u_3)$ dans la base C.

! Observation : On peut aussi calculer A' avec la matrice de passage P_{BC} .

$A' = P_{BC}^{-1} A P_{BC}$.

$P_{BC}^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{com } P)^t = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} +1 & +1 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & +1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

4) La matrice de f^n dans la base C est

$$(A')^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n.$$

$$(A')^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(A')^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On démontre par récurrence que :

$$(A')^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

On a déjà vérifié pour $n=2, 3$.

On suppose que c'est vrai pour n et on vérifie l'égalité pour $(n+1)$.

$$(A')^{n+1} = (A')^n A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n+1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c.f.g.d.

5). La matrice de f^n dans la base B est A^n .

$$A^n = (P_{BC} A' P_{BC}^{-1})^n = (P_{BC} A' P_{BC}^{-1}) (P_{BC} A' P_{BC}^{-1}) \dots$$

$$\dots (P_{BC} A' P_{BC}^{-1}) = P_{BC} (A')^n P_{BC}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & n+1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & n+2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & n+2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n+2 & n+1 & -n-1 \\ 1 & 0 & -1 \\ n+1 & n+1 & -n \end{pmatrix}$$

Ex 2

4

$$x^2(x+1)y'' - x(x^2+4x+2)y' + (x^2+4x+2)y = 0.$$

21. On observe que $y_1(x) = x$ est solution car

$$y_1' = 1, y_1'' = 0.$$

$$\Rightarrow 0 \cdot \frac{x^2(x+1)}{0} - x(x^2+4x+2) + (x^2+4x+2)x = 0.$$

3) On cherche $y_2(x) = y_1(x) \cdot u(x) = x u(x)$.

$$y_2' = x u' + u.$$

$$y_2'' = 2u' + x u''$$

On remplace dans l'équation homogène :

$$x^2(x+1)(2u' + x u'') - x(x^2+4x+2)(x u' + u) + (x^2+4x+2)x u = 0$$
$$- x(x^2+4x+2)x u' - x(x^2+4x+2)u$$

$$\Rightarrow x^3(x+1)u'' + 2x^2(x+1)u' - x^2(x^2+4x+2)u' = 0.$$

$$x^2 u' \left[\underbrace{2(x+1) - x^2 - 4x - 2}_{2x+2-x^2-4x-2} \right]$$

$$x^3(x+1)u'' + x^2 u'(-x^2-2x) = 0$$

$$u''(x+1) - u'(x+2) = 0$$

On note $u' = v \Rightarrow v'(x+1) - v(x+2) = 0$.

On résout par séparation des variables :

$$\frac{dv}{v} = \frac{x+2}{x+1} dx \Rightarrow \int \frac{dv}{v} = \int \frac{x+2}{x+1} dx$$

$$\Rightarrow \ln|v| = \int \left(\frac{x+1}{x+1} + \frac{1}{x+1} \right) dx = \int \left(1 + \frac{1}{x+1} \right) dx$$
$$= x + \ln(x+1) + K.$$

$$\Rightarrow v = \pm e^x (x+1) \cdot e^K ; \text{ on prend } v(x) = e^x (x+1)$$

$$u(x) = \int e^x (x+1) dx = x e^x + Cte$$

On choisit $u(x) = x e^x \Rightarrow y_2(x) = x e^x, x = x^2 e^x$.

On vérifie d'abord que (y_1, y_2) forme une famille libre. Pour cela, on calcule par exemple leur wronskien

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x^2 e^x \\ 1 & (2x+x^2) e^x \end{vmatrix} = x e^x \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & x(2+x) \end{vmatrix} \\ &= x e^x (2x + x^2 - x) = x e^x x(x+1) = x^2(x+1) e^x \end{aligned}$$

$W(y_1, y_2) \neq 0$ pour $x \in]0, +\infty[$.

$\Rightarrow (y_1, y_2) =$ famille libre de cardinal 2 = dimension de l'espace des solutions

$\Rightarrow (y_1, y_2) =$ base pour l'espace des solutions de l'équ. homogène

4) - $y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
constantes réelles
quelconques

$$y_h(x) = c_1 x + c_2 x^2 e^x$$

5) On cherche une solution particulière avec la méthode de variation des constantes.

$$y_p(x) = c_1'(x) x + c_2'(x) x^2 e^x = c_1' y_1 + c_2' y_2$$

avec c_1', c_2' solutions du système de Cramer:

$$\begin{cases} c_1' y_1 + c_2' y_2' = 0 \\ c_1' y_1' + c_2' y_2' = \frac{x^3(1+x)^2}{x^2(x+1)} = r(x) \end{cases}$$

(obtenue de l'équation (1) écrite sous forme normalisée.)

$$= x(1+x)$$

$$c_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ n(x) & y_2' \end{vmatrix}}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x^2 e^x \\ x(x+1) & x(2+x)e^x \end{vmatrix}}{x^2(x+1)e^x} =$$

6

$$= -\frac{x^3(x+1)e^x}{x^2(x+1)e^x} = -x \Rightarrow c_1(x) = -\frac{x^2}{2} + \text{cte}$$

$$c_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & n(x) \end{vmatrix}}{W} = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & x(x+1) \end{vmatrix}}{x^2(x+1)e^x} = \frac{x^2(x+1)}{x^2(x+1)e^x} = e^{-x}$$

$$\Rightarrow c_2(x) = -e^{-x} + \text{cte}$$

En conclusion,

$$y_p(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) \\ = -\frac{x^2}{2} \cdot x + (-e^{-x}) \cdot x^2 e^x = -\frac{x^3}{2} - x^2$$

6) La solution générale est donc

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = c_1 x + c_2 x^2 e^x - \frac{x^3}{2} - x^2$$

On impose les C.I. :

$$y(0) = 0 \Rightarrow \text{vérifier } \forall c_1, c_2$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow c_1 + (2c_2 x + c_2 x^2)e^x - \frac{3x^2}{2} - 2x \Big|_{x=0} =$$

$$\Rightarrow \boxed{c_1 = 0}$$

$$\Rightarrow y(x) = \underline{c_2 x^2 e^x - \frac{x^3}{2} - x^2}$$

Ex 3

7

1) $f(0) = e^0 \cdot 0 = 0$.

2) $\int_0^x e^{-t^2} dt = F(x)$ où F est ~~une~~ la primitive de e^{-x^2} qui s'annule en 0. ($F(0) = 0$)

$$F'(x) = e^{-x^2}$$

Donc $f(x) = e^{x^2} \cdot F(x)$;

e^{x^2} fonction de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}

$F(x)$ = continue et dérivable sur \mathbb{R} comme primitive de e^{-x^2} , $F'(x) = e^{-x^2}$ donc F' ^{contin}
(la continuité est assurée en 0)
aussi car $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = 0$.

$$\Rightarrow f(x) = e^{x^2} F(x) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$$

3)
$$f'(x) = (e^{x^2})' F(x) + e^{x^2} F'(x) = 2x e^{x^2} F(x) + e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 2x \underbrace{e^{x^2} F(x)}_{f(x)} + 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x f(x) + 1$$

4) De la relation précédente on déduit que si $f \in \mathcal{C}^1$ alors $f' \in \mathcal{C}^1$ donc $f \in \mathcal{C}^2$.

$$f^{(2)}(x) = \underbrace{2 f(x)}_{\in \mathcal{C}^1} + \underbrace{2x f'(x)}_{\in \mathcal{C}^1} \Rightarrow f^{(2)} \in \mathcal{C}^1 \Rightarrow f \in \mathcal{C}^2$$

Par récurrence, on peut justifier que $f^{(n)}$ existe et est de classe \mathcal{C}^1 , donc $f \in \mathcal{C}^{n+1}$, $\forall n \Rightarrow f \in \mathcal{C}^\infty$.

$$5). a). y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + 1$$

$$= 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 1$$

On réindexe les sommes :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n}_{n} - \sum_{n=1}^{\infty} 2 a_{n-1} x^n - 1 = 0$$

$$1 \cdot a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2 a_{n-1} x^n - 1 = 0$$

$$a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1) a_{n+1} - 2 a_{n-1}] x^n - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 - 1 = 0 \\ (n+1) a_{n+1} - 2 a_{n-1} = 0, \quad \forall n \geq 1 \end{cases}$$

$$b). y(0) = 0 \Rightarrow \boxed{a_0 = 0}$$

$$a_1 - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{a_1 = 1}$$

c) $a_{n+1} = \frac{2}{n+1} a_n, \quad \forall n \geq 1$

Si $n = \text{pair}$, $n = 2k$ alors

$$a_{2k+1} = \frac{2}{2k+1} a_{2k} = \frac{2}{2k+1} a_{2k-1}$$

$$a_{2k-1} = \frac{2}{2k-1} a_{2k-2}$$

\vdots

$$\begin{aligned} a_{2k+1} &= \frac{2}{2k+1} \cdot \frac{2}{2k-1} \cdots \frac{2}{1} a_1 \\ &= \frac{2^k}{(2k+1)(2k-1) \cdots 1} \cdot 1 \end{aligned}$$

Si $n = \text{impair}$, $n = 2k-1$ alors

$$a_{n+1} = a_{2k-1+1} = a_{2k} = \frac{2}{2k} a_{2k-2} =$$

$$= \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} \cdots \underbrace{a_0}_{=0} = 0.$$

Donc

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = \frac{2^k}{(2k+1)(2k-1) \cdots 1}, \quad n = 2k+1 \\ a_n = 0, \quad n = 2k \end{array} \right.$$

d) Il s'agit d'une série lacunaire. [10]
 On calcule le rayon de convergence d'après des a_{2k+1} avec le critère de d'Alembert :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{2k+1}}{a_{2k+1}} \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} = 0.$$

$$\Rightarrow \boxed{R = \infty}$$

6). Le problème de Cauchy (3) + C.T. : $f(0) = 0$ a une solution unique. (th. de Cauchy-Lipschitz)

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n \text{ donnés par (4)}$$

est le dev. en série entière de f .

§