

A1	A2	A3	A4	A5	A6	Σ
1/2	2.5/3	4/6	3.5/4	2/3	4.5/6	17.5/20

①

Man muss die Ute „E“ umdrehen,

um die Implikation „Vokal“ \rightarrow „Bild“

zu beweisen, und die Ute „Kreuz 7“

umdrehen, um \neg „Bild“ $\rightarrow \neg$ „Vokal“

zu beweisen.

„Vokal“ \rightarrow „Bild“ $\Leftrightarrow \neg$ „Bild“ $\rightarrow \neg$ „Vokal“.

Warum sind die anderen egal?

1/2

②

(1) $\forall x E(x) \Leftrightarrow \neg(\exists x \neg E(x))$: Wahr

$E(x)$	$\forall x E(x)$	$\neg(\exists x \neg E(x))$	\Leftrightarrow
1	1	1	1
0	0	0	1

OK

$E(x)$ hat keinen Wahrheitswert!

(2) $\exists x (E_1(x) \wedge E_2(x)) \Rightarrow \exists x E_1(x) \wedge \exists x E_2(x)$: Wahr

$E_1(x)$	$E_2(x)$	$\exists x (E_1(x) \wedge E_2(x))$	$\exists x E_1(x)$	$\exists x E_2(x)$	\Rightarrow
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0

immer mit 1 oder 0

Quantoren haben Wahrheitswert

OK

(3) $\forall x (E_1(x) \vee E_2(x)) \Rightarrow \exists x E_1(x) \wedge \exists x E_2(x)$: Falsch

Gegenbeispiel: $E_1 = \{x \mid x \in \mathbb{R}\} \wedge E_2 = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

$E_1(x)$	$E_2(x)$	$\forall x (E_1(x) \vee E_2(x))$	$\exists x E_1(x)$	$\exists x E_2(x)$	\Rightarrow
1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0

OK

2.5/3

③

$$(1) \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

Induktionsanfang:

$$n \rightarrow 1$$

$$\sum_{k=1}^1 (2k-1) = 1^2$$

$$2 \cdot 1 - 1 = 1^2$$

$$1 = 1$$

✓

Induktionsschritt:

Induktionsschritt:

$$n \rightarrow (n+1)$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = (n+1)^2$$

Wie? $\underbrace{\sum_{k=1}^n (2k-1) + (2(n+1)-1)}_{n^2 + (2(n+1)-1)} = (n+1)^2$

$$n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

$$(n+1)^2 = (n+1)^2 \quad \square \quad \checkmark$$

+1P

(2)

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$$

Induktionsanfang:

$$n \rightarrow 1$$

$$\sum_{k=0}^1 2^k = 2^{1+1} - 1$$

$$2^0 + 2^1 = 2^{1+1} - 1$$

$$3 = 3 \quad \checkmark$$

Induktionsschritt:

$$n \rightarrow (n+1)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = 2^{(n+1)+1} - 1$$

Wie? \hookrightarrow

$$2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 = 2^{(n+1)+1} - 1$$

$$2 \cdot 2^{n+1} - 1 = 2^{n+2} - 1$$

$$2^{n+2} - 1 = 2^{n+2} - 1 \quad \square$$

+1P

(3) $k \in \mathbb{Z}$

$$n^3 - n = 3k$$

Induktionsanfang:

$$n \rightarrow 10$$

$$10^3 - 10 = 3k$$

$$0 = 3k$$

$$0 = 3k$$

$$\Leftrightarrow 0 = k$$

✓

Induktionsschritt:

$$n \rightarrow n+1$$

$$(n+1)^3 - (n+1) = 3k$$

$$n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 = 3k$$

$$3(n^2 + n) + n^3 - n = 3k$$

$$\Leftrightarrow n^2 + n + \frac{n^3 - n}{3} = k \quad \square$$

(4) $k \in \mathbb{Z}$ Warum ist das $\in \mathbb{Z}$?
 \Leftrightarrow mod 3.

+ NP

$$5^n - 1 = 4k$$

Induktionsanfang:

$$n \rightarrow 1$$

$$5^1 - 1 = 4k$$

$$0 \cdot 4 = 4k$$

$$\Leftrightarrow 0 = k \quad \checkmark$$

Induktionsschritt:

$$n \rightarrow n+1$$

$$5^{n+1} - 1 = 4k$$

$$(5 \cdot 5^n) - 1 = 4k$$

$$(5 \cdot (5^n - 1) + 5) - 1 = 4k$$

$$5 \cdot (5^n - 1) + 5 - 1 = 4k$$

$$5 \cdot (5^n - 1) + 4 = 4k$$

$$\Leftrightarrow 5 \cdot \left(\frac{5^n - 1}{4} \right) + 1 = k \quad \square \quad \checkmark$$

+ NP

(4)

(1)

$$I \quad 5x = 5x + 2 \quad | -5x$$

$$0 = 2$$

$$II \quad 3y = 7 \quad | : 3$$

$$y = \frac{7}{3}$$

$$L = \{3\}$$

4/6

$$y = \frac{1}{3}$$

$$L = \{3\}$$

✓

+1P

$$(2) \quad 3x + 7y = 4 \quad | -3x | : 7$$

$$y = 4 - \frac{3}{7}x$$

$$L = \{x; 4 - \frac{3}{7}x\}$$

✓ $x, y \in \mathbb{Q}$ +0,5P

(3)

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad x + y = 3 \\ \text{II} \quad x - y = 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \text{I} + \text{II} \end{array}$$

$$\text{I}' \quad 2x = 10 \quad | : 2$$

$$x = 5$$

$$\text{II} \quad 5 - y = 7 \quad | -5 | \cdot (-1)$$

$$y = -2$$

$$L = \{5, -2\}$$

was ist x , was y ?

+1P

$$L = \{x, y \in \mathbb{R} \mid x = 5; y = -2\}$$

(4)

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad 4x - 6y = 0 \\ \text{II} \quad 2x - 3y = 15 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \text{I} - 2\text{II} \end{array}$$

$$\text{I}' \quad 0 \neq -30$$

$$L = \{ \}$$

✓

+1P

3,5/4

(5)

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Induktionsanfang:
 $n \geq 1$

$$\binom{1}{0} + \binom{1}{1} = 2^1$$

$$2 = 2$$

✓

Induktionsschritt:

$$n \rightarrow n+1$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} = 2^{n+1}$$

$$F: n \geq 1 \Rightarrow n=1$$

$$W: n \rightarrow n+1$$

$$\begin{aligned}
 & k=0 \\
 & \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} = 2^{n+1} \\
 & \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} + 1 = 2^{n+1} \\
 & \sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) + 1 = 2^{n+1} \\
 & \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k-1} + 1 = 2^{n+1} \quad \text{Woher } 2^n \\
 & \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + 2^n + 1 = 2^{n+1} \quad \text{Wie?} \\
 & \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} - \binom{n}{n} + 2^n + 1 = 2^{n+1} \quad \text{Wie?} \\
 & 2^n - \binom{n}{n} + 2^n + 1 = 2^{n+1} \quad \text{i.K.} \\
 & 2^n - 1 + 2^n + 1 = 2^{n+1} \\
 & 2^n + 2^n = 2^{n+1} \\
 & 2 \cdot 2^n = 2^{n+1} \\
 & 2^{n+1} = 2^{n+1} \quad \square \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

2/3

16)

$$\begin{aligned}
 (a) \quad & \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \\
 \Leftrightarrow & \frac{(a+b)^2}{4} \geq ab \\
 \Leftrightarrow & \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \geq ab
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0$$

Da der komplette Term

quadratisch wird, bleibt dieser

immer größer oder gleich 0. \square \checkmark

$$(b) \quad \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

+1P

$$\Leftrightarrow \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{ab} \leq \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2 \quad \left. \vphantom{\frac{4}{ab}} \right\} \text{gerne einen Zwischenschritt}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \left(\frac{1}{a}\right)^2 - 2\frac{1}{ab} + \left(\frac{1}{b}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 \quad \square \quad \text{ok} \quad +1,5P$$

$$(c) \quad \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(a+b)^2}{4} \leq \frac{a^2+b^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{(a+b)^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{-2ab}{-2} \quad f$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq ab$$

Da nur positiv reelle Zahlen eingesetzt werden,
ist ab immer größer oder gleich 0. \square

+0,5P

$$(d) \quad a + \frac{1}{a} \geq 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2}{a} + \frac{1}{a} \frac{a}{a} \geq 2 \frac{a}{a}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1+a^2}{a} \geq 2 \frac{a}{a}$$

$$\Leftrightarrow 1+a^2 \geq 2a$$

$$\Leftrightarrow 1+a^2-2a \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a-1)^2 \geq 0$$

Da der Term quadriert wird, erhält man

nur positive reelle Zahlen auf der linken Seite. $\square \quad \checkmark$

+1,5P

4,5/6