Clinician review packet · content v0.1.0

DRAFT for review. Please mark each item OK or Edit and add comments. Source: content/*.json.

1. Safety checklist (EN and ES written separately)

Stop and get checked if any of these apply

- You can't put weight on your foot or take 4 steps
- Your ankle or foot looks deformed or out of place
- Your foot is numb, tingling, cold or pale
- You felt or heard a "pop" at the back of your heel, or can't push off your toes
- Your calf is painful, swollen, warm or red
- Pain or swelling is getting worse instead of better

Don't do the exercises. Contact your physio or go to urgent care.

Emergency **911**

Detente y hazte revisar si te pasa algo de esto

- No puedes apoyar el pie o no logras dar 4 pasos
- El tobillo o el pie se ve deformado o fuera de lugar
- Sientes el pie dormido, con hormigueo, frío o pálido
- Sentiste o escuchaste un "chasquido" detrás del talón, o no puedes empujar con la punta del pie
- La pantorrilla te duele, está hinchada, caliente o roja
- El dolor o la hinchazón empeoran en vez de mejorar

No hagas los ejercicios. Contacta a tu fisioterapeuta o acude a emergencias.

SAMU (ambulancia) **106** · Bomberos **116**

Questions: Is anything missing (e.g. fever, open wound)? Is "4 steps" the right weight-bearing cue? Is the Spanish natural for Lima patients?

2. Exercise library

Exercise	English	Español	Review
Ankle alphabet Abecedario con el tobillo mobility · 1 × 1 per side	Sit with your leg out and your foot off the floor. Trace the letters A to Z in the air with your big toe, moving only at the ankle. *Mistakes:* Moving the whole leg instead of the ankle; Pushing into pain	Siéntate con la pierna estirada y el pie en el aire. Dibuja las letras de la A a la Z con el dedo gordo, moviendo solo el tobillo. *Errores:* Mover toda la pierna en vez del tobillo; Forzar hasta sentir dolor	☐ OK ☐ Edit
Ankle pumps Bombeo de tobillo mobility · 2 × 20	Lying down or sitting with your leg up, point your toes away, then pull them toward you. Move slowly and smoothly. *Mistakes:* Going too fast; Holding your breath	Echado o sentado con la pierna elevada, estira la punta del pie hacia adelante y luego llévala hacia ti. Muévete lento y suave. *Errores:* Hacerlo muy rápido; Aguantar la respiración	☐ OK ☐ Edit
Knee to wall Rodilla a la pared mobility · 2 × 10 per side	Stand facing a wall with your foot a few centimeters away. Keep your heel down and bend your knee toward the wall. Move your foot back a little as it gets easier.	Párate frente a una pared con el pie a unos centímetros. Sin levantar el talón, lleva la rodilla hacia la pared. Aleja el pie un poco cuando te sea más fácil.	☐ OK ☐ Edit

Exercise	English	Español	Review
	Mistakes: Heel lifting off the floor; Knee falling inward	*Errores:* Levantar el talón; Dejar que la rodilla se vaya hacia adentro	
Calf stretch Estiramiento de pantorrilla mobility · 3 × 30 s per side	Hands on a wall, one foot back with the knee straight and heel down. Lean forward until you feel a gentle stretch in the calf. Hold. *Mistakes:* Back heel lifting; Bouncing	Con las manos en la pared, lleva un pie atrás con la rodilla estirada y el talón apoyado. Inclínate hacia adelante hasta sentir un estiramiento suave en la pantorrilla. Mantén. *Errores:* Levantar el talón de atrás; Hacer rebotes	☐ OK ☐ Edit
Band: foot out Liga: pie hacia afuera strength · 3 × 12 per side	Sit with a resistance band around your forefoot, anchored to the inside. Turn the sole of your foot outward against the band, then return slowly. *Mistakes:* Rotating the whole leg; Letting the band snap back	Sentado, con una liga elástica en la parte delantera del pie, sujeta hacia el lado de adentro. Gira la planta del pie hacia afuera contra la liga y regresa lento. *Errores:* Girar toda la pierna; Dejar que la liga regrese de golpe	☐ OK ☐ Edit
Band: foot in Liga: pie hacia adentro strength · 3 × 12 per side	Sit with a resistance band around your forefoot, anchored to the outside. Turn the sole of your foot inward against the band, then return slowly. *Mistakes:* Rotating the whole leg; Moving into pain	Sentado, con una liga elástica en la parte delantera del pie, sujeta hacia el lado de afuera. Gira la planta del pie hacia adentro contra la liga y regresa lento. *Errores:* Girar toda la pierna; Llegar a sentir dolor	☐ OK ☐ Edit
Band: toes up Liga: punta arriba strength · 3 × 12 per side	Sit with a band around the top of your foot, anchored in front of you. Pull your toes toward you against the band, then return slowly. *Mistakes:* Bending the knee to help; Going too fast	Sentado, con una liga en el empeine, sujeta adelante. Lleva la punta del pie hacia ti contra la liga y regresa lento. *Errores:* Doblar la rodilla para ayudarte; Hacerlo muy rápido	☐ OK ☐ Edit
Band: toes down Liga: punta abajo strength · 3 × 12 per side	Sit with your leg out and a band around the ball of your foot, holding the ends. Push your toes away against the band, then return slowly. *Mistakes:* Curling only the toes; Letting the band snap back	Sentado con la pierna estirada y una liga en la planta del pie, sosteniendo los extremos. Empuja la punta del pie contra la liga y regresa lento. *Errores:* Doblar solo los dedos; Dejar que la liga regrese de golpe	☐ OK ☐ Edit
Heel raises, both legs Elevación de talones, dos piernas strength · 3 × 15	Stand holding a wall or chair. Rise onto the balls of both feet, pause, and lower slowly. *Mistakes:* Ankles rolling outward; Dropping down fast	De pie, apoyado en una pared o silla. Sube en puntas con ambos pies, haz una pausa y baja lento. *Errores:* Dejar que los tobillos se vayan hacia afuera; Bajar de golpe	☐ OK ☐ Edit
Heel raises, one leg Elevación de talón, una pierna strength · 3 × 12 per side	Stand on one leg, lightly holding a wall. Rise onto the ball of your foot, pause, and lower slowly over 3 seconds. *Mistakes:* Leaning on the wall too much; Ankle rolling outward	De pie en una pierna, apoyado suavemente en la pared. Sube en punta, haz una pausa y baja lento en 3 segundos. *Errores:* Apoyarse demasiado en la pared; Dejar que el tobillo se vaya hacia afuera	☐ OK ☐ Edit
Single-leg balance Equilibrio en una pierna balance · 3 × 30 s per side	Stand on one leg near a wall or counter, knee slightly bent. Hold your balance. Touch the wall only if you need to. *Mistakes:* Locking the knee; Hip dropping to one side	Párate en una pierna cerca de una pared o mesa, con la rodilla un poco doblada. Mantén el equilibrio. Toca la pared solo si lo necesitas. *Errores:* Bloquear la rodilla; Dejar caer la cadera hacia un lado	☐ OK ☐ Edit

Exercise	English	Español	Review
Single-leg balance, eyes closed Equilibrio en una pierna, ojos cerrados balance · 3 × 20 s per side	Same as single-leg balance, next to a wall, with your eyes closed. Open your eyes or touch the wall whenever you need to. *Mistakes:* Doing it away from support; Locking the knee	Igual que el equilibrio en una pierna, junto a una pared, con los ojos cerrados. Abre los ojos o toca la pared cuando lo necesites. *Errores:* Hacerlo lejos de un apoyo; Bloquear la rodilla	☐ OK ☐ Edit
Single-leg reach Alcance en una pierna balance · 2 × 6 per side	Stand on one leg. With the other foot, reach forward, to the side and behind, lightly tapping the floor each time, then return to the center. *Mistakes:* Putting weight on the reaching foot; Knee falling inward	Párate en una pierna. Con el otro pie, alcanza hacia adelante, al costado y atrás, tocando el piso suavemente cada vez, y regresa al centro. *Errores:* Apoyar peso en el pie que alcanza; Dejar que la rodilla se vaya hacia adentro	☐ OK ☐ Edit
Small hops, both legs Saltitos con dos piernas hop · 3 × 15	Hop gently in place on both feet, landing softly on the balls of your feet with knees slightly bent. *Mistakes:* Landing flat and loud; Knees falling inward	Salta suave en el sitio con ambos pies, cayendo despacio sobre la parte delantera del pie con las rodillas un poco dobladas. *Errores:* Caer con todo el pie y haciendo ruido; Rodillas hacia adentro	☐ OK ☐ Edit
Side-to-side hops Saltos de lado a lado hop · 3 × 10	Hop side to side over a line on both feet, landing softly. Progress to one leg when your physio or coach says it's fine. *Mistakes:* Stiff landings; Looking at your feet	Salta de un lado a otro sobre una línea con ambos pies, cayendo suave. Pasa a una pierna cuando tu fisioterapeuta o entrenador te lo indique. *Errores:* Caer con las piernas rígidas; Mirarte los pies	☐ OK ☐ Edit
Hop and hold Salto y mantener hop · 2 × 6 per side	Hop forward from one leg and land on the same leg. Hold the landing still for 2 seconds, knee slightly bent over your toes. *Mistakes:* Wobbling on landing; Knee falling inward	Salta hacia adelante desde una pierna y cae en la misma. Mantén la caída quieta 2 segundos, con la rodilla un poco doblada sobre los dedos. *Errores:* Tambalearse al caer; Rodilla hacia adentro	☐ OK ☐ Edit
Jog with skips and shuffles Trote con skipping y desplazamientos laterales hop · 1 × 240 s	Jog the length of the field or room and back: straight, then skipping, then side shuffles each way, then backward. *Mistakes:* Starting too fast; Crossing your feet on shuffles	Trota de ida y vuelta: recto, luego con skipping, luego desplazamientos laterales a cada lado, luego hacia atrás. *Errores:* Empezar muy rápido; Cruzar los pies en los desplazamientos	☐ OK ☐ Edit

3. Routine templates

Early stage (7 days/week)

- Ankle pumps: 2 × 20
- Ankle alphabet: 1 × 1 per side

Mobility (4 days/week)

- Ankle alphabet: 1 × 1 per side
- Knee to wall: 2 × 10 per side
- Calf stretch: 3 × 30 s per side
- Heel raises, both legs: 2 × 10

Strength (3 days/week)

- Band: foot out: 3 × 12 per side
- Band: foot in: 3 × 12 per side
- Band: toes up: 3 × 12 per side
- Band: toes down: 3 × 12 per side
- Heel raises, both legs: 3 × 15

Balance (5 days/week)

- Single-leg balance: 3 × 30 s per side
- Single-leg reach: 2 × 6 per side
- Heel raises, one leg: 3 × 10 per side

Back to activity (3 days/week)

- Single-leg balance, eyes closed: 3 × 20 s per side
- Heel raises, one leg: 3 × 15 per side
- Small hops, both legs: 3 × 15
- Side-to-side hops: 3 × 10
- Hop and hold: 2 × 6 per side

4. General programs

6-week ankle prevention program

For people with a 'weak' ankle or past sprains who can walk, jog and hop without pain.

Weeks 1–2 (3 days/week). Move on when: You've done most sessions and can balance 30 seconds on each leg without pain.

- Knee to wall: 2 × 10 per side
- Heel raises, both legs: 3 × 15
- Band: foot out: 3 × 12 per side
- Single-leg balance: 3 × 30 s per side

Weeks 3–4 (3 days/week). Move on when: You can do 12 single-leg heel raises on each side and balance 20 seconds with eyes closed, without pain.

- Heel raises, one leg: 3 × 12 per side
- Band: foot out: 3 × 15 per side
- Single-leg balance, eyes closed: 3 × 20 s per side
- Single-leg reach: 2 × 6 per side
- Small hops, both legs: 3 × 15

Weeks 5–6 (3 days/week). Move on when: Keep 2 sessions a week, or switch to the team warm-up before sport.

- Heel raises, one leg: 3 × 15 per side
- Single-leg balance, eyes closed: 3 × 30 s per side
- Side-to-side hops: 3 × 10
- Hop and hold: 2 × 6 per side

General program after a mild ankle sprain

Only after a health professional has seen your ankle and said a general program is fine for you.

Stage 1: Move (7 days/week). Move on when: You can walk normally without limping or pain.

- Ankle pumps: 2 × 20
- Ankle alphabet: 1 × 1 per side
- Calf stretch: 3 × 30 s per side

Stage 2: Strength (3 days/week). Move on when: You can balance 30 seconds on one leg without pain.

- Knee to wall: 2 × 10 per side
- Band: foot out: 3 × 12 per side
- Band: foot in: 3 × 12 per side
- Heel raises, both legs: 3 × 15
- Single-leg balance: 3 × 30 s per side

Stage 3: Balance (3 days/week). Move on when: You can do 10 single-leg heel raises and hop gently on both feet without pain.

- Heel raises, one leg: 3 × 10 per side
- Single-leg balance, eyes closed: 3 × 20 s per side
- Single-leg reach: 2 × 6 per side
- Band: foot out: 3 × 15 per side

Stage 4: Back to activity (3 days/week). Move on when: Before going back to sport, check with your physio, athletic trainer or coach.

- Heel raises, one leg: 3 × 15 per side
- Small hops, both legs: 3 × 15
- Side-to-side hops: 3 × 10
- Hop and hold: 2 × 6 per side

5. Team warm-up (15 min)

1. Jog (4 min)

- Jog with skips and shuffles: 4 min

2. Mobility (2 min)

- Knee to wall: 1 × 10 per side
- Calf stretch: 20 s per side

3. Strength (3 min)

- Heel raises, both legs: 2 × 15
- Heel raises, one leg: 1 × 10 per side

4. Balance (3 min)

- Single-leg balance: 2 × 30 s per side
- Single-leg reach: 1 × 6 per side

5. Hops and landings (3 min)

- Small hops, both legs: 1 × 15
- Side-to-side hops: 2 × 10
- Hop and hold: 1 × 5 per side

Reviewer sign-off

Name: _____ Role: _____ Date: _____