Contents

Table 4.3 14

Table 4.4 15

Supplement 1

The Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) Questionnaire

	Subscale	English	Finnish[a]
1	S	I found it hard to wind down	Minun oli vaikea rauhoittua
2	A	I was aware of dryness of my mouth	Huomasin, että suutani kuivasi
3	D	I couldn't seem to experience any positive feeling at all	Minusta tuntui, etten pystynyt kokemaan myönteisiä tunteita lainkaan
4	A	I experienced breathing difficulty (eg, excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical	Minulla oli hengitysvaikeuksia (esim. hyvin nopeaa hengittämistä tai hengästymistä ilman fyysistä rasitusta)
5	D	I found it difficult to work up the initiative to do things	Minun oli vaikea tarttua toimeen
6	S	I tended to over-react to situations	Minulla oli taipumusta ylireagoida asioihin
7	A	I experienced trembling (eg, in the hands)	Minulla oli vapinan tunnetta (esim. käsien vapinaa)
8	S	I felt that I was using a lot of nervous energy	Olin hyvin levoton ja hermostunut
9	A	I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself	Murehdin tilanteita, joissa saattaisin joutua paniikkiin ja tehdä itseni
10	D	I felt that I had nothing to look forward to	Minusta tuntui, ettei minulla ole mitään odotettavaa tulevaisuudelta
11	S	I found myself getting agitated	Huomasin ärsyyntyväni
12	S	I found it difficult to relax	Minun oli vaikea rentoutua
13	D	I felt down-hearted and blue	Olin alakuloinen ja surullinen
14	S	I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing	En voinut sietää mitään, mikä esti minua jatkamasta sitä, mitä olin tekemässä
15	A	I felt I was close to panic	Tunsin olevani lähellä paniikkia
16	D	I was unable to become enthusiastic about anything	En pystynyt innostumaan mistään
17	D	I felt I wasn't worth much as a person	Minusta tuntui, etten ole kovinkaan arvokas ihmisenä
18	S	I felt that I was rather touchy	Loukkaannuin melko herkästi
19	A	I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (eg, sense of heart rate increase, heart missing	Olin tietoinen sydämeni toiminnasta (sydän tykytti tai löi epätahtiin), vaikka ei ollut kyse fyysisestä rasituksesta
20	A	I felt scared without any good reason	Minua pelotti, vaikkei siihen ollut järkevää syytä
21	D	I felt that life was meaningless	Minusta tuntui, ettei elämällä ole merkitystä

Note. Adapted from "The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories." by P. F. Lovibond and S. H Lovibond, 1995, *Behaviour Research and Therapy*, *33*(3), 335–343. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00075-U. In the public domain.

[a] See also at the webpage of the School of Psychology of the University of New South Wales:

Supplement 2

The raw differences in sample distribution and reliability statistics between Finnish and non-Finnish responses (2022)

	Range	Working-age cohort (ages 24–45; n_1 = 3,101; n_2 = 105)									Older cohort (ages 60–82; n_1 = 5,462; n_2 = 303)								
		m	md	*SD*	ske	kurt	α	ω_h	ω_{tot}	SEm	m	md	*SD*	ske	kurt	α	ω_h	ω_{tot}	SEm
D	0–	.25	0	.49	.09	-1.0	.04	.11	.03	-.03	.36	1	-.23	-.33	-1.5	-.01	.00	-.01	-.01
A	0–	-.07	-1	-.06	.06	-0.2	.01	.36	-.01	.01	.08	0	-.34	-.61	-3.3	-.04	-.04	-.06	.05
S	0–	.19	0	.01	.04	-0.1	.01	-.02	.00	.00	-.01	0	-.32	-.26	-1.0	.00	.06	-.01	-.06
GD	0–	.36	-1	.25	-.11	-2.2	.00	.02	.00	-.06	.43	1	-.94	-.53	-2.7	-.01	.03	-.01	-.73
Q1	0–7	-.02	0	.01	-.04	-0.2					-.03	0	-.05	-.02	0.28				
Q2	0–7	.12	0	-.02	-.34	-0.6					.04	0	-.07	-.11	0.11				
Q3	0–7	.06	0	.05	-.09	-0.4					.11	0	.02	-.94	-4.6				
Q4	0–7	.02	0	.06	.33	2.14					.01	0	-.01	-.18	-0.8				
Q5	0–7	.31	0	.13	-.30	-1.0					.21	1	.04	-.30	-0.5				
Q6	0–7	.00	0	-.02	-.11	-0.2					.05	0	.00	-.25	-0.8				
Q7	0–7	.02	0	-.03	-.68	-4.8					.04	0	.01	-.60	-4.0				
Q8	0–7	-.04	0	-.03	-.02	-0.1					-.08	0	-.12	-.05	0.12				
Q9	0–7	.01	0	.00	-.15	-0.9					-.06	0	-.11	.13	1.22				
Q10	0–7	-.06	0	.00	.19	0.28					.00	0	-.09	-.26	-0.6				
Q11	0–7	.36	0	.01	-.27	-0.1					.06	0	-.12	-.37	-0.0				
Q12	0–7	.00	0	.00	.21	0.58					.04	0	.00	-.18	-0.5				
Q13	0–7	-.01	0	.01	.16	0.48					.04	0	-.05	-.32	-0.7				
Q14	0–7	-.13	0	.01	.68	1.90					-.04	0	-.09	.00	0.54				
Q15	0–7	-.10	0	-.06	.89	4.72					-.06	0	-.14	.72	7.41				
Q16	0–7	-.08	0	.01	.50	1.66					-.04	0	-.08	-.12	-0.3				
Q17	0–7	.02	0	.08	-.01	-0.8					.05	0	.01	-.35	-1.7				
Q18	0–7	.01	0	-.02	-.22	-0.9					-.02	0	-.05	-.08	-0.0				
Q19	0–7	-.07	0	-.03	.45	1.90					.08	0	.05	-.27	-1.0				
Q20	0–7	-.06	0	-.08	.04	-0.1					.03	0	-.02	-.53	-2.9				
Q21	0–7	.00	0	.08	.26	0.13					.00	0	-.07	-.24	-0.8				

Supplement 2

The raw differences in sample distribution and reliability statistics between Finnish and non-Finnish responses (2022)

		Working-age cohort (ages 24–45; n_1 = 3,101; n_2 = 105)									Older cohort (ages 60–82; n_1 = 5,462; n_2 = 303)								
	Range	m	md	*SD*	ske	kurt	α	ω_h	ω_{tot}	SEm	m	md	*SD*	ske	kurt	α	ω_h	ω_{tot}	SEm
D	0–	.25	0	.49	.09	-1.0	.04	.11	.03	-.03	.36	1	-.23	-.33	-1.5	-.01	.00	-.01	-.01

Note. SEm = SD × √(1 - reliability). n_1 = Finnish answers, n_2 = non-Finnish answers. Skew estimated as G_1, kurtosis as G_2. For details, see Joanes, D. N., & Gill, C. A. (1998). Comparing measures of sample skewness and kurtosis. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 47(1), 183–189. https://doi.org/10.1111/1467-9884.00122

Supplement 3

Table 3.1

Attrition analysis in the working-aged cohort. All values for variables measured in 2017

	Men (n = 613)			Women (n = 2,488)			All (N = 3,101)		
	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p
Age	32.8 [32.6-33]	31.9 [31.6-32.2]	.040*	32.3 [32.2-32.4]	31.1 [31-31.2]	< .001**	32.4 [32.3-32.5]	31.3 [31.2-31.4]	< .001**
BMI	26.1 [25.9-26.3]	25.8 [25.6-26]	.270	25 [24.8-25.2]	24.9 [24.8-25]	.500	25.2 [25.1-25.3]	25.1 [25-25.2]	.350
RAND-36									
Physical functioning	95.3 [94.7-95.9]	96.1 [95.5-96.7]	.360	94.7 [94.4-95]	93.8 [93.4-94.2]	.110	94.8 [94.5-95.1]	94.3 [94-94.6]	.300
Physical role functioning	87.5 [86-89]	88.1 [86.6-89.6]	.780	83.8 [83-84.6]	82.5 [81.6-83.4]	.350	84.6 [83.9-85.3]	83.8 [83-84.6]	.520
Emotional role functioning	81.7 [79.9-83.5]	84.1 [82.4-85.8]	.400	80.2 [79.2-81.2]	81 [80-82]	.590	80.5 [79.6-81.4]	81.7 [80.9-82.5]	.370
Energy/fatigue	59.6 [58.5-60.7]	62.3 [61.2-63.4]	.120	56.1 [55.5-56.7]	56.4 [55.8-57]	.740	56.8 [56.3-57.3]	57.7 [57.2-58.2]	.250
Emotional wellbeing	73.1 [72.1-74.1]	75.1 [74.2-76]	.190	72.4 [71.9-72.9]	72.1 [71.6-72.6]	.680	72.5 [72.1-72.9]	72.7 [72.3-73.1]	.770
Social functioning	84.5 [83.4-85.6]	86.5 [85.5-87.5]	.220	82.5 [81.9-83.1]	82.5 [81.9-83.1]	.960	82.9 [82.4-83.4]	83.4 [82.9-83.9]	.510
Pain	81.5 [80.5-82.5]	82.4 [81.4-83.4]	.570	75.5 [74.9-76.1]	76.2 [75.6-76.8]	.520	76.8 [76.3-77.3]	77.6 [77.1-78.1]	.340
General Health	69.5 [68.4-70.6]	70.8 [69.7-71.9]	.450	68.1 [67.5-68.7]	67 [66.4-67.6]	.220	68.4 [67.9-68.9]	67.8 [67.3-68.3]	.510

Table 3.1

Attrition analysis in the working-aged cohort. All values for variables measured in 2017

	Men (n = 613)			Women (n = 2,488)			All (N = 3,101)		
	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p
Age	32.8 [32.6-33]	31.9 [31.6-32.2]	.040*	32.3 [32.2-32.4]	31.1 [31-31.2]	< .001**	32.4 [32.3-32.5]	31.3 [31.2-31.4]	< .001**
BMI	26.1 [25.9-26.3]	25.8 [25.6-26]	.270	25 [24.8-25.2]	24.9 [24.8-25]	.500	25.2 [25.1-25.3]	25.1 [25-25.2]	.350
Highest educational attainment [ISCED 2011]									
Middle school or below [1–2]	201 (0.28)	188 (0.35)		550 (0.2)	564 (0.31)		751 (0.21)	752 (0.32)	
High school or equivalent [3–4]	309 (0.43)	220 (0.41)		1,358 (0.49)	805 (0.44)		1,667 (0.47)	1,025 (0.43)	
University or equivalent [5–8]	216 (0.3)	129 (0.24)		877 (0.31)	466 (0.25)		1,093 (0.31)	595 (0.25)	
Marital status									
Single	451 (0.62)	364 (0.68)		1,691 (0.61)	1,195 (0.65)		2,142 (0.61)	1,559 (0.66)	
Married or cohabiting	274 (0.38)	173 (0.32)		1,088 (0.39)	640 (0.35)		1,362 (0.39)	813 (0.34)	
Divorced or widowed	1 (0)	0 (0)		4 (0)	0 (0)		5 (0)	0 (0)	
Employment status									
Professionals and managers	222 (0.32)	130 (0.25)		761 (0.28)	430 (0.24)		983 (0.29)	560 (0.24)	
Semi-professionals	203 (0.29)	147 (0.29)		1,199 (0.44)	684 (0.38)		1,402 (0.41)	831 (0.36)	
Routine workers	274 (0.39)	235 (0.46)		779 (0.28)	662 (0.37)		1,053 (0.31)	897 (0.39)	
Other employment	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	

Table 3.1

Attrition analysis in the working-aged cohort. All values for variables measured in 2017

	Men (*n* = 613)			Women (*n* = 2,488)			All (*N* = 3,101)		
	2017 sampl	2022 sampl	*p*	2017 sampl	2022 sampl	*p*	2017 sampl	2022 sampl	*p*
Age	32.8 [32.6-33]	31.9 [31.6-32.2]	.040*	32.3 [32.2-32.4]	31.1 [31-31.2]	< .001**	32.4 [32.3-32.5]	31.3 [31.2-31.4]	< .001**
BMI	26.1 [25.9-26.3]	25.8 [25.6-26]	.270	25 [24.8-25.2]	24.9 [24.8-25]	.500	25.2 [25.1-25.3]	25.1 [25-25.2]	.350
Retired or unemployed	3 (0)	0 (0)		2 (0)	4 (0)		5 (0)	4 (0)	

Note. N = 5,898 [4,630 women]; 95 % confidence interval given. p-values from Welch's unequal variances T-test.

Table 3.2

Attrition analysis in the older cohort. All values for variables measured in 2017

	Men (n = 613)			Women (n = 4,73)			All (N = 5,462)		
	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p
Age	66.2 [66-66.4]	66.7 [66.5-66.9]	.440	65.1 [65-65.2]	66 [65.8-66.2]	< .001***	65.3 [65.2-65.4]	66.1 [66-66.2]	< .001***
BMI	26.9 [26.8-27]	27.5 [27.3-27.7]	.150	26.7 [26.6-26.8]	26.9 [26.8-27]	.420	26.7 [26.6-26.8]	27 [26.9-27.1]	.140
RAND-36									
Physical functioning	86.9 [86.4-87.4]	76.6 [75.7-77.5]	< .001***	81 [80.6-81.4]	74.9 [74.4-75.4]	< .001***	82 [81.6-82.4]	75.3 [74.8-75.8]	< .001***
Physical role functioning	77.9 [76.8-79]	61.9 [60.5-63.3]	< .001***	72.2 [71.4-73]	63.1 [62.2-64]	< .001***	73.2 [72.4-74]	62.8 [61.9-63.7]	< .001***
Emotional role functioning	83.6 [82.6-84.6]	70.9 [69.6-72.2]	< .001***	79.8 [79-80.6]	71.7 [70.8-72.6]	< .001***	80.5 [79.8-81.2]	71.5 [70.7-72.3]	< .001***
Energy/fatigue	67.2 [66.6-67.8]	60.6 [59.9-61.3]	< .001***	64.1 [63.7-64.5]	62.6 [62.1-63.1]	.070	64.7 [64.3-65.1]	62.1 [61.7-62.5]	< .001***
Emotional wellbeing	81.3 [80.8-81.8]	75.5 [74.8-76.2]	< .001***	79.7 [79.4-80]	77.5 [77.1-77.9]	< .001***	80 [79.7-80.3]	77.1 [76.7-77.5]	< .001***
Social functioning	88 [87.4-88.6]	80.6 [79.8-81.4]	< .001***	85.2 [84.7-85.7]	81.2 [80.7-81.7]	< .001***	85.7 [85.3-86.1]	81 [80.5-81.5]	< .001***
Pain	75.9 [75.2-76.6]	72.2 [71.4-73]	.080	70.3 [69.8-70.8]	67.2 [66.7-67.7]	< .001***	71.3 [70.8-71.8]	68.3 [67.8-68.8]	< .001***
General Health	61.8 [61.2-62.4]	54.4 [53.7-55.1]	< .001***	62 [61.6-62.4]	57.3 [56.8-57.8]	< .001***	61.9 [61.5-62.3]	56.6 [56.2-57]	< .001***

Table 3.2

Attrition analysis in the older cohort. All values for variables measured in 2017

	Men (n = 613)			Women (n = 4,73)			All (N = 5,462)		
	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p	2017 sampl	2022 sampl	p
Age	66.2 [66-66.4]	66.7 [66.5-66.9]	.440	65.1 [65-65.2]	66 [65.8-66.2]	< .001***	65.3 [65.2-65.4]	66.1 [66-66.2]	< .001***
BMI	26.9 [26.8-27]	27.5 [27.3-27.7]	.150	26.7 [26.6-26.8]	26.9 [26.8-27]	.420	26.7 [26.6-26.8]	27 [26.9-27.1]	.140
Highest educational attainment [ISCED 2011]									
Middle school or below [1–2]	173 (0.18)	75 (0.26)		758 (0.17)	298 (0.3)		1,003 (0.17)	893 (0.3)	
High school or equivalent [3–4]	437 (0.45)	138 (0.49)		2,487 (0.55)	526 (0.52)		3,158 (0.54)	1,529 (0.51)	
University or equivalent [5–8]	370 (0.38)	71 (0.25)		1,260 (0.28)	178 (0.18)		1,736 (0.29)	562 (0.19)	
Marital status									
Single	74 (0.08)	37 (0.13)		521 (0.12)	144 (0.14)		595 (0.11)	181 (0.14)	
Married or cohabiting	166 (0.17)	42 (0.15)		422 (0.09)	104 (0.1)		588 (0.11)	146 (0.11)	
Divorced or widowed	604 (0.62)	138 (0.5)		2,324 (0.52)	439 (0.44)		2,928 (0.54)	577 (0.45)	
Employment status									
Professionals and managers	177 (0.19)	31 (0.12)		539 (0.12)	82 (0.09)		716 (0.13)	113 (0.09)	
Semi-professionals	54 (0.06)	16 (0.06)		540 (0.12)	83 (0.09)		594 (0.11)	99 (0.08)	
Routine workers	106 (0.11)	29 (0.11)		704 (0.16)	159 (0.17)		810 (0.15)	188 (0.15)	

Table 3.2

Attrition analysis in the older cohort. All values for variables measured in 2017

	Men (*n* = 613)			Women (*n* = 4,73)			All (*N* = 5,462)		
	2017 sampl	2022 sampl	*p*	2017 sampl	2022 sampl	*p*	2017 sampl	2022 sampl	*p*
Age	66.2 [66-66.4]	66.7 [66.5-66.9]	.440	65.1 [65-65.2]	66 [65.8-66.2]	< .001***	65.3 [65.2-65.4]	66.1 [66-66.2]	< .001***
BMI	26.9 [26.8-27]	27.5 [27.3-27.7]	.150	26.7 [26.6-26.8]	26.9 [26.8-27]	.420	26.7 [26.6-26.8]	27 [26.9-27.1]	.140
Other employment	< 10	< 10		12 (0)	< 10		19 (0)	< 10	
Retired or unemployed	610 (0.64)	191 (0.71)		2,624 (0.59)	631 (0.66)		3,234 (0.6)	822 (0.67)	

Note. *N* = 5,898 [4630 women]; 95 % confidence interval given. p-values from Welch's unequal variances T-test. Subgroup sizes below 10 hidden for privacy.

Supplement 4

Table 4.1

The correlation matrix between the DASS-21 items in the working-age cohort (n = 3,101) before fitting

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q2	Q21
Q1	1.0																				
Q2	0.5	1.0																			
Q3	0.5	0.4	1.0																		
Q4	0.6	0.5	0.5	1.0																	
Q5	0.6	0.5	0.5	0.6	1.0																
Q6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	1.0															
Q7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0														
Q8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1.0													
Q9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1.0												
Q1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0											
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	1.0										
Q1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0									
Q1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	1.0								
Q1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	1.0							
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	1.0						
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0					
Q1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	1.0				
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	1.0			
Q1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	1.0		
Q2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	1.0	
Q2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	1.00

Note. Autocorrelations on the diagonal. The correlations are polychoric (Olsson et al., 1970).

Table 4.2

The correlation matrix between the DASS-21 items in the older cohort (n = 5,462) before fitting

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q2	Q2
Q1	1.0																				
Q2	0.4	1.0																			
Q3	0.5	0.4	1.0																		
Q4	0.5	0.4	0.5	1.0																	
Q5	0.5	0.4	0.5	0.6	1.0																
Q6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	1.0															
Q7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0														
Q8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0													
Q9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1.0												
Q1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0											
Q1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	1.0										
Q1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	1.0									
Q1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	1.0								
Q1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	1.0							
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	1.0						
Q1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	1.0					
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	1.0				
Q1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0			
Q1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	1.0		
Q2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	
Q2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	1.0

Note. Autocorrelations on the diagonal. The correlations are polychoric (Olsson et al., 1970).

Table 4.3

The residual correlation matrix between the DASS-21 items in the working-age cohort (n = 3,101) after fitting the bifactor solution

		Q3	Q5	Q10	Q13	Q16	Q17	Q21	Q2	Q4	Q7	Q9	Q15	Q19	Q20	Q1	Q6	Q8	Q11	Q12	Q14
D*	Q3																				
	Q5	-0.01																			
	Q10	-0.01	-0.01																		
	Q13	0.02	0.01	0.00																	
	Q16	0.03	0.02	-0.01	0.01																
	Q17	-0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.01															
	Q21	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.01														
A*	Q2	0.01	0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00													
	Q4	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.03												
	Q7	0.00	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.02	-0.01											
	Q9	-0.01	-0.02	0.04	-0.01	0.00	0.04	0.01	-0.02	-0.01	0.00										
	Q15	0.00	-0.03	0.01	-0.01	0.03	0.02	0.02	-0.03	0.00	0.01	0.03									
	Q19	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01								
	Q20	0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.01	0.03	0.03	-0.03	-0.01	-0.01	0.03	0.03	0.02							
S*	Q1	0.02	0.04	-0.02	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.02	-0.01						
	Q6	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.00					
	Q8	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00				
	Q11	-0.01	0.04	-0.01	0.03	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	0.00	-0.03	-0.02	0.04	-0.01			
	Q12	0.01	0.04	0.00	0.03	0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.02		
	Q14	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.01	
	Q18	-0.01	-0.03	0.00	0.01	-0.01	0.04	0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.07	-0.03	0.05	-0.01	0.00

Table 4.4

The residual correlation matrix between the DASS-21 items in the older cohort (n = 5,462) after fitting the bifactor solution

		Q3	Q5	Q10	Q13	Q16	Q17	Q21	Q2	Q4	Q7	Q9	Q15	Q19	Q20	Q1	Q6	Q8	Q11	Q12	Q14
D*	Q3																				
	Q5	0.00																			
	Q10	0.00	-0.01																		
	Q13	0.02	0.02	0.00																	
	Q16	0.01	0.03	-0.01	0.00																
	Q17	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.01															
	Q21	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	-0.01	0.04														
A*	Q2	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01													
	Q4	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.02												
	Q7	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00											
	Q9	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.02										
	Q15	0.00	-0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	-0.02	0.00	0.01	0.04									
	Q19	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00								
	Q20	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.03	0.02	0.03							
S*	Q1	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01						
	Q6	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00					
	Q8	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00				
	Q11	-0.01	0.02	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.03	0.00			
	Q12	0.01	0.02	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.01		
	Q14	0.00	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
	Q18	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	-0.01	0.03	-0.01	0.00

Supplement 5

Table 5.1

Norms for Finnish-speaking adults under 45. Cumulative probabilities of scores on each of the subscales and general distress (total score) of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) questionnaire

Raw	Percentile Rank (*PR*)				*PR*		*PR*
score,	Depression	Anxiety	Stress		GD		GD
0	9.9	13.8	4.7	0	2.5	22	87.4
1	30	39.1	13.8	1	7.1	23	88.5
2	48.6	58.7	23.1	2	11.9	24	89.6
3	61.5	71.7	33.5	3	17.5	25	90.6
4	69.7	80.3	44.4	4	23.3	26	91.5
5	75.8	85.6	54.9	5	29	27	92.5
6	80.5	89.5	64.6	6	35.4	28	93.3
7	84.5	92.5	72.8	7	41.7	29	94
8	87.6	94.4	78.9	8	47.2	30	94.6
9	90	95.6	83.6	9	52.6	31	95
10	92.1	96.9	87.6	10	57.8	32	95.3
11	93.7	97.8	90.5	11	62.3	33	95.7
12	94.8	98.4	92.6	12	65.9	34	96.1
13	95.9	98.9	94.3	13	69.5	35	96.5
14	96.9	99.3	95.8	14	72.7	36	96.9

Table 5.1

Norms for Finnish-speaking adults under 45. Cumulative probabilities of scores on each of the subscales and general distress (total score) of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) questionnaire

Raw	Percentile Rank (*PR*)				*PR*		*PR*
score,	Depression	Anxiety	Stress		GD		GD
0	9.9	13.8	4.7	0	2.5	22	87.4
1	30	39.1	13.8	1	7.1	23	88.5
15	97.6	99.6	97	15	75.2	37	97.3
16	98.1	99.7	97.8	16	77.3	38	97.6
17	98.6	99.8	98.7	17	79.4	39	97.8
18	98.9	99.9	99.3	18	81.2	40	98.1
19	99.3		99.6	19	82.8	41	98.4
20	99.5	99.9	99.8	20	84.6	42	98.6
21	99.9	100	99.9	21	86.3	44	>99

Note. The maximum on the GD scale is 63. We cut values above 99% for legibility. Data derive from the working-age cohort (N = 3,101 [2,488 women]). D = Depression; A = Anxiety; S = Stress; GD = General distress.

Table 5.2

Norms for Finnish-speaking adults over 45. Cumulative probabilities of scores on each of the subscales and general distress (total score) of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) questionnaire

Raw	Percentile Rank (*PR*)				*PR*		*PR*
score,	Depression	Anxiety	Stress		GD		GD
0	11.4	11.8	9.1	0	3.3	22	91.4
1	32.2	35.8	25.4	1	9.8	23	92.3
2	49.1	56.3	39.9	2	16.5	24	93.3
3	61.2	70.6	52.9	3	23.6	25	94.1
4	69.9	80.5	63.7	4	31	26	94.8
5	76.6	86.6	72.5	5	38.1	27	95.4
6	82.3	90.5	80.1	6	45	28	95.9
7	86.8	93.4	85.9	7	51	29	96.3
8	89.8	95.3	89.9	8	56.4	30	96.6
9	92	96.6	92.6	9	61.2	31	96.9
10	93.7	97.6	94.6	10	65.5	32	97.1
11	95	98.2	96.2	11	69.6	33	97.4
12	96	98.6	97.3	12	73.1	34	97.7
13	96.8	99	98.1	13	76.1	35	97.9
14	97.5	99.2	98.6	14	78.7	36	98.1
15	98.1	99.5	99	15	81.2	37	98.3
16	98.5	99.6	99.3	16	83.4	38	98.5
17	98.9	99.7	99.6	17	85.4	39	98.7
18	99.3	99.8	99.8	18	87.1	40	98.8

Table 5.2

Norms for Finnish-speaking adults over 45. Cumulative probabilities of scores on each of the subscales and general distress (total score) of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) questionnaire

Raw	Percentile Rank (*PR*)				*PR*		*PR*
score,	Depression	Anxiety	Stress		GD		GD
0	11.4	11.8	9.1	0	3.3	22	91.4
1	32.2	35.8	25.4	1	9.8	23	92.3
19	99.5	99.9	99.9	19	88.5	41	99
20	99.7	99.9	99.9	20	89.6	42	>99
21	99.9	100	100	21	90.6		

Note. The maximum on the GD scale is 63. We cut values above 99% for legibility. Data derive from the older cohort (N = 5,462 [4,473 women]). D = Depression; A = Anxiety; S = Stress; GD = General distress.