

ACHAR A CAUSA

Comportamento = comunicação

procure a causa antes do rótulo

Médicas

DOR (nº1!), delirium/ITU, fármacos, constipação/bexiga

Ambiente/demanda

ruído, escuro (sundowning), tarefa difícil, abordagem

DICE (não-farm 1º)

D-I-C-E

Describe · Investigate · Create · Evaluate (ciclo)

Estratégias

rotina, ambiente calmo/iluminado, música, atividade, comunicação

Cuidador coterapeuta

psicoeducação, manejo, respiro, Zarit, plano de crise

FÁRMACO SEGURO

Quando

sofrimento/risco + falha não-farm; alvo, dose baixa, prazo

Antipsicóticos

black box (↑AVC/morte); CATIE-AD modesto; reavaliar/desprescrever

Opções

brexpiprazol (FDA 2023) · risperidona curto · citalopram (QT)

EVITAR

DCL: típicos · benzo de rotina · anticolinérgico · contenção

POR SINTOMA

Agitação/agressão

desescalar, segurança, tratar dor; fármaco só se risco

Psicose

tratar se incomoda; DCL → cautela máxima

Depressão × apatia

apatia ≠ depressão (sem tristeza; não responde a ISRS)

Sono/sundowning

luz de dia, rotina, ambiente; evitar hipnótico de rotina

A RÉGUA

Comportamento é COMUNICAÇÃO — antes do remédio, ache o GATILHO. Use o ciclo DICE. Não-farmacológico é 1ª linha; fármaco só com alvo, dose baixa e prazo, ciente da black box.

ALERTAS

- **DCL:** evitar antipsicótico típico (reação grave).
- **Dor** é a causa mais esquecida da agitação.
- **Benzo/contenção:** não de rotina (pioram).