

EBOOK MIỄN PHÍ

CẨM NANG LUYỆN NGỦ

Hành trình Euro tự ngủ

Cho con 0–12 tháng

TÁC GIẢ

Dược sĩ Thiều Vân Anh

Mẹ Euro · 5 em bé trong nhà đã đi qua hành trình này

"Con ngủ ngon — mẹ mới lành lặn để yêu thương."



Đêm thứ 47 không ngủ liền 3 tiếng...

Đó là 10 năm trước — với bé đầu lòng của tôi.

10 năm trước, tôi ngồi trên giường, nước mắt rơi xuống tay bé đầu lòng lúc 3 giờ sáng. Đó là đêm thứ **47** tôi không được ngủ một mạch quá 3 tiếng. Bé khóc dạ đề, thức 7–8 lần mỗi đêm, mỗi lần phải bế ru gần 1 tiếng mới ngủ lại.

Tôi là dược sĩ. Tôi đã đọc hàng chục cuốn sách. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình *bất lực* với một sinh linh nhỏ xíu — vì cả nhà ai cũng bảo "trẻ con khóc đêm là chuyện thường".

*Đó là đêm tôi quyết định: thế hệ con sau của tôi sẽ **KHÔNG** đi qua những đêm này nữa.*

10 năm — và 5 em bé sau

Sau bé đầu, tôi đọc — đọc rất nhiều. **Harvey Karp (5S)**, **Tracy Hogg (EASY, 4S, PUPD)**, các nghiên cứu về hormone melatonin và chu kỳ REM trẻ sơ sinh. Tôi áp dụng **có hệ thống** với từng em bé trong nhà — mỗi bé tôi học thêm một điều.

Đến Euro, tôi đã rút kinh nghiệm trọn vẹn. Tôi áp dụng đúng từ **từ tuần đầu sau sinh**.

KẾT QUẢ VỚI EURO

- **Từ tuần đầu:** Euro không khóc đêm — chỉ dậy ti mẹ khi đói, ti xong ngủ tiếp ngay.
- **6 tuần:** con ngủ xuyên đêm, chỉ dậy ti mẹ khi đói.
- **3 tháng:** con ngủ xuyên đêm, chỉ dậy ti mẹ khi đói.

Lời hứa của ebook này

15 trang này gói gọn **10 năm và 5 em bé** tôi đã học — để bạn không phải đi qua đêm thứ 47 như tôi ngày xưa. Bạn có thể bắt đầu áp dụng **ngay đêm nay**.

Tôi viết bằng tư cách **một dược sĩ** (để bạn yên tâm về khoa học) và **một người mẹ Việt** (để bạn không thấy lạc lõng giữa lời "ông bà bảo").

— Thiều Vân Anh

Mục lục & Cách dùng ebook

Đọc 1 lượt — in templates — áp dụng theo tháng tuổi của con.

Phần	Nội dung	Trang
1	Hiểu giấc ngủ của con (góc nhìn Dược sĩ)	4
2	Lịch sinh hoạt EASY	5
3	3 phương pháp dỗ ngủ cốt lõi (5S · 4S · PUPD)	6
4	Quy trình đặt cũi tự ngủ	7
5	Vũ hỗ trợ chuyển giấc	8
6	4 giai đoạn luyện ngủ theo tháng tuổi	9
7	Đối thoại "Ông bà bảo" (văn hoá Việt)	10
	Templates: Nhật ký · Checklist · Lịch EASY	11–13
	FAQ — 10 câu hỏi mẹ thường hỏi	14
	Lời kết & Bước tiếp theo	15

4 bước dùng ebook hiệu quả nhất

1. **Đọc 1 lượt** từ đầu đến cuối — đừng bỏ Phần 1 (khoa học là nền).
2. In **3 trang Templates (11–13)** ra giấy, dán lên tủ lạnh hoặc cạnh cũi.
3. **Áp dụng từng giai đoạn** theo tháng tuổi của con — đừng nhảy bước.
4. **Đọc lại mỗi tháng** — bạn sẽ thấy những điều bỏ sót lần đầu.

 Nếu đang vội: đi thẳng đến **Phần 6 (trang 9)** — tìm độ tuổi của con, làm đúng việc tháng đó cần làm.

 Ebook này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân + tổng hợp khoa học, không thay thế tư vấn bác sĩ Nhi. Nếu con có dấu hiệu bất thường (sốt, bỏ bú, lơ đãng, khóc thét bất thường), đưa con đến cơ sở y tế ngay. **Tuyệt đối không** áp dụng phương pháp luyện tự ngủ cho bé **dưới 4 tháng**. Giai đoạn 0–3m chỉ tập trung dỗ ngủ thuận tự nhiên (5S) và xây nếp ngày.

Phần 1 — Hiểu giấc ngủ của con

Góc nhìn Dược sĩ: vì sao các phương pháp hoạt động.



Vì sao con tỉnh sau đúng 40 phút?

Đây không phải con "kén ngủ" — là **sinh học**. Một chu kỳ giấc ngủ trẻ sơ sinh kéo dài **40–50 phút** (người lớn 90 phút): **REM** (giấc động, dễ tỉnh, chiếm 50%) và **NREM** (giấc sâu). Giữa 2 chu kỳ, bé thức nhẹ vài giây để "kiểm tra môi trường". Nếu khác lúc ngủ → **bé khóc**.

Đây là lý do "bé chỉ ngủ 30–45 phút rồi dậy" — không phải lỗi của bạn.

Hai hormone quyết định giấc ngủ

Hormone	Vai trò	Khi nào tăng
Melatonin	Khiến bé buồn ngủ	Khi bóng tối — tiết từ 19h
Cortisol	Khiến bé tỉnh táo	Khi overtired (quá mệt) hoặc stress

2 quy tắc vàng: ① Phòng ngủ tối = melatonin tiết nhiều = dễ vào giấc. ② Đặt bé ngủ **sớm** = tránh cortisol tăng vọt = ngủ sâu hơn.

💡 **Phản trực giác:** Bé càng mệt thì càng **khó ngủ**, không phải càng dễ ngủ.


🌟 **Cửa sổ thức (Wake Window)** là khoảng thời gian bé có thể thức trước giấc ngủ kế tiếp — thay đổi theo tháng tuổi. Xem bảng chi tiết ở Trang 5 (Phần EASY).

👵 Ông bà bảo: "Con khóc là đói"

80% trường hợp con khóc sau khi vừa bú không lâu là **overtired** chứ không phải đói. Trước khi cho bú lần nữa, hãy thử vỗ về và đưa đi ngủ.

Phần 2 — Lịch sinh hoạt EASY

Học theo EASY — nhưng không rập khuôn. Để mẹ canh được nhịp thức-ngủ ngày của con.



EASY là chu trình 4 bước Tracy Hogg đề xuất, lặp lại suốt ngày: E — Eat (Ăn) · A — Activity (Chơi) · S — Sleep (Ngủ) · Y — Your time (Mẹ).

💡 **Triết lý của tôi:** Học theo EASY, nhưng **KHÔNG** rập khuôn. Mỗi bé là cá thể riêng. Tôi dùng EASY để **canh** thời gian thức (wake window) và bố trí các giấc ngủ ngày hợp lý — không bắt con đúng phút đúng giờ.

Vì sao tách Eat khỏi Sleep (không bú-ngủ liền) là cốt lõi?

Nếu bé luôn ngủ trên ti, bé sẽ liên kết "bú = ngủ". Khi tỉnh giữa giấc, bé **KHÔNG** biết tự ngủ lại nếu thiếu ti. Đây là gốc rễ của 70% vấn đề ngủ đêm. Đó là điều quan trọng nhất tôi học được từ EASY.

🕒 Bảng EASY theo tháng tuổi (tham khảo "Nuôi con không phải là cuộc chiến")

Tháng tuổi	Lịch EASY	Thời gian thức	Số nap	Giấc đêm liền
0–6 tuần	EASY 3	45–60 phút	4–5 nap	3–4h
6w–3 tháng	EASY 3	1–1.5 giờ	4 nap	5–7h
3–4 tháng	EASY 3.5–4	1.5–2 giờ	3–4 nap	7–10h
4–6 tháng	EASY 4	2–2.5 giờ	3 nap	10–11h
6–9 tháng	EASY 2-3-4	2.5–3 giờ	2 nap	11–12h
9–12 tháng	EASY 2-3-4	3–4 giờ	2 nap	11–12h

💡 **EASY 3** = chu kỳ 3 tiếng (Ăn → Chơi → Ngủ → lặp). **EASY 4** = chu kỳ 4 tiếng. **EASY 2-3-4** = chu kỳ thức xen kẽ 2–3–4 tiếng theo giấc.

📅 Lịch EASY theo giờ cụ thể → xem Template Trang 13.

🌱 HÀNH TRÌNH CỦA EURO

Tôi áp dụng EASY linh hoạt từ tuần đầu — không bắt Euro đúng phút, chỉ canh cửa sổ thức. Tháng đầu cửa sổ thức 45–60 phút → tôi nhìn đồng hồ, khi gần 50 phút là đặt nằm giường, Euro tự rúc và ngủ. Sang 3 tháng, Euro vào nhịp EASY 3 giờ tự nhiên — không cần ép. Đến 6 tháng, mẹ chỉ cần nhìn đồng hồ là biết 10 phút nữa Euro cần ngủ.

Phần 3 — 3 phương pháp dỗ ngủ cốt lõi

Tôi không chọn 1 phương pháp duy nhất. Tôi dùng đúng phương pháp cho đúng giai đoạn.



1. Phương pháp 5S (Harvey Karp) — Dùng cho 0–4 tháng

5 bước mô phỏng môi trường trong bụng mẹ

Swaddle · Quấn	Quấn chặt thân, tay áp sát người
Side/Stomach · Bế nghiêng/úp	Chỉ khi DỒ — không đặt ngủ úp
Shush · Suyt	"Sssss" sát tai, to bằng tiếng khóc của bé
Swing · Lắc	Lắc nhẹ, biên độ 2–3cm, nhanh
Suck · Mút	Tì mẹ, tì giả, ngón tay

⚠ Mục tiêu 5S là DỒ — không phải luyện tự ngủ.



2. Phương pháp 4S (Tracy Hogg) — Dùng cho 4 tháng trở lên

Đặt bé vào cũi/giường khi còn thức, để bé tự ngủ

Setting the stage	Tối, mát (22–24°C), tiếng ồn trắng
Swaddling	Bé chưa lật → quấn; lật được → sleeping bag
Sitting quietly	3–5 phút, không nói chuyện, không lắc mạnh
Shush-pat	Đặt cũi khi buồn ngủ — vỗ mông + suyt sát tai



3. Bế lên–Đặt xuống (PUPD) — Dùng cho 4–8 tháng

Phương pháp trấn an có giới hạn — KHÔNG để bé khóc một mình

- Đặt bé vào cũi khi **buồn ngủ + còn thức**.
- Bé khóc → **bế lên đỡ đến khi NÍN** (không phải đến khi ngủ).
- Nín → **đặt xuống ngay**, dù bé vẫn thức.
- Khóc tiếp → lặp lại. Lần đầu 20–80 lần. Sau 3–7 đêm: bé hiểu "cũi = nơi ngủ".

Bảng quyết định: Dùng phương pháp nào?

Tình huống	Phương pháp
Bé 0–3m, khóc dạ đề	5S (đầy đủ 5 bước)
Bé 3–4m, đang ngủ trên tay	5S + bắt đầu giảm dần lắc
Bé 4–6m, khó tự vào giấc	4S (đặt khi còn thức)
Bé 4m+, đặt xuống là khóc dữ	PUPD
Bé 6m+, khóc khi đặt xuống	Ưu tiên PUPD hoặc 4S

Phần 4 — Quy trình đặt cũi/giường tự ngủ

Phần "vàng" — nhiều mẹ thiếu chính bước này.



Nhận biết dấu hiệu buồn ngủ SỚM

Đừng đợi bé khóc mới đặt ngủ. Khóc = quá cửa sổ thức = cortisol tăng = khó ngủ.

✅ SỚM — đặt ngủ NGAY

Dụi mắt · nhìn xa "lơ đãng" · ngáp · chậm phản ứng đồ chơi · quay đầu khỏi kích thích

⚠️ MUỘN — đã quá rồi

Khóc cáu · cong người ra sau · cào mặt, dứt tóc · mắt đỏ hoe

Routine ngủ — 2 phiên bản: ĐÊM dài, NGÀY ngắn

Cùng 1 trình tự, cùng 1 giờ, cùng 1 không gian. Lặp lại 21 ngày → não bé hình thành phản xạ "đến lúc ngủ".

Routine đêm dài hơn để báo hiệu "đêm dài đến rồi"; routine ngày ngắn gọn để bé không quá hưng phấn rồi mới ngủ.

🌙 Routine ngủ ĐÊM (15–20 phút)

Đầy đủ, có nghi thức báo "đêm dài đến rồi"

1. Tắm/lau người ấm (tuỳ chọn)
2. Bú/ăn no (cách giờ ngủ 20–30p)
3. Massage nhẹ, mặc đồ ngủ + sleeping bag
4. Đọc sách/hát ru thì thầm
5. Tắt đèn 100%, bật tiếng ồn trắng
6. Ôm con 3 phút, không nói chuyện
7. Đặt giường khi còn lim dim — không đã ngủ

☀️ Routine ngủ NGÀY (5–10 phút)

Nhanh gọn, tránh kích thích bé thêm

1. Thay tã sạch
2. Mặc sleeping bag (hoặc quần nếu <4m)
3. Bật tiếng ồn trắng
4. Kéo rèm tối mức 8/10 (vẫn còn sáng nhẹ — bé phân biệt ngày)
5. Ôm 1–2 phút, không hát ru lâu
6. Đặt giường khi còn thức — không đã ngủ

"Buồn ngủ, chứ không phải đã ngủ." Nếu đặt xuống lúc đã ngủ trên tay, bé tỉnh giữa giấc sẽ hoảng — vì cảnh khác lúc ngủ.

🌿 HÀNH TRÌNH CỦA EURO — ROUTINE TỪ TUẦN ĐẦU

Euro nằm giường (sát giường mẹ, có chắn an toàn). Từ đêm thứ 3 sau sinh, tôi áp dụng routine đêm: tắm ấm → bú no → mặc sleeping bag → tắt đèn → ôm 3 phút → đặt giường khi lim dim. Euro mở mắt vài giây rồi nhắm lại ngủ. Ban ngày tôi rút gọn routine còn 5 phút — chỉ thay tã, kéo rèm, bật tiếng ồn trắng và đặt. Cùng 1 logic — chỉ khác độ "nghi thức" để Euro phân biệt được ngày-đêm. Không có khóc 1 tiếng, không có PUPD — chỉ có routine đúng từ ngày đầu.

Phần 5 — Võ hỗ trợ chuyển giấc

Giải pháp cho "Bé thức dậy đúng 30–45 phút".



Vì sao bé chỉ ngủ được 40 phút rồi tỉnh?

1 chu kỳ ngủ trẻ = 40–50 phút. Giữa các chu kỳ, bé thức nhẹ. Nếu không tự chuyển được, bé khóc → mẹ vào dỗ → bé phụ thuộc mẹ. Võ hỗ trợ chuyển giấc giúp bé học tự đi tiếp vào chu kỳ thứ 2.

Kỹ thuật vỗ Shush-Pat đúng cách (4 yếu tố)

Yếu tố	Cách làm đúng
Vị trí	Vỗ MÔNG (vùng tả), KHÔNG vỗ lưng (gần phổi). Lực nhẹ + đều — bằng gõ ngón tay xuống bàn.
Nhịp	60–80 nhịp/phút = nhịp tim mẹ khi nghỉ. Bé đã nghe nhịp này 9 tháng trong bụng → trấn an.
Tiếng "Shhh"	Sát tai bé (5–10cm). To bằng tiếng khóc ban đầu, giảm dần khi bé dịu . đều, không ngắt quãng.
Thời điểm	5–10 phút TRƯỚC khi bé thường tỉnh — không phải sau khi bé khóc. Ví dụ: bé ngủ 45p mới khóc → vỗ ở phút 35–40.

3 lỗi mẹ hay mắc

Lỗi	Hậu quả	Cách sửa
Vỗ quá sớm (bé đang ngủ sâu)	Đánh thức bé	Vỗ trước chu kỳ tỉnh 5–10p thôi
Dừng vỗ quá sớm (bé vừa dịu)	Bé tỉnh hẳn	Vỗ thêm 2–3p sau khi bé dịu
Vỗ quá mạnh	Bé khó chịu, cong lưng	Lực bằng gõ ngón tay xuống bàn


Khi bé khóc khẽ giữa giấc → **đợi 2–3 phút trước**. Nhiều khi bé tự chuyển được. Bé học "tự chuyển giấc" chỉ khi mẹ cho cơ hội.

🌱 HÀNH TRÌNH CỦA EURO — THÁNG THỨ 4

Euro mỗi giấc nạp chỉ ngủ 35 phút. Tôi đặt báo thức ở phút 30, vào phòng nhẹ nhàng, vỗ mông nhịp 70/phút + suyt. Euro nhăn mặt định khóc — tôi vỗ đều, suyt to hơn. **5 phút sau, Euro thở sâu — chuyển giấc thành công**. Sau 2 tuần lặp lại, Euro tự chuyển giấc không cần tôi vào — nạp kéo dài 1.5 giờ.

Phần 6 — 4 giai đoạn luyện ngủ theo tháng tuổi

Roadmap rõ: tháng nào, làm gì.



0–3 tháng — "Sống sót"

Mục tiêu: Mẹ và con cùng sống sót, xây nền tảng.

- Áp dụng 5S khi bé khóc.
- Bắt đầu EASY 2.5h — không cứng nhắc.
- **CHƯA** luyện tự ngủ — bé sơ sinh cần được ôm.
- Phòng tối ban đêm, sáng tự nhiên ban ngày → bé phân biệt ngày/đêm.

✅ **Đúng:** Bé bú 8–12 lần/ngày, tăng cân, đêm có 1 giấc 3–4h. ▶ **Đỏ cờ:** Bỏ bú, lờ đờ, sụt cân → đi khám.

3–6 tháng — "Bước ngoặt"

Mục tiêu: Bắt đầu luyện tự ngủ thật sự.

- Chuyển sang EASY 3–3.5 giờ.
- 4S: đặt cũi khi còn thức.
- Cai dần ti giả/quần (4–5m).
- **Có thể bỏ bú đêm** nếu bé tăng cân tốt.

✅ **Đúng:** Đêm liền 6–8h, nap ngày ≥45 phút. ▶ **Đỏ cờ:** Thức >5 lần/đêm sau 5m, khóc thét bất thường.

6–9 tháng — "Củng cố"

Mục tiêu: Cố định 2 nap ngày + đêm dài.

- PUPD nếu bé chưa tự ngủ tốt.
- Drop nap thứ 3 — còn 2 nap (sáng + chiều).
- Chuẩn bị ứng phó **sleep regression 8 tháng** (lo lắng xa cách).
- Bắt đầu lovey (gấu/khăn an toàn) để bé tự trấn an.

✅ **Đúng:** Đêm 10–11h, 2 nap 1–1.5h. ▶ **Đỏ cờ:** Ngáy to/ngưng thở khi ngủ — khám tai-mũi-họng.

9–12 tháng — "Cố định"

Mục tiêu: Nếp ngủ ổn định cho cả năm tiếp theo.

- Đêm 11–12 tiếng + 2 nap (sáng 30–45p, trưa 1.5–2h).
- Chuẩn bị drop xuống 1 nap (thường 14–18m).
- Routine trước ngủ cố định 100%.

✅ **Đúng:** Bé tự nằm xuống cũi, không khóc, ngủ trong 5–10p. ▶ **Đỏ cờ:** Đột nhiên thức nhiều — kiểm tra răng mọc, ốm.

Phần 7 — Đối thoại "Ông bà bảo"

Phần khác biệt nhất — không sách dịch nào có.

 Ông bà bảo
"Trẻ khóc là chuyện thường..."

 Được sĩ trả lời
"Mẹ ơi, con đang dạy bé tự dịu..."

Mẹ Việt không chỉ luyện ngủ cho con. Mẹ Việt **luyện ngủ giữa lời nói của cả nhà**. Đây là phần tôi viết riêng cho bạn.

"Để con khóc tội nghiệp, sau này con tự kỷ!"

Sự thật: Cry-it-out (để con khóc 1 mình hoàn toàn) — **tôi KHÔNG khuyến khích**. Phương pháp PUPD KHÔNG để con khóc 1 mình. Mẹ luôn ở bên, bế lên khi cần, đặt xuống để con học. Nghiên cứu 2012 (Pediatrics, ĐH Flinders Úc) theo dõi 326 trẻ — **không thấy** ảnh hưởng tâm lý sau 6 tuổi.

"Phải bế ru con mới ngủ ngon!"

Câu trả lời: "Mẹ ơi, con không bỏ ôm bé đâu — con vẫn ôm rất nhiều khi bé thức. Nhưng con muốn dạy bé **tự ngủ trong cũi** để khi tỉnh giữa đêm bé không hoảng."

"Con phải nặng đủ X kg mới luyện ngủ được!"

Sự thật: Cân nặng KHÔNG quyết định. **Tuổi (từ 4 tháng)** và sự sẵn sàng (đã có chu kỳ ngủ ổn định, bú ngày đủ) mới quyết định.

"Con tôi ngày xưa cũng vậy mà có sao đâu!"

Phản biện nhẹ: "Đúng mẹ, các con ngày xưa lớn lên đều tốt. Nhưng con muốn cả mẹ lẫn bé đỡ vất vả hơn. Mẹ ngày xưa thức cả đêm là vì **chưa biết cách thôi**, không phải vì cách ấy là duy nhất."

5 CÂU TRẢ LỜI THÔNG MINH CHO GIA ĐÌNH

"Ông bà bảo"	Trả lời
"Trẻ khóc là bình thường, kệ nó"	"Con không kệ ạ, con dạy bé tự dịu — khác nhau đấy."
"Sao không cho ti, ti là êm nhất"	"Bé bú no rồi mẹ, giờ là buồn ngủ thôi."
"Mẹ thấy quần chật quá tội nghiệp"	"Quần giúp bé thấy như trong bụng mẹ, bé ngủ ngon hơn ạ."
"Để đèn cho bé khỏi sợ"	"Bóng tối giúp bé tiết hormone ngủ ạ, mẹ yên tâm."
"Đặt cũi xa mẹ là thiệt thòi"	"Cũi sát giường mẹ thôi, bé vẫn nghe được hơi mẹ."

Không cần "thắng" trong cuộc tranh luận với gia đình. Chỉ cần **kiên định nhẹ nhàng** — và chứng minh bằng kết quả: con ngủ ngon, mẹ tỉnh táo, cả nhà êm.

Template #1 — Nhật ký giấc ngủ

In 7 bản — ghi 1 tuần — đọc pattern của con.

Ngày: ____ / ____ / ____ Tháng tuổi bé: _____

Ban ngày

Giờ thức	Giờ bú	Hoạt động	Giờ ngủ	Tg ngủ	Cách dỗ	Ghi chú

Ban đêm

Giờ ngủ đêm	Số lần tỉnh	Mỗi lần dỗ bao lâu	Cách dỗ	Giờ thức dậy sáng

Hướng dẫn đọc nhật ký sau 7 ngày

1. Tìm pattern giờ ngủ tự nhiên — bé hay ngủ vào giờ nào? → Cố định giờ đó.
2. Tìm cửa sổ thức trung bình của bé → so với bảng Trang 4.
3. Đếm số lần tỉnh đêm — có giảm dần không?
4. Phương pháp dỗ nào hiệu quả nhất với bé? Tăng cường nó.

MẸO NHANH

Sau 3 ngày ghi nhật ký, mẹ sẽ thấy 2 khung giờ bé luôn buồn ngủ — đó chính là 2 nap "tự nhiên" của bé. Cố định 2 khung giờ này, không cần ép.


Template #2 — Checklist + Flowchart

Tra cứu nhanh khi đang loay hoay.

✅ Checklist 10 bước trước khi đặt cũi

- ☐ Bé đã bú no (cách giờ ngủ ≥20 phút)
- ☐ Tã sạch
- ☐ Quấn/sleeping bag đúng kích cỡ
- ☐ Tiếng ồn trắng đang bật (50dB)
- ☐ Phòng tối (mức 8/10), 22–24°C
- ☐ Cũi an toàn (không gối/chăn/đồ chơi)
- ☐ Bé có dấu hiệu buồn ngủ (dụi mắt, ngáp)
- ☐ Mẹ đã ôm 3 phút, không lắc mạnh
- ☐ Mẹ bình tĩnh (bé cảm nhận được)
- ☐ Đặt xuống khi buồn ngủ — không phải đã ngủ

🔄 Flowchart: Bé khóc khi đặt cũi — phải làm gì?



🌈 Khóc thế nào là khóc gì?

Kiểu khóc	Có thể là	Hành động
Khóc đều, âm ầm	Đói	Cho bú
Khóc rời ngừng, lặp	Mệt/muốn ngủ	Đặt ngủ
Khóc thét, cong người	Đau (đầy hơi, tã ướt)	Kiểm tra ngay
Khóc rền rĩ	Cần ôm/khó chịu nhẹ	Vỗ trấn an

Template #3 — Lịch EASY mẫu + Wake Window

Áp dụng ngay không cần tính toán.

 **0–3 tháng (EASY 2.5h)**

7:00	Thức + Bú
7:30	Tummy time, dạo
8:15	Đặt ngủ (nap 1)
9:30	Thức + Bú
10:45	Đặt ngủ
12:00	Thức + Bú
...	Lặp lại
19:00	Routine đêm + bú
19:30	Đặt ngủ đêm

 **3–6 tháng (EASY 3h)**

7:00	Thức + Bú
8:30	Đặt nap 1
10:00	Thức + Bú + chơi
11:30	Đặt nap 2
13:00	Thức + Bú
14:30	Đặt nap 3
16:00	Thức + Bú
17:30	Nap 4 (ngắn)
19:00	Đặt ngủ đêm

 **6–9 tháng (4h — 2 nap)**

7:00	Thức + Bú/ăn dặm
9:30	Đặt nap 1 (1h)
10:30	Thức + Bú
12:30	Ăn trưa
13:00	Đặt nap 2 (1.5h)
14:30	Thức + Bú
17:30	Ăn tối
18:30	Routine đêm
19:00	Đặt ngủ đêm

 **9–12 tháng (2 nap)**

7:00	Thức + Bú/ăn sáng
9:30	Nap 1 (30–45p)
10:30	Thức + chơi/ăn
12:30	Ăn trưa
13:00	Nap 2 (1.5–2h)
15:00	Thức + bữa phụ
18:30	Ăn tối + routine
19:00	Đặt ngủ đêm

Bảng Wake Window (in dần tử lạnh)

Tháng tuổi	Tối thiểu	Tối đa
0–1 tháng	45 phút	60 phút
1–3 tháng	1 giờ	1.5 giờ
3–4 tháng	1.5 giờ	2 giờ
4–6 tháng	2 giờ	2.5 giờ
6–9 tháng	2.5 giờ	3.5 giờ
9–12 tháng	3 giờ	4 giờ

FAQ — 10 câu hỏi mẹ thường hỏi

Câu trả lời ngắn gọn cho những lo lắng phổ biến nhất.

1. Bé khóc bao lâu thì ngưng được?

PUPD: bé khóc **20–45 phút** đêm đầu, giảm 50% mỗi đêm. Sau 5–7 đêm, tự ngủ trong <10 phút. Nếu khóc thét quá 20 phút không dịu → bế lên dỗ lâu hơn rồi đặt lại.

2. Mẹ có ngủ chung phòng với bé không?

Có — khuyến nghị 6 tháng đầu (AAP). Cũi riêng sát giường mẹ. Sau 6m có thể tách phòng.

3. Đêm đầu khó khăn kéo dài bao lâu?

3–7 đêm "vất vả" rồi qua. Đêm 1–2 khóc 30–45p. Đêm 4–5 còn 5–10p. **Quan trọng: không bỏ giữa chừng.**

4. Đang luyện thì con ốm — phải làm sao?

Tạm dừng. Ưu tiên ôm ấp, dỗ dành. Khởi 3–5 ngày, quay lại đúng nơi đã dừng.

5. Sleep regression 4 tháng — phải làm gì?

Não bé chuyển sang chu kỳ ngủ kiểu người lớn — **bình thường**, kéo dài 2–6 tuần. Giữ EASY, không đổi cách dỗ. Sau regression nhiều bé ngủ ngon hơn trước.

6. Có nên cho ti giả không?

Có thể, đặc biệt 0–6m (giảm nguy cơ SIDS). Sau 6m cai dần. Tránh dùng như "cứu cánh tự động".

7. Đang ti mẹ có luyện được không?

Hoàn toàn được. Chỉ cần tách bú khỏi ngủ: bú khi thức, không bú khi lim dim. Bú trước routine ngủ ≥20 phút.

8. Bé nửa đêm tỉnh dậy đòi — phân biệt với "quen miệng" thế nào?

Đói thật: khóc đều, tìm ti, bú 5–10 phút mới ngủ lại. **Quen miệng:** khóc khẽ, bú vài hớp đã ngủ → cần cai. Sau 5m + tăng cân tốt → giảm dần cữ đêm.

9. Bố không hợp tác — xử lý sao?

Cho bố đọc Phần 1 + Phần 7. **Chia trách nhiệm:** bố đảm nhiệm 1 routine cố định (ví dụ tắm + đặt nệm 2). Bố tham gia → bố hiểu → bố ủng hộ.

10. Bao lâu mới thấy kết quả?

3 đêm: khóc ít rõ rệt. **7 đêm:** tự ngủ trong 5–10 phút. **14 đêm:** thói quen ổn định. **30 ngày:** nếp ngủ "mặc định" — không cần cố gắng nữa.

Lời nhắn từ chị

10 năm trước, tôi cũng ngồi đúng vị trí của bạn lúc này — ôm bé đầu lòng giữa đêm khuya, đọc từng dòng sách, hy vọng có lời giải cho những đêm dài.

Tôi muốn nói với bạn 3 điều:

1. Bạn không sai khi muốn con tự ngủ.

Đó không phải "lười nuôi con". Đó là dạy con một kỹ năng **suốt đời**.

2. Bạn không cô đơn.

Hàng ngàn mẹ Việt đã đi qua hành trình này. Một số mất 5 ngày, một số mất 3 tháng — **không ai sai**.

3. Bạn xứng đáng được ngủ.

Mẹ ngủ ngon = kiên nhẫn hơn = yêu con đúng cách hơn. Đây không phải sự ích kỷ.

3 hành động tiếp theo cho bạn

1. Tham gia cộng đồng "Nghiện bầu nghiện con"

Group Facebook nơi hàng ngàn mẹ Việt chia sẻ thật, hỏi đáp với tôi mỗi tuần. → Tìm group "Nghiện bầu nghiện con" trên Facebook.

2. Theo dõi hành trình của Euro

TikTok @Euro Mũi Tẹt · TikTok @Thiều Vân Anh — chia sẻ nuôi con khoa học hằng ngày.

3. Khám phá sản phẩm Dr.Maya hỗ trợ giấc ngủ con

Dầu Húng Chanh (giảm ho đêm) · Sáp ăm (giữ ấm bụng, ngực giúp bé ngủ sâu) · Dầu massage thư giãn · Tinh dầu khuếch tán phòng ngủ. → drmayastore.vn

*Nếu ebook này có ích cho bạn — hãy tag 1 người mẹ bạn nghĩ đang cần đến nó.
Mẹ nào cũng xứng đáng có một giấc ngủ trọn vẹn. *

Bản quyền © 2026 Dr.Maya · Dược sĩ Thiều Vân Anh
Ebook miễn phí — vui lòng chia sẻ trọn vẹn, không cắt ghép.

 contact@thieuvananh.vn ·  thieuvananh.vn