

T QUÀ TẶNG TỪ DR.MAYA * HASOBABY

Cẩm nang xử lý **sốt** tại nhà cho bé

9 dấu hiệu bắt buộc phải đưa bé đi viện ngay • 5 bước xử lý
đúng cách tại nhà • Liều thuốc hạ sốt theo cân nặng



Biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn

DR.MAYA * HASOBABY

Phiên bản 1.0 • 05/2026 • 12 trang

Lời ngỏ từ Dr.Maya

Mẹ ơi, không ai dạy mình cách đối mặt với đêm đầu tiên con sốt 39 độ.

Em biết – khi nhìn nhiệt kế nhảy lên con số đỏ, tim mình thất lại. Tay mình run lên. Đầu mình hỏi hàng trăm câu cùng lúc: *"Có nên gọi bác sĩ không? Cho con uống thuốc bây giờ có sớm quá không? Lau bằng nước lạnh có nguy hiểm không? Sao bà nội bảo cạo gió mà mình lại nghe trên mạng nói không nên?"*

Cuốn cẩm nang này, em viết cho mẹ – **mẹ của những đứa con mà đêm hôm nào cũng có thể bắt đầu sốt đột ngột**. Mẹ của những đứa con mà ranh giới giữa "sốt vặt bình thường" và "phải đi viện ngay" chỉ cách nhau vài độ.

*"Cẩm nang này không thay thế bác sĩ – nhưng nó giúp mẹ **bình tĩnh trong 30 phút vàng đầu tiên**: biết đo nhiệt độ thế nào cho đúng, biết khi nào cần xịt – lau – bù nước, biết khi nào phải xách con ra viện ngay không chần chừ."*

Tất cả nội dung trong cẩm nang được tổng hợp từ **hướng dẫn của Bộ Y Tế, WHO và American Academy of Pediatrics (AAP)**, được diễn giải lại bằng ngôn ngữ mẹ-bỉm dễ hiểu, kèm những lưu ý thực tế mà các Dược sĩ Dr.Maya đã tích lũy qua hàng ngàn ca tư vấn cho mẹ Việt.

Đọc kỹ **Chương 2 (9 dấu hiệu nguy hiểm)** trước – đó là chương quan trọng nhất. Sau đó là **5 bước xử lý tại nhà**. Phần còn lại mẹ có thể đọc khi rảnh, hoặc khi tình huống thật sự xảy ra.

Em chúc mẹ con mình luôn an lành.

– **Đội ngũ Dược sĩ Dr.Maya * Hasobaby**♥



Mục lục

Cẩm nang gồm 8 chương – đọc theo thứ tự hoặc nhảy thẳng đến chương cần khi tình huống xảy ra.

01

Hiểu đúng về sốt ở trẻ

Sốt là gì, bảng phân loại theo nhiệt độ, tại sao sốt là phản ứng tự nhiên

trang 4

02

9 dấu hiệu **PHẢI** đưa bé đi viện **NGAY** ⚠️

Chương quan trọng nhất – đọc kỹ và ghi nhớ

trang 5

03

5 bước xử lý sốt tại nhà đúng cách

Đo nhiệt độ → mặc thoáng → bù nước → lau ấm → dùng thuốc/xịt

trang 6

04

Paracetamol vs Ibuprofen – dùng thuốc khi nào

Bảng liều theo cân nặng, khoảng cách giữa 2 liều, tác dụng phụ

trang 7

05

7 lầm tưởng nguy hiểm khi con sốt

Cạo gió, chườm đá, đắp chăn dày... những việc mẹ **TUYỆT ĐỐI** không làm

trang 8

06

Mẹo dân gian **AN TOÀN** có thể áp dụng

Lau khăn ấm, phòng thoáng mát, cho uống thìa từng giọt

trang 9

07

Xịt Hasobaby – bạn đồng hành của mẹ

Làm mát 3 giây, hạ thân nhiệt nhẹ nhàng, an toàn cho bé 0 tháng

trang 10

08

FAQ – 8 câu mẹ hay hỏi nhất

Sốt mọc răng, sốt sau tiêm, tắm khi sốt, đo nhiệt độ bao lâu/lần

trang 11

01 Hiểu đúng về sốt ở trẻ

Trước khi xử lý, mẹ cần hiểu sốt thực ra là gì. Nhiều mẹ cứ thấy con ốm là cuống – nhưng **sốt KHÔNG phải bệnh**, sốt là *phản ứng* của cơ thể.

Sốt là gì?

Sốt là khi nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn mức bình thường ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ đo nách hoặc $\geq 38^{\circ}\text{C}$ đo hậu môn) do trung tâm điều nhiệt ở não bộ "chỉnh" mức nhiệt mục tiêu lên cao hơn. Đây là **cơ chế tự vệ thông minh** – virus và vi khuẩn hoạt động kém ở nhiệt độ cao, đồng thời hệ miễn dịch của bé hoạt động mạnh hơn khi sốt.

Điều quan trọng mẹ cần biết

Mục tiêu khi xử lý sốt **KHÔNG phải là hạ nhiệt độ về bình thường ngay lập tức** – mà là *giúp bé thoải mái hơn* để bú/ngủ/chơi được. Nhiệt độ cao bao nhiêu không quan trọng bằng việc bé có đang tỉnh táo và tương tác hay không.

Bảng phân loại sốt theo nhiệt độ

BÌNH THƯỜNG

$36.5 - 37.4^{\circ}\text{C}$

Đo ở nách. Hậu môn: $37 - 37.9^{\circ}\text{C}$. Không cần làm gì.

SỐT NHẸ

$37.5 - 38.4^{\circ}\text{C}$

Theo dõi, bù nước, mặc thoáng. Chưa cần thuốc.

SỐT VỪA

$38.5 - 39.4^{\circ}\text{C}$

Lau ấm + xịt Hasobaby. Cân nhắc dùng thuốc nếu bé khó chịu.

SỐT CAO

$\geq 39.5^{\circ}\text{C}$

Dùng thuốc hạ sốt + lau ấm + theo dõi sát. $> 40^{\circ}\text{C}$ → đi viện ngay.

Tại sao sốt KHÔNG hẳn là xấu?

Khi bé sốt, các tế bào miễn dịch (bạch cầu, kháng thể) **được kích hoạt mạnh gấp 2-3 lần**. Đây là lý do các chuyên gia nhi khoa luôn nói: "Đừng cố hạ sốt bằng mọi giá." Sốt giúp con học cách chiến đấu với mầm bệnh – thậm chí sốt sau tiêm vắc xin là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của con đang phản ứng đúng cách.

Mẹ ghi nhớ – đo nhiệt độ ở đâu chính xác nhất?

- **Nách** (phổ biến, dễ làm): kết quả thấp hơn nhiệt độ thật $\sim 0.5^{\circ}\text{C}$. Giữ nhiệt kế 3-5 phút.
- **Hậu môn** (chính xác nhất, dùng cho bé < 3 tháng): kết quả $\approx$ nhiệt độ thật. Giữ 1-2 phút.
- **Tai** (nhanh, tiện nhưng dễ sai): chỉ chính xác từ 6 tháng trở lên, kéo tai ra sau khi đo.
- **Trán** (hồng ngoại): tiện nhất nhưng dao động $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ tùy độ ẩm da và môi trường.

02 9 DẤU HIỆU phải đưa bé đi viện NGAY



NẾU BÉ CÓ 1 TRONG 9 DẤU HIỆU NÀY

KHÔNG chờ, KHÔNG tự xử lý ở nhà, KHÔNG hỏi google nữa — đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức

- 1 Bé dưới 3 tháng tuổi sốt $\geq 38^{\circ}\text{C}$** — dù chỉ là sốt nhẹ.
Sơ sinh có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, có thể là dấu hiệu nhiễm trùng máu, viêm màng não.
- 2 Sốt $> 39.5^{\circ}\text{C}$ không hạ** dù đã xử lý đúng cách (xịt + lau ấm + thuốc hạ sốt) sau 1-2 giờ.
Có thể là dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng cần điều trị y tế.
- 3 Sốt kéo dài > 72 giờ (3 ngày)** liên tục, dù đỉnh nhiệt không quá cao.
Cần loại trừ sốt xuất huyết, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng đường tiểu.
- 4 Co giật, run rẩy bất thường** — cơ tay/chân/mắt giật, cứng người, sùi bọt mép, mất ý thức.
Co giật do sốt cao xảy ra ở 2-5% trẻ, nhất là 6 tháng – 5 tuổi. Phải khám để loại trừ động kinh, viêm màng não.
- 5 Lừ đừ, khó đánh thức, không phản ứng** với tiếng gọi hoặc kích thích.
Đây là dấu hiệu não bị ảnh hưởng — nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệt độ cao đơn thuần.
- 6 Khóc thét bất thường, không dỗ được** — tiếng khóc rít cao, the thé, khác hẳn ngày thường, kéo dài > 2 giờ.
Có thể là dấu hiệu đau dữ dội: viêm tai, viêm màng não, lồng ruột.
- 7 Nôn liên tục, không uống nước được** (> 3 lần trong 1 giờ) kèm dấu hiệu mất nước: môi khô, mắt trũng, ít đi tiểu, không có nước mắt khi khóc.
Mất nước ở trẻ nhỏ diễn tiến rất nhanh, cần truyền dịch tại viện.
- 8 Phát ban tím, chấm xuất huyết, da nổi vân tím** (dùng ly thủy tinh ấn lên ban — không mờ đi).
Nghi ngờ nhiễm trùng huyết não mô cầu — đây là cấp cứu sống còn, mỗi phút đều quý giá.
- 9 Khó thở, thở nhanh, môi tím, rút lõm lồng ngực** — bé thở > 60 lần/phút (sơ sinh) hoặc > 40 lần/phút (1-3 tuổi).
Có thể là viêm phổi nặng, viêm tiểu phế quản, hoặc sốc — cần thở oxy.

Cấp cứu 24/7 — Số khẩn cấp quốc gia



115

Hà Nội: **BV Nhi TƯ** 024-6273-8532 • HCM: **BV Nhi Đồng 1** 028-3927-1119

03 5 BƯỚC xử lý sốt tại nhà đúng cách

Khi đã loại trừ 9 dấu hiệu nguy hiểm ở Chương 2, mẹ áp dụng quy trình 5 bước dưới đây. Thứ tự rất quan trọng – đừng vội đi thẳng tới bước thuốc hạ sốt.

1

Đo nhiệt độ – chuẩn xác trước khi quyết định

Dùng nhiệt kế điện tử đo nách (cho bé > 3 tháng) hoặc hậu môn (cho bé < 3 tháng). **Cộng 0.5°C nếu đo ở nách** để ra nhiệt độ thật. Ghi lại nhiệt độ và giờ đo – quan trọng khi gặp bác sĩ. Đo lại sau mỗi 30 phút – 1 giờ để theo dõi xu hướng.

2

Mặc thoáng + phòng mát 26 – 28°C

Cởi bớt lớp áo dày, chỉ để bé mặc 1 lớp cotton mỏng. **Tắt điều hòa quá lạnh** (dưới 25°C bé dễ run, làm tăng thân nhiệt). Mở cửa sổ cho thông gió. Nếu mùa hè, bật quạt nhẹ hướng vào tường (KHÔNG quạt thẳng vào người bé).

3

Bù nước + sữa – liên tục, từng ngụm nhỏ

Cho bé bú mẹ thường xuyên hơn 30% so với bình thường. Bé > 6 tháng: cho uống thêm nước ấm, oresol pha đúng tỉ lệ, nước ép trái cây loãng. Mỗi lần 2-3 thìa, cách 10-15 phút. **Tuyệt đối không ép uống quá nhiều một lần** – dễ nôn.

4

Lau khăn ấm 36 – 37°C ở nách, bẹn, trán, gáy

Núng khăn xô vào nước ấm **cùng nhiệt độ với thân bé hoặc ấm hơn 1°C**, vắt ráo, lau nhẹ ở nách, bẹn, trán, gáy. Lặp lại 5-10 phút. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng nước đá, nước lạnh, hoặc cồn** – gây co mạch, run rẩy, làm tăng nhiệt độ ngược.

5

Dùng thuốc hạ sốt + xịt Hasobaby hỗ trợ

Nếu nhiệt độ $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ và bé khó chịu, cho uống Paracetamol theo cân nặng (xem bảng liều ở Chương 4). Song song, **xịt Hasobaby vào lòng bàn chân, gáy, sau tai** để hỗ trợ làm mát nhẹ nhàng. Sau 30-45 phút đo lại – nếu nhiệt độ vẫn không hạ, đi viện.

⚠ Cảnh báo – KHÔNG dùng 1 mình mẹo dân gian

Nhiều mẹ chỉ áp dụng lau ấm + cho uống nước rồi đợi – nếu sốt > 39°C kéo dài > 30 phút không hạ, **phải dùng thuốc hạ sốt**. Đừng để cơ thể bé tự "đấu" với cơn sốt cao quá lâu.

04 Paracetamol vs Ibuprofen – dùng khi nào

Hai loại thuốc hạ sốt phổ biến nhất ở Việt Nam là **Paracetamol** (Hapacol, Tylenol, Efferalgan) và **Ibuprofen** (Brufen, Sotstop). Cả hai đều an toàn nếu dùng đúng liều – nhưng có khác biệt quan trọng.

Tiêu chí	Paracetamol (Hapacol)	Ibuprofen (Brufen)
Độ tuổi tối thiểu	Từ sơ sinh (theo chỉ định bác sĩ với bé < 3 tháng)	Từ 6 tháng trở lên. KHÔNG dùng cho bé < 6 tháng.
Liều mỗi lần	10 – 15 mg/kg cân nặng	5 – 10 mg/kg cân nặng
Cách 2 liều	4 – 6 giờ	6 – 8 giờ
Tối đa / 24h	4 lần. KHÔNG quá 60 mg/kg/ngày.	3-4 lần. KHÔNG quá 40 mg/kg/ngày.
Bắt đầu có tác dụng	30 – 60 phút	30 – 60 phút (hạ sốt mạnh hơn, kéo dài hơn)
Khi nào chọn	Lựa chọn đầu tiên cho mọi tình huống, đặc biệt bé < 6 tháng.	Khi Paracetamol không hạ đủ, hoặc bé có viêm/đau kèm theo.
Lưu ý kiêng kỵ	Bé suy gan, suy thận nặng – tham vấn bác sĩ.	Bé bị sốt xuất huyết, mất nước, dạ dày yếu – KHÔNG dùng.

Bảng liều Paracetamol theo cân nặng

Cân nặng	Liều mỗi lần	Gói/viên Hapacol phù hợp
4 – 7 kg	60 – 100 mg	Hapacol 80mg – 1 gói
8 – 12 kg	100 – 180 mg	Hapacol 150mg – 1 gói
13 – 17 kg	150 – 250 mg	Hapacol 250mg – 1 gói
18 – 25 kg	200 – 375 mg	Hapacol 250mg – 1 – 1.5 gói

 **4 nguyên tắc VÀNG khi dùng thuốc hạ sốt**

- KHÔNG dùng Aspirin** cho bé < 12 tuổi – nguy cơ hội chứng Reye (tổn thương não, gan, có thể tử vong).
- KHÔNG kết hợp** Paracetamol + Ibuprofen cùng lúc nếu không có chỉ định bác sĩ.
- KHÔNG tự ý tăng liều** khi thấy thuốc chưa hạ sốt – đợi đủ 4-6 giờ trước khi dùng liều tiếp.
- KHÔNG dùng thuốc quá 3 ngày liên tục** – phải đưa bé đi khám để tìm nguyên nhân.

05 7 lầm tưởng NGUY HIỂM khi con sốt

Đây là 7 sai lầm phổ biến mẹ Việt thường mắc – phần lớn do nghe truyền miệng từ bà/cô/hàng xóm. Mỗi sai lầm đều có cơ sở khoa học giải thích vì sao **không nên**.

✗ Cạo gió cho bé khi sốt

✓ Da bé mỏng manh, cạo gió gây xước, bầm tím, đau đớn – không có bằng chứng khoa học giúp hạ sốt. Có thể gây nhiễm trùng da nếu dụng cụ không sạch.

✗ Chườm đá lạnh, lau cồn để hạ nhanh

✓ Nước đá và cồn gây *co mạch ngoại biên*, làm bé run rẩy, nhiệt độ lõi cơ thể **TĂNG** ngược. Cồn còn có thể hấp thu qua da gây ngộ độc. Chỉ dùng khăn ẩm 36–37°C.

✗ Đắp chăn dày, ủ kín cho bé "đổ mồ hôi"

✓ Cơ thể không thoát nhiệt được, nhiệt độ tăng nhanh, dễ co giật. Đắp chăn dày khi sốt = **cực kỳ nguy hiểm**. Mặc 1 lớp cotton mỏng là đủ.

✗ Cho bé uống Aspirin để hạ sốt nhanh

✓ Aspirin gây **hội chứng Reye** (tổn thương gan, não, có thể tử vong) ở trẻ < 12 tuổi, đặc biệt khi sốt do virus (cúm, thủy đậu). **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** dùng. Chỉ Paracetamol/Ibuprofen.

✗ Xông hơi tinh dầu cho bé sơ sinh để "thoát mồ hôi"

✓ Đường hô hấp bé sơ sinh nhỏ và nhạy cảm – xông hơi nóng gây bỏng đường thở, kích ứng, co thắt phế quản. Chỉ áp dụng cho người lớn.

✗ Cho ăn dồn để bé "có sức chống sốt"

✓ Khi sốt, dạ dày tiêu hoá kém – ép ăn dễ nôn ói, mất nước thêm. Cho bú/ăn theo nhu cầu, ưu tiên đồ lỏng dễ tiêu (cháo, sữa, súp).

✗ Cho nhịn nước vì sợ "đái dầm" hoặc nôn

✓ Mất nước là nguy cơ lớn nhất khi sốt. Phải **bù nước liên tục từng ngụm nhỏ** mỗi 10–15 phút. Bé tiểu ít hơn 4 lần/24h = dấu hiệu mất nước cần đi viện.

06 Mẹo dân gian AN TOÀN có thể áp dụng

Không phải mọi mẹo dân gian đều xấu – nhiều mẹo nếu dùng đúng cách thực sự giúp bé thoải mái hơn. Dưới đây là **6 mẹo Dr.Maya khuyến nghị**, đã có cơ sở khoa học hoặc đã qua kinh nghiệm thực tế hàng ngàn mẹ.



Lau khăn ấm 36 – 37°C ở 4 vị trí

Nách, bẹn, trán, gáy – 4 nơi có mạch máu nông sát da. Lau 5-10 phút, vắt khăn ráo, lặp lại 2-3 lần/giờ khi bé còn sốt.



Phòng thoáng mát 26 – 28°C

Bật điều hoà ở 26-28°C hoặc mở cửa sổ thông gió. Tránh phòng kín bí – bé thoát nhiệt khó hơn.



Mặc 1 lớp cotton mỏng

Cotton thấm hút mồ hôi, mềm mịn không kích ứng. Tránh chất liệu dày, polyester, len trong lúc sốt.



Cho uống thìa từng giọt

Bé biếng uống nước khi sốt – dùng thìa cà phê cho từng giọt, mỗi 5-10 phút. Có thể trộn với sữa, nước ép loãng.



Tinh dầu tràm gió thoa nhẹ (1+ tháng)

Tinh dầu tràm gió (cineol) đã được nghiên cứu giúp hạ nhiệt nhẹ và kháng khuẩn. Thoa loãng ở lòng bàn chân, gáy. KHÔNG bôi nguyên chất.



Da kề da với mẹ

Tiếp xúc da-kề-da giúp bé bình tĩnh, ổn định nhịp tim, ngủ ngon hơn. Hiệu quả đặc biệt với bé < 6 tháng đang sốt.



Cháo loãng + nước hầm rau củ cho bé > 6 tháng

Cháo trắng loãng nấu với nước hầm rau củ (cà rốt, su su) hoặc nước hầm gà nhạt – bổ sung nước + điện giải + năng lượng nhẹ, dễ tiêu khi bé biếng ăn.

✅ Lưu ý chung

Các mẹo này **hỗ trợ** – không thay thế thuốc hạ sốt khi nhiệt độ $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ và bé khó chịu. Mẹ kết hợp linh hoạt: mẹo dân gian + thuốc + xịt Hasobaby tùy mức độ sốt.

07 Xịt Hasobaby – bạn đồng hành của mẹ

Trong hành trình chăm con sốt, mẹ cần một **"trợ thủ làm mát nhanh"** để dùng song song với lau ấm và (khi cần) thuốc hạ sốt. Đó là lý do Dr.Maya phát triển **Xịt thảo dược Hasobaby 0+** – sản phẩm dành riêng cho bé Việt, an toàn từ 0 tháng tuổi.

✓ AN TOÀN TỪ 0 THÁNG

Xịt Hasobaby 0+

Không thuốc tây, không cồn, không paraben. Công thức 6 tinh chất thảo dược (tràm gió, bạc hà, húng chanh, hương nhu, đinh hương, lô hội) thẩm thấu qua da, hạ thân nhiệt nhẹ nhàng + làm mát tức thì. Sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO, Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép.

Làm mát 3 giây

Tinh chất bạc hà + tràm gió thẩm thấu cực nhanh qua da, cảm giác mát lan toả tức thì khi bé đang quấy do sốt.

Hạ nhiệt 2-3 phút

Cơ chế bay hơi sinh lý kết hợp giãn mạch ngoại biên giúp hỗ trợ hạ nhiệt độ da rõ rệt sau 2-3 phút xịt.

100% thảo dược

Không thuốc tây, không hoá chất tổng hợp, dùng được cho bé sơ sinh – an toàn cho mẹ yên tâm dùng dài hạn.

Không hấp thu vào máu

Chỉ tác động bề mặt da, không ảnh hưởng gan/thận như thuốc uống – phối hợp tốt với Paracetamol khi cần.

Cách dùng – 3 ĐIỂM VÀNG hạ sốt

1. Lòng bàn chân (2 bên) • 2. Gáy (sau cổ) • 3. Sau tai (2 bên)

Liều: 2-3 cú xịt mỗi điểm, lặp lại mỗi 4-6 giờ khi bé còn ấm/sốt. Mặc đồ thoáng sau xịt.

Mua hàng chính hãng tại

drmayastore.vn • xithasot.thieuvananh.vn

Mẹ ghi nhớ – Khi nào dùng Hasobaby?

Dùng **sớm** khi bé bắt đầu ấm (37 – 38°C) – giúp 60-80% bé hạ thân nhiệt trước khi cần thuốc. Khi sốt > 38.5°C: dùng **song song với thuốc hạ sốt** – bé hạ nhanh hơn, ngủ ngon hơn.

08 FAQ – 8 câu mẹ hay hỏi nhất

Q: Bé sốt sau tiêm phòng có nên cho uống thuốc hạ sốt ngay không?

A: **Không nên** uống dự phòng. Chỉ uống khi nhiệt độ $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ và bé khó chịu. Một số nghiên cứu cho thấy uống Paracetamol dự phòng *có thể giảm đáp ứng miễn dịch* của vắc xin. Mẹ ưu tiên xịt Hasobaby + lau ấm + bù nước trước.

Q: Sốt mọc răng kéo dài bao lâu? Có cần dùng thuốc không?

A: Sốt mọc răng thường **chỉ 1-2 ngày**, nhiệt độ $< 38.5^{\circ}\text{C}$. Nếu sốt $> 38.5^{\circ}\text{C}$ hoặc kéo dài $> 48\text{h}$ thì không phải do răng – phải tìm nguyên nhân khác (viêm họng, tai, đường tiểu). Mọc răng đơn thuần ít khi cần thuốc – xịt Hasobaby + cho nhai dụng cụ gặm răng lạnh là đủ.

Q: Có nên cho bé tắm khi đang sốt không?

A: **Có thể tắm** với nước ấm $36-37^{\circ}\text{C}$, thời gian ngắn 5-10 phút, trong phòng kín gió. Tắm thực ra giúp bé thoải mái và hạ nhiệt độ. **Tránh** nước lạnh, tắm lâu, tắm khi bé đang run/lử đừ.

Q: Bao lâu phải đo nhiệt độ một lần?

A: Khi bé bắt đầu sốt: đo **mỗi 30 phút – 1 giờ**. Khi đã ổn định (sốt nhẹ $< 38^{\circ}\text{C}$, bé bú/chơi bình thường): đo **mỗi 2-3 giờ**. Ban đêm đo trước khi đi ngủ và 1 lần giữa đêm nếu bé sốt cao.

Q: Bé sốt cao co giật rồi tỉnh lại – có cần đi viện không?

A: **CÓ, đi viện ngay** – kể cả khi bé đã tỉnh lại bình thường. Cần loại trừ động kinh, viêm màng não, rối loạn điện giải. Co giật lần đầu phải có bác sĩ khám trực tiếp. Mẹ ghi lại: thời gian giật, kiểu giật (toàn thân hay 1 bên), có sùi bọt mép không.

Q: Bé sốt nhưng tay chân lạnh – có nguy hiểm không?

A: Có thể là dấu hiệu sốt đang lên đỉnh – cơ thể co mạch ngoại biên để giữ máu cho cơ quan nội tạng. Mẹ **không xoa, không ủ ấm tay chân** mà mặc thoáng, lau ấm thân, bù nước. Nếu kèm môi tím, da nổi vân tím → đi viện ngay.

Q: Có thể cho uống Paracetamol và Ibuprofen xen kẽ không?

A: **Chỉ khi có chỉ định bác sĩ**. Không tự ý xen kẽ ở nhà vì dễ nhầm liều, dễ quá liều. Nếu Paracetamol không hiệu quả sau 4-6h, đưa bé đi khám để bác sĩ đánh giá nguyên nhân.

Q: Bé bị sốt xuất huyết – có cách nào nhận biết tại nhà?

A: Dấu hiệu nghi ngờ: sốt cao $> 39^{\circ}\text{C}$ kéo dài 2-3 ngày + đau cơ + đau hốc mắt + da nổi chấm xuất huyết / chảy máu chân răng / chảy máu cam. **Phải đi viện làm xét nghiệm máu** để xác định. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** dùng Ibuprofen, Aspirin trong sốt xuất huyết – chỉ dùng Paracetamol.

Liên hệ Dr.Maya

Mẹ thân mến,

Cảm ơn mẹ đã đọc đến trang cuối cùng. Cuốn cẩm nang này được team Dr.Maya x Hasobaby biên soạn với một mong muốn duy nhất: **giúp mẹ bình tĩnh hơn trong những đêm con sốt**.

Không có cuốn sách nào thay thế được trực giác của mẹ. Nhưng cuốn sách tốt sẽ giúp mẹ tin vào trực giác đó – biết khi nào ở nhà xử lý, biết khi nào phải xách con đi viện. Em hy vọng cuốn này làm được đúng điều đó.

Có bất cứ câu hỏi nào, mẹ cứ nhắn cho team Dr.Maya – đội ngũ Dược sĩ luôn ở đây để hỗ trợ mẹ 24/7.

– **Đội ngũ chuyên môn Dr.Maya x Hasobaby** ♥

Kết nối với Dr.Maya

 Hotline tư vấn – **0942 486 825**

 Cửa hàng chính hãng – **drmayastore.vn**

 Landing xịt Hasobaby – **xithasot.thieuvananh.vn**

 Fanpage Hasobaby – **fb.com/hasobaby.drmaya**

 Group "Nghiện bầu nghiện con" – **10.000+ mẹ bỉm**

⚠ Lưu ý quan trọng: Cẩm nang này mang tính chất tham khảo và giáo dục, không thay thế chỉ định, chẩn đoán hay điều trị của bác sĩ. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi bé có dấu hiệu bất thường, mẹ vui lòng liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. Liều thuốc trong cẩm nang là liều tham khảo tổng quát – liều thực tế cho bé cần được bác sĩ tư vấn dựa trên cân nặng, độ tuổi và tình trạng sức khỏe cụ thể.