



SUGESTÃO DE ROTEIRO DE FICHA DE AVALIAÇÃO E RESPOSTA À CRISE EM SAÚDE MENTAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome:

Data de nascimento: ____/____/____ Idade: ____

Gênero/raça/cor: (autodeclarado)

Estado civil:

Acompanhante / vínculo:

Solicitante do atendimento:

2. SUBJETIVO (palavras do usuário/acompanhante)

Motivo da consulta / queixa atual:

História do sofrimento / episódio atual:

Expectativas quanto ao atendimento (o que o usuário entende como problema):

Outros tratamentos já realizados (clínico, neurológico, CAPS etc.):

Internações prévias (local, ano, motivo):

Rede de apoio / núcleo microssocial:

Medicações em uso (nome, dose, prescritor):

3. AVALIAÇÃO (objetiva + clínica)

3.1. Estado mental e físico imediato

- Aparência, comportamento, orientação, humor, linguagem, pensamento.
- Sinais clínicos: febre, convulsões, intoxicação, trauma, risco médico associado.

3.2. Sintomatologia específica da crise

- ☐ Agitação psicomotora
- ☐ Delírios / alucinações
- ☐ Comportamento bizarro / desorganizado
- ☐ Ideação suicida (plano, meios, tentativa prévia) _____
- ☐ Violência contra outros
- ☐ Tristeza profunda / desesperança



- ☐ Isolamento social extremo
- ☐ Uso recente de álcool / drogas (qual, quantidade, contexto)
- ☐ Abstinência / fissura

3.3. Fatores de vulnerabilidade

- Risco clínico imediato (lesões, intoxicações, rebaixamento consciência).
- Situação de rua, violência doméstica, exploração.
- Criança / adolescente: situação escolar, cuidadores disponíveis, violência.
- Gestação / puerpério.

4. EIXOS ESPECÍFICOS

Eixo A – Psicose / sofrimento psíquico intenso

- Sintomas produtivos: delírios, alucinações, desorganização.
- Sintomas negativos: embotamento, retraimento, mutismo.
- Grau de autonomia / capacidade de autocuidado.
- Risco de agressividade (contra si ou outros).

Eixo B – Suicídio / Autolesão

- Ideação atual: sim / não.
- Plano estruturado: sim / não.
- Meios disponíveis: sim / não.
- Tentativa prévia: sim / não (quando, como).
- Fatores protetivos/ancoragem (vínculos, crenças, projetos, filhos).

Eixo C – Criança e adolescente

- Desenvolvimento / escolarização.
- Relação com cuidadores.
- Situações de violência (doméstica, *bullying*, exploração).
- Sintomas principais: retraimento, irritabilidade, fala sobre morte, automutilação.
- Uso de substâncias.



Eixo D – Álcool e outras drogas

- Substância principal / tempo de uso / última dose.
- Contexto de uso (sozinho, em grupo, associado à violência).
- Situação clínica de intoxicação ou abstinência.
- Tentativas prévias de tratamento (CAPS AD, comunidade, UBS).
- Risco social (moradia, trabalho, judicialização).

5. IMPRESSÃO / HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

- Psicótico / crise psicótica.
- Sofrimento psíquico grave e intenso com baixa autonomia.
- Violência autoprovocada (ideação / tentativa de suicídio).
- Transtorno por uso de substâncias.
- Transtorno mental comum (episódio depressivo / ansioso).
- CID sugerido: _____.

6. PLANO IMEDIATO

- Condutas clínicas de urgência (se necessárias).
- Estratégias para enfrentamento daquilo que foi entendido como problema pelo usuário.
- Encaminhamentos intersetoriais: UBS, UPA, CRAS, Conselho Tutelar, escola.
- Moradia, trabalho e renda.
- Contratualidade inicial: frequência de visitas, contatos com a rede, acompanhamento familiar / reunião com rede de apoio.
- Agenda:
- Profissional responsável: _____.