

### 3. Vorlesung: Satz der totalen Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit

Nikolas Tapia

22. April 2024, Stochastik für Informatik(er)


$$G \subseteq K^c$$

Eine Krankheit tritt bei 2% der Bevölkerung auf.  
Ein Bluttest erkennt sie in 99% der Fälle, aber er zeigt bei 3% der gesunden Personen falsch positiv an.

Positivität

$$P(P|K) = 0,99$$

$$P(N|K) = 1 - P(P|K) \\ = 0,01$$



da:  $P(-|K)$  ist ein  
W'keitsmaß

Eine Krankheit tritt bei 2% der Bevölkerung auf.  
Ein Bluttest erkennt sie in 99% der Fälle, aber er zeigt bei 3% der gesunden Personen falsch positiv an.

$$\text{W'keit } P(P \cap K)?$$

$$P(P \cap K) = P(P|K)P(K)$$

$$= 0,99 \times 0,02$$

$$= 0,0198 \quad (1,98\%)$$

$$P(P)? \quad P(K|P)?$$

↓  
Gesamt W'keit

## Formel der Gesamtwahrscheinlichkeit

## Aussage 3.0

Sei  $(\Omega, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum, und seien  $A, B \subseteq \Omega$  Ereignisse, mit  $0 < \mathbb{P}(B) < 1$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A|B^c)\mathbb{P}(B^c).$$


 $\Omega$ 

$$A = \underline{(A \cap B)} \cup \underline{(A \cap B^c)}$$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c)$$

$$= \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A|B^c)\mathbb{P}(B^c)$$

da  $\text{blue} \cap \text{red} = \emptyset$




## Additionsregel


## Aussage 3.1

In einem mehrstufigen Experiment berechnet sich die Wahrscheinlichkeit eines ~~Ergebnisses~~ durch **Addition** der zugehörigen Wahrscheinlichkeiten auf den Blättern des Baumes.

↙  
Ereignis



Eine Krankheit tritt bei 2% der Bevölkerung auf.  
Ein Bluttest erkennt sie in 99% der Fälle, aber er zeigt bei 3% der gesunden Personen falsch positiv an.



Additionsregel

$$P(P) = P(P|K)P(K) + P(P|G)P(G)$$


$$= 0.99 * 0.02 + 0.03 * 0.98 = 0.0492 \quad (4.92\%)$$

## Aussage 3.2

Sei  $(\Omega, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum, und sei  $A$  ein Ereignis. Sei  $B_1, \dots, B_n$  eine *disjunkte* Zerlegung von  $\Omega$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

Zerlegung:  $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$ ,  $B_i \cap B_j = \emptyset$   $i \neq j$




$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap B_1) + \dots + \mathbb{P}(A \cap B_n) \\ &= \text{analog...} \end{aligned}$$

## Aussage 3.2

Sei  $(\Omega, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum, und sei  $A$  ein Ereignis. Sei  $B_1, \dots, B_n$  eine *disjunkte* Zerlegung von  $\Omega$ . Dann gilt


$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i).$$



$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_2) &= \mathbb{P}(B_2|A_1)\mathbb{P}(A_1) \\ &\quad + \mathbb{P}(B_2|A_2)\mathbb{P}(A_2) \\ &\quad + \mathbb{P}(B_2|A_3)\mathbb{P}(A_3) \end{aligned}$$




## 2-mal Ziehung ohne Zurücklegen



$$B_i = \{i\text{-te K. ist blau}\}$$

$$R_i = \{i\text{-te K. ist rot}\}$$



## Definition 3.0

Sei  $(\Omega, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum, und seien  $A, B \subseteq \Omega$  Ereignisse.  $A$  und  $B$  heißen **unabhängig**, falls

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

gilt.

## Unabhängigkeit

2-mal ziehen ohne Zurücklegen.



$$P(B_2 \cap R_1) = P(B_2) P(R_1)?$$

$$P(R_1) = \frac{n}{n+m}$$

$$P(B_1) = \frac{m}{n+m}$$

$$P(B_2 \cap R_1) = P(B_2 | R_1) P(R_1)$$

$$\frac{m}{n+m-1} \times \frac{n}{n+m} = \frac{nm}{(n+m-1)(n+m)}$$

## Unabhängigkeit



$$\begin{aligned}
 P(B_2) &= P(B_2 | R_1) P(R_1) + P(B_2 | B_1) P(B_1) \\
 &= \frac{n}{n+m-1} \times \frac{n}{n+m} + \frac{m-1}{m+n-1} \times \frac{m}{n+m} \\
 &= \frac{nm + (m-1)m}{(n+m-1)(n+m)}
 \end{aligned}$$

$$P(B_2 \cap R_1) = \frac{nm}{(n+m)(m+m-1)} \neq P(B_2) P(R_1)$$

## Unabhängigkeit

2-fache Ziehung mit Zurücklegen.



$$P(B_1) = \frac{n}{n+m}$$

$$P(R_1) = \frac{m}{n+m}$$

$$P(B_2 | R_1) = \frac{n}{n+m} = P(B_2) P(R_1)$$

$$P(B_2 \cap R_1) = P(B_2 | R_1) P(R_1) = \frac{n}{(n+m)} \times \frac{m}{(n+m)}$$

## Aussage 3.3


Seien  $A, B$  Ereignisse in einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{P})$  mit  $\mathbb{P}(B) > 0$ .  
Dann sind  $A$  und  $B$  genau dann unabhängig, wenn

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Bew:  $A, B$  mit  $\mathbb{P}(B) > 0$ ,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Übung:  $\boxed{\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)}$   $= \mathbb{P}(A) \quad \square$   
 $\mathbb{P}(A) > 0.$



$$P(y) = P(y|A=0, B=0)P(A=0, B=0) = P(y|A=0, B=0)P(A=0)P(B=0).$$

f P(

## Definition 3.1

Seien  $A_1, \dots, A_n$  Ereignisse auf  $(\Omega, \mathbb{P})$ . Die Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$  heißen **unabhängig**, falls für alle  $2 \leq k \leq n$  und Indizes  $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ ,  $i_l \neq i_j$  für  $l \neq j$ , gilt:

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

## Anmerkung 1

Die Ereignisse  $A, B, C$  sind genau unabhängig, wenn **alle** folgenden Gleichungen gelten:

$$\stackrel{k=2}{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)}$$

und

$$A \cap B \cap C = A \cap B \cap C$$

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Es gibt Beispiele für paarweise unabhängige, aber nicht unabhängige Ereignisse. Ebenso gibt es Beispiele, in denen  $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$  gilt, aber  $A, B, C$  nicht unabhängig sind.