



Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel fra kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 18-683

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler forordningen 1107/2009.

Deklaration:

Glyphosat: 480 g pr. liter (35,7% w/w)
Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Opbevares frostfrit

Batchnummer og produktionsdato er trykt på emballagen.
Holdbarhed af produktet er mindst 2 år fra produktionsdato.

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13,
DK-2300 København S, Danmark

®= is a registered trademark of the Bayer Group

UN 3082



Fabrikationsnr./ Produktionsdag:



UFI: WYU1-T0P0-D002-AADX

Virkningsmekanisme

GRUPPE 9 HERBICID

FØRSTEHJÆLPS- FORANSTALTNINGER

Øjenkontakt

Skyl omgående med store mængder vand.

Kontaktlinser fjernes,
hvis det kan gøres nemt.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker.
Vask angrebet hud med store mængder vand.

Vask tøj før genbrug.

Indånding

Anbring i frisk luft.

Indtagelse

Opkastning må ikke fremtvinges.
Kontakt omgående læge og vis denne
beholder eller etiket.

Råd til læger

Behandles symptomatisk.
Undersøg for pulmonal dysfunktion.
Mål blodtrykket.
Ingen diagnostiske symptomer på
systemisk forgiftning med dette produkt.
Hold patienten under observation,
indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil.

Antidot

Behandling med atropin og oximer er uegnet.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen.

I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Afgrøderne må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat til nedvisning i foderafgrøder før høst i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

I følgende konsumafgrøder: konsumærter, korsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved brug af weed wiper.

Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.

Omlægning af brak- og græssmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager.

Stødbehandling af fældede træer og buske.

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Frugter og bær, fra et areal, der er behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr - dog ikke fjerkræ og får.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2.1 L produkt/ha.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2.1 L produkt/ha op til og inklusiv 4.1 L produkt/ha.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 4.1 L produkt/ha (Spø3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi-passerende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DK, 2310, F - 3034 2431A

INDHOLD: **15 L**

printzone 2D code

Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.




BRUGSANVISNING

168,0 mm

BRUGSANVISNING ROUNDUP FLEX XXL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

ROUNDUP FLEX XXL kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning for fremspiring.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske samt ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer og juletræsplantager. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker.

Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspring og før høst i foderafgrøder.

ROUNDUP FLEX XXL er et ikke-selektivt, systemisk ukrudtsmiddel der optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten.

Produktet virker ved at blokere dannelsen af de aromatiske aminosyrer i planten.

Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP-hæmmer).

Behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** skal foretages på tørre planter. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst. Temperaturer over 15 grader, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat.

ROUNDUP FLEX XXL bindes umiddelbart til jorden og inaktiveres derfor ved kontakt med denne.

Nedbrydning af **ROUNDUP FLEX XXL** sker hovedsageligt mikrobielt.

Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletringer, og dermed mulighed for overførsel af **ROUNDUP FLEX XXL** fra et behandlet træ til nabotræet.

Ved behandling af rodsrud kan modertræet skades.

Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles.

Bemærk: Under nedbrydning af større mængde plantemateriale, f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.

Jordbearbejdning: Efter behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** kan jordbearbejdningen først begynde, når ukrudtet er påvirket af glyphosat, dog tidligst efter ti dage (syv dage ved behandling om foråret). Direkte såning kan ske en dag efter behandling mod etårigt ukrudt, to dage efter behandling mod kvik og fem dage efter behandling mod flerårigt tokimbladet ukrudt. Ved lave temperaturer i længere tid kan jordbearbejdning først ske efter fem dage.

ROUNDUP FLEX XXL er regnfast efter 4 timer når behandlingen er udført under optimale forhold.

Information om evt. resistensdannelse i forbindelse med brugen af ROUNDUP FLEX XXL

Ved ensidig anvendelse gennem en årrække af samme ukrudtsmiddel er der risiko for udvikling af resistens hos visse ukrudsplanter. For at forhindre eller forsinke en mulig udvikling i forbindelse med brugen af **ROUNDUP FLEX XXL** eller andre glyphosatprodukter, bør følgende retningslinier følges:

- * Undgå ensidig gentagen brug af **ROUNDUP FLEX XXL** eller andre glyphosatprodukter.
- * Etabler et sædskifte, der sikrer brugen af andre midler med en anden virkemekanisme, og som kontrollerer de samme ukrudsplanter som **ROUNDUP FLEX XXL**.
- * Integrer mekanisk eller andre dyrkningsmæssige metoder i ukrudtsbekæmpelsesprogrammer, når det er praktisk muligt.
- * Undgå at ukrudtsfro fra evt. resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre høstmaskiner.

DK, 2310, B - 3034 **2432A**

121.0 mm

242.0 mm

121.0 mm

FRUGTTÆRER, SKOVBRUG OG BÆRBUSKE:**Frugttærer og bærbuske:**

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttærer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Bedst effekt opnås når ukrudtet er i aktiv vækst. Frugttærer og bærbuske skal være rodfæstede. De angivne doseringer er beregnet på sprøjtning af hele arealet. Når der kun behandles i rækken, bliver den anvendte mængde tilsvarende mindre. Behandlingen gentages, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. I rækken under afgrøderne bør der ikke behandles med **ROUNDUP FLEX XXL** fra sidst i juni. Fra sidst i juni når saftstrømmen vender, vil der være risiko for skader på træerne eller buskene, hvis bladene rammes. Anvend afskærmet sprøjtning eller rygsprøjtning. Pas på vinddrift. Behandlingsfrist 30 dage før høst.

Bemærk: Planter som danner udløbere (f.eks. jordbær) eller rodkud (f.eks. hindbær, blomster eller bærbuske) tilhører en særlig risikogruppe, fordi glyphosat kan transporteres fra udløberne eller rodkuddene til forældreplanterne. Med sådanne planter kan sprøjtning mellem rækkerne kun foretages, når udløbere eller rodkud imellem rækkerne er afskåret fra moderplanterne.

Ukrudtbekæmpelse i skovkulturer og juletræplantager:

Klargøring af areal inden såning, prikling eller plantning: Inden såning, prikling eller plantning behandles arealet med **ROUNDUP FLEX XXL**. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Mod tokimbladet flerårigt rodkud og kvik anvendes den højeste dosering.

Afskærmet sprøjtning: Behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** foretages afskærmet i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturtræet ikke rammes på blade, nåle eller bark. Pas på afdrift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rodkud og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturtræerne skal være rodfæstede.

Bemærk: Der kan være risiko for, at der i specielt løvtræer (asp og poppel) kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af **ROUNDUP FLEX XXL** fra et behandlet træ til nabotræet.

Frugttærer	Antal beh./sæson	Dage mellem beh.	Anbefalet dosering (l/ha)	Max dosering/vækstår (l/ha)
Kvik og andet ukrudt	1		2,25 - 4,50	4,50
Kvik og andet ukrudt	2	28	2,25 - 3,75	6,75
Kvik og andet ukrudt	3	28	2,25 - 3,00	7,50
Bærbuske og skovbrug	Antal beh./sæson	Dage mellem beh.	Anbefalet dosering (l/ha)	Max dosering/vækstår (l/ha)
Kvik og andet ukrudt	1		1,25 - 4,50	4,50
Kvik og andet ukrudt	2	28	1,25 - 4,50	7,50
Kvik og andet ukrudt	3	28	1,25 - 4,50	7,50

Juletræer over toppen:

I kulturer af rødgran, nordmannsgran og kæmpegran kan **ROUNDUP FLEX XXL** anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne er groet fast på blivende sted.

Dosering: 1,25 - 2,27 l/ha i 100 - 200 l vand/ha.

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

Stødbehandling af fældede træer og buske:

Nyfældede træer behandles straks efter fældning med **ROUNDUP FLEX XXL** som sikring mod genvækst og rodkud. **ROUNDUP FLEX XXL** påføres med pensel. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Ved temperaturer under -5°C kan der tilsættes antifrostvæske (kolervæske) for at lette udbringningen af blandingen.

Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af **ROUNDUP FLEX XXL** fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodkud.

Vejledende dosering:

Blanding ved temperatur over -5°C:

140 ml **ROUNDUP FLEX XXL** plus 860 ml vand.

Blanding ved temperatur under -5°C:

140 ml **ROUNDUP FLEX XXL** plus 200 ml antifrostvæske (kolervæske) plus 660 ml vand.

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

SPILD SAMT RESTER OG TOM EMBALLAGE:

Spild opsuges med savsmuld eller sand. Samles op i plastikbeholdere der afleveres til destruktion hos den kommunale affaldsordning for farligt affald. Store mængder afleveres til FORTUM (tidligere Kommune Kemi). Midlet må kun opbevares i originalemballagen. Midlet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

® = is a registered trademark of the Bayer Group

DK, 2310, B - 3034 2432A



Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.

BRUGSANVISNING ROUNDUP FLEX XXL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

ROUNDUP FLEX XXL kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttærer og bærbuske samt ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer og juletræplantager. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker.

Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspring og før høst i foderafgrøder.

ROUNDUP FLEX XXL er et ikke-selektivt, systemisk ukrudtsmiddel der optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Produktet virker ved at blokere dannelsen af de aromatiske aminosyrer i planten. Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP-hæmmer).

Behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** skal foretages på tørre planter. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst. Temperaturer over 15 grader, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat.

ROUNDUP FLEX XXL bindes umiddelbart til jorden og inaktiveres derfor ved kontakt med denne.

Nedbrydning af **ROUNDUP FLEX XXL** sker hovedsageligt mikrobielt.

Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af **ROUNDUP FLEX XXL** fra et behandlet træ til nabotræet.

Ved behandling af rodkud kan modertræet skades.

Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles.

Bemærk: Under nedbrydning af større mængde plantemateriale, f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.

Jordbearbejdning: Efter behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** kan jordbearbejdningen først begynde, når ukrudtet er påvirket af glyphosat, dog tidligst efter ti dage (syv dage ved behandling om foråret). Direkte såning kan ske en dag efter behandling mod etårigt ukrudt, to dage efter behandling mod kvik og fem dage efter behandling mod flerårigt tokimbladet ukrudt. Ved lave temperaturer i længere tid kan jordbearbejdning først ske efter fem dage.

ROUNDUP FLEX XXL er regnfast efter 4 timer når behandlingen er udført under optimale forhold.

Information om evt. resistensdannelse i forbindelse med brugen af ROUNDUP FLEX XXL
Ved ensidig anvendelse gennem en årrække af samme ukrudtsmiddel er der risiko for udvikling af resistens hos visse ukrudtsplanter. For at forhindre eller forsinke en mulig udvikling i forbindelse med brugen af **ROUNDUP FLEX XXL** eller andre glyphosatprodukter, bør følgende retningslinier følges:

- * Undgå ensidig gentagen brug af **ROUNDUP FLEX XXL** eller andre glyphosatprodukter.
- * Etabler et sædskitte, der sikrer brugen af andre midler med en anden virkemekanisme, og som kontrollerer de samme ukrudtsplanter som **ROUNDUP FLEX XXL**.
- * Integrer mekanisk eller andre dyrkningsmæssige metoder i ukrudtsbekæmpelsesprogrammer, når det er praktisk muligt.
- * Undgå at ukrudtsfro fra evt. resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre høstmaskiner.

168.0 mm

121.0 mm

242.0 mm

121.0 mm

SPRØJTETEKNIK:

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af **ROUNDUP FLEX XXL**. Derfor anbefales det at anvende Low-drift dyser som reducerer risikoen væsentligt for vinddrift.

VANDMÆNGDE: **ROUNDUP FLEX XXL** udsprøjtes i op til 200 l/ha. Ved dosering under 1,8 l/ha anbefales højst 150 l/ha. Med rygsprøjte, anbefalet vandmængde 250-500 l/ha.

Dysevalg: F. eks. Low-drift dyse, Hardi ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110.

Rengøring af sprøjte og udstyr efter afsluttet behandling.

Det er vigtigt, at hele sprøjten samt evt. traktoren rengøres grundigt umiddelbart efter afsluttet behandling enten i marken eller på vaskepladsen. Følg derfor nedenstående råd i forbindelse med denne rengøring:

- Umiddelbart efter afsluttet behandling skal tanken skylles grundigt med rent vand. Restsprøjtevæsken fortyndes minimum 50 gange. Skyllevandet sprøjtes ud på den netop behandlede mark. Ved udsprøjtning skal det sikres at den maksimalt tilladte dosering for **ROUNDUP FLEX XXL** ikke overskrides. Husk også at rengøre den udvendige side af sprøjten samt traktoren.
- Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner så alle slanger bliver rengjorte. Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skytning.
- Fyld rent vand i sprøjten (10-15 % af tankkapaciteten), og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. salmiakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Lad tankspuledysen arbejde i mindst 15 minutter. Skyllevandet kan udsprøjtes på den behandlede mark. Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Tøm tanken gennem bommen/dysen over afgrøde/mark, og skyl tanken/bommen med rent vand.
- Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten. Vaskevandet opsamlles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

PLETSPRØJTNING MOD FLERÅRIGT UKRUDT EFTER FREMSPIRING OG FØR HØST I FODERAFGRØDER:**Pletsprøjtning efter fremspring og før høst**

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs. Ved pletsprøjtning forstås behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** på mindre områder af marken. Kvik bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst.

Behandlingsfrist 10 dage.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Dosering

Kvikbestand med færre end 25 skud pr m²: 1,5 l/ha

Kvikbestand med mere end 25 skud pr m²: 2,25 l/ha

Flerårigt tokimbladet ukrudt (f.eks. tidse): 1,5 - 3,0 l/ha

SELEKTIV UKRUDTSBEKÆMPELSE I JORDBRUG VED HJÆLP AF SPECIELT UDSTYR:

Weed-Wiper kan anvendes i roer til bekæmpelse af ukrudt som er 20 cm højere end afgrøden. Der kan anvendes Weed-Wiper monteret på marksprøjte eller håndholdt Weed-Wiper.

Ukrudtsbekæmpelse med Weed-Wiper i sukkerroer og foderroer. En behandling pr. vækstår.

- 1 x 1,80-3,0 l/ha med 9-12 l vand/ha

STUBMARKER:

Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade kan der behandles med **ROUNDUP FLEX XXL**. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med **ROUNDUP FLEX XXL** bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen.

Dosering:

Genspiret korn og småt etårigt ukrudt : 1,1 - 1,5 l/ha

Kvik, et- og flerårigt ukrudt : 2,25 - 3,0 l/ha

Doseringen på 2,25 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede:

- * Høj luftfugtighed
- * Temperaturer over 15° C
- * Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

STUBMARKER EFTER FRØGRÆS:

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvik og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med **ROUNDUP FLEX XXL**. Behandlingen med **ROUNDUP FLEX XXL** bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling.

Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og græsserne.

Dosering: Et- og flerårigt ukrudt : 3,0 - 4,5 l/ha

Generelt anvendes 3,0 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser.

4,0 - 4,5 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

OMLÆGNING AF BRAK- OG GRÆSMARKER:

ROUNDUP FLEX XXL anvendes på afgrødegræs, flerårigt ukrudt og kvik i aktiv vækst. Kvikken skal være i aktiv vækst med 3-6 blade.

Pløj eller fræs 10 dage efter behandlingen og anlæg den nye græskultur. Storemængder rådnende planterester f.eks. tæt græstov med meget kvik i det øverste jordlag kan føre til vækstreduktion af det nytilsåede græs. I sådanne tilfælde bør tilsåningen vente så længe som muligt. Eventuelt nedvisnes græsset i efteråret og tilsås til foråret.

Dosering

Behandlede afgrøder må ikke anvendes til husdyrfoder.

Omlægning af brakmarker: 1,125-4,5 l/ha

Omlægning af græsmarker: 0,75-4,5 l/ha

UDYRKEDE AREALER:

ROUNDUP FLEX XXL kan anvendes på udyrkede arealer hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. På tæt og kraftigt ukrudtsbestand anvendes 4,5 l/ha.

Dosering på udyrkede ikke befæstede eller stærkt permeable arealer

- 1 behandling x 1,125-4,50 l/ha (max dosering for en beh. 4,50 l/ha)

- 2 behandling x 1,125-4,50 l/ha (max dosering for to beh. 7,50 l/ha)

- 3 behandling x 1,125-4,50 l/ha (max dosering for tre beh. 7,50 l/ha)

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

FØR SÅNING OG EFTER SÅNING FØR FREMSPIRING:

ROUNDUP FLEX XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. 2,25 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker, 3,0 liter på kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3 - 4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes.

Dosering: Kvik, et- og flerårigt ukrudt : 2,25 - 3,0 l/ha

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd : 0,75 - 1,1 l/ha

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

DIREKTE SÅNING:

Anvendes direkte såning i forbindelse med en behandling med **ROUNDUP FLEX XXL**, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtningen. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket.

Dosering: Nyfremspiret tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs og spildkorn : 1,1 l/ha

Kvik, et- og flerårigt ukrudt : 2,25 - 3,0 l/ha

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

PRODUKTANSVAR

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

168,0 mm