

## Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau.

### A. Lý thuyết.

#### I. Khái niệm về phép dời hình.

- **Định nghĩa:** Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Nếu phép dời hình  $F$  biến các điểm  $M, N$  lần lượt thành các điểm  $M'; N'$  thì

$$MN = M'N'.$$

- **Nhận xét:**

1) Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép dời hình.

2) Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình cũng là một phép dời hình.

- **Ví dụ 1.** Vì phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép dời hình nên thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}$  và phép đối xứng tâm  $O$  ta được một phép dời hình.

#### II. Tính chất

Phép dời hình:

1) Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm.

2) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.



3) Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó.

4) Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

- **Chú ý:**

a) Nếu một phép dời hình biến tam giác  $ABC$  thành tam giác  $A'B'C'$  thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác  $ABC$

tương ứng thành trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác  $A'B'C'$ .



b) Phép dời hình biến đa giác  $n$  cạnh thành đa giác  $n$  cạnh, biến đỉnh thành đỉnh, biến cạnh thành cạnh.

- **Ví dụ 2.** Cho đường tròn  $(C)$  có phương trình  $(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 49$ . Thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục qua đường thẳng  $d$  và phép quay tâm  $O$  góc quay  $90^\circ$  ta được đường tròn  $(C')$ .

Bán kính đường tròn  $(C')$  là:  $R' = R = 7$ .


### III. Khái niệm hai hình bằng nhau.

- **Định nghĩa.** Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

- **Ví dụ 3.**

a) Qua phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}$  biến tam giác  $ABC$  thành tam giác  $A'B'C'$ . Sau đó, ta thực hiện tiếp phép đối xứng trục qua đường thẳng  $d$  biến tam giác  $A'B'C'$  thành tam giác  $A''B''C''$ . Khi đó:  $\Delta ABC = \Delta A''B''C''$ .

b) Hình ảnh dưới đây cho ta hai hình bằng nhau:



## B. Bài tập tự luyện

**Bài 1.** Cho đường thẳng  $d: 3x + y + 3 = 0$ . Viết phương trình của đường thẳng  $d'$  là ảnh của  $d$  qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm  $I(1; 2)$  và phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}(-2; 1)$ .

**Lời giải:**

Gọi  $F$  là phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm  $I$  và phép tịnh tiến theo  $\vec{v}(-2; 1)$ .

Gọi  $d_1 = \mathcal{D}_I(d)$ ,  $d' = T_{\vec{v}}(d_1) \Rightarrow d' = F(d)$ .

Do  $d'$  song song hoặc trùng với  $d$  do đó phương trình của  $d'$  có dạng  $3x + y + c = 0$   
- Lấy  $M(0; -3) \in d$  ta có  $\mathcal{D}_I(M) = M'$ . Khi đó,  $I$  là trung điểm  $MM'$ .

Áp dụng biểu thức tọa độ trung điểm ta có tọa độ của  $M'$  là:

$$\begin{cases} x' = 2.1 - 0 = 2 \\ y' = 2.2 - (-3) = 7 \end{cases} \Rightarrow M'(2; 7).$$

- Tịnh tiến theo  $\vec{v}(-2; 1)$  biến  $M'$  thành  $M''$ . Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến ta được:  $M''(0; 8)$

Mà  $M''$  thuộc  $d'$  nên thay tọa độ  $M''$  vào  $d'$  ta được:

$$3.0 + 8 + c = 0 \text{ nên } c = -8.$$

Vậy phương trình đường thẳng  $d'$  là  $3x + y - 8 = 0$ .

**Bài 2.** Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  $M(2; 1)$ . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm  $O(0; 0)$  và phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}(2; 3)$  biến điểm  $M$  thành điểm nào?

**Lời giải:**

+ Gọi  $\mathcal{D}_O(M) = M'$ .

Suy ra,  $O$  là trung điểm của  $MM'$ .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_M + x_{M'} = 2x_O \\ y_M + y_{M'} = 2y_O \end{cases} \Leftrightarrow M'(-2; -1).$$

+ Thực hiện phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}(2; 3)$  biến  $M'$  thành  $M''$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M'M''} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M''} - x_{M'} = 2 \\ y_{M''} - y_{M'} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow M''(0; 2).$$

Vậy khi ta thực hiện liên tiếp phép đối xứng và phép tịnh tiến trên biến  $M$  thành  $M''(0; 2)$ .

**Bài 3.** Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn  $(C)$  có phương trình  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}(2; 3)$  biến  $(C)$  thành đường tròn nào?

**Lời giải :**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(1; -2)$  và bán kính  $R = \sqrt{1^2 + (-2)^2 - 1} = 2$ .

+ Thực hiện phép đối xứng qua trục Oy biến tâm  $I$  thành tâm  $I'(-1; -2)$ ;  $R' = R = 2$ .

+ Thực hiện phép tịnh tiến theo vector  $\vec{v}(2; 3)$  biến  $I'$  thành  $I''$

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến ta được  $I''(1; 1)$  và  $R'' = R' = 2$ .

Vậy đường tròn cần tìm có tâm  $I''(1; 1)$  và bán kính  $R'' = 2$ .

Phương trình  $(C'')$ :  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ .