


Ôn tập chương 3

A. Lý thuyết

1. Giá trị lượng giác của một góc

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O, bán kính $R = 1$ nằm phía trên trục hoành được gọi là nửa đường tròn đơn vị.

Cho trước một góc α , $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$. Khi đó, có duy nhất điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị để $\angle xOM = \alpha$.



- Định nghĩa tỉ số lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Với mỗi góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$), gọi $M(x_0; y_0)$ là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\angle xOM = \alpha$. Khi đó:

+ sin của góc α là tung độ y_0 của điểm M, được kí hiệu là $\sin \alpha$;

+ cosin của góc α là hoành độ x_0 của điểm M, được kí hiệu là $\cos \alpha$;

+ Khi $\alpha \neq 90^\circ$ (hay $x_0 \neq 0$), tang của α là $\frac{y_0}{x_0}$, được kí hiệu là $\tan \alpha$;

+ Khi $\alpha \neq 0^\circ$ và $\alpha \neq 180^\circ$ (hay $y_0 \neq 0$), cotang của α là $\frac{x_0}{y_0}$, được kí hiệu là $\cot \alpha$.

- Từ định nghĩa trên ta có:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} (\alpha \neq 90^\circ); \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (\alpha \neq 0^\circ \text{ và } \alpha \neq 180^\circ);$$


$$\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} (\alpha \notin \{0^\circ; 90^\circ; 180^\circ\})$$

- Bảng giá trị lượng giác (GTLG) của một số góc đặc biệt:

α GTLG	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	\parallel	0
$\cot \alpha$	\parallel	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	\parallel

Chú ý: Kí hiệu \parallel chỉ giá trị lượng giác tương ứng không xác định.

Ví dụ: Tìm các giá trị lượng giác của góc 120° .



Gọi M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $xOM = 120^\circ$. Gọi N, K tương ứng là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy.

Do $xOM = 120^\circ$ và $xOK = 90^\circ$ nên $KOM = 30^\circ$ và $MON = 60^\circ$.

Từ bảng GTLG của một số góc đặc biệt:

Ta có: $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ và $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Các tam giác MOK và MON là các tam giác vuông với cạnh huyền bằng 1

Suy ra $ON = \cos MON \cdot OM = \cos 60^\circ \cdot 1 = \frac{1}{2}$ và $OK = \cos MOK \cdot OM = \cos 30^\circ \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Mặt khác, do điểm M nằm bên trái trục tung nên $M\left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Theo định nghĩa giá trị lượng giác ta có:

$$\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \frac{\sin 120^\circ}{\cos 120^\circ} = -\sqrt{3}$$

$$\cot 120^\circ = \frac{\cos 120^\circ}{\sin 120^\circ} = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Vậy } \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}; \tan 120^\circ = -\sqrt{3}; \cot 120^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

- Ta có thể dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng của các giá trị lượng giác của một góc.

Ví dụ:

Tính	Bấm phím	Kết quả
$\sin 48^\circ 50' 40''$		$\sin 48^\circ 50' 40'' \approx 0,7529256291$
$\cos 112^\circ 12' 45''$		$\cos 112^\circ 12' 45'' \approx -0,3780427715$
$\tan 15^\circ$		$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$




- Ta cũng có thể tìm được góc khi biết một giá trị lượng giác của góc đó.

Ví dụ:

Tìm x, biết	Bấm phím	Kết quả
$\sin x = 0,3456$		$x \approx 20^\circ 13' 7''$

Chú ý:

+ Khi tìm x biết $\sin x$, máy tính chỉ đưa ra giá trị $x \leq 90^\circ$.

+ Muốn tìm x khi biết $\cos x$, $\tan x$, ta cũng làm tương tự như trên, chỉ thay phím  tương ứng bởi phím , .

2. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau

Đối với hai góc bù nhau, α và $180^\circ - \alpha$, ta có:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha;$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha;$$

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha \quad (\alpha \neq 90^\circ);$$

$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha \quad (0^\circ < \alpha < 180^\circ).$$

Chú ý:

- Hai góc bù nhau có sin bằng nhau ; có cosin , tang, cotang đối nhau.

Ví dụ: Tính các giá trị lượng giác của góc 135° .

Hướng dẫn giải

Ta có $135^\circ + 45^\circ = 180^\circ$, vì vậy góc 135° và góc 45° là hai góc bù nhau:

Suy ra:

$$\sin 135^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\cot 135^\circ = -\cot 45^\circ = -1.$$

$$\text{Vậy } \sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \tan 135^\circ = -1; \cot 135^\circ = -1.$$

- Hai góc phụ nhau có sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.

Ví dụ:

Ta có $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$ nên góc 30° và góc 60° là hai góc phụ nhau.


Khi đó:

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

3. Định lí côsin

Đối với tam giác ABC, ta thường kí hiệu A, B, C là các góc của tam giác tại đỉnh tương ứng; a, b, c tương ứng là độ dài của các cạnh đối diện với đỉnh A, B, C; p là nửa chu vi; S là diện tích; R, r tương ứng là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.




Định lí Côsin. Trong tam giác ABC:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A.$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca.\cos B.$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab.\cos C.$$

Ví dụ: Cho tam giác ABC có góc A bằng 60° và $AB = 2$ cm, $AC = 3$ cm. Tính độ dài cạnh BC.



Hướng dẫn giải

Áp dụng Định lí côsin cho tam giác ABC, ta có:


$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7.$$

Suy ra $BC = \sqrt{7}$ (cm)

Vậy $BC = \sqrt{7}$ cm.

4. Định lí sin

Đối với tam giác ABC, ta thường kí hiệu A, B, C là các góc của tam giác tại đỉnh tương ứng; a, b, c tương ứng là độ dài của các cạnh đối diện với đỉnh A, B, C; p là nửa chu vi; S là diện tích; R, r tương ứng là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.




Định lí Côsin. Trong tam giác ABC:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A.$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B.$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

Ví dụ: Cho tam giác ABC có góc A bằng 60° và $AB = 2\text{ cm}$, $AC = 3\text{ cm}$. Tính độ dài cạnh BC.



Hướng dẫn giải

Áp dụng Định lí côsin cho tam giác ABC, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7.$$

Suy ra $BC = \sqrt{7}\text{ (cm)}$

Vậy $BC = \sqrt{7}\text{ cm}$.

5. Giải tam giác và ứng dụng thực tế

- Việc tính độ dài các cạnh và số đo các góc của một tam giác khi biết một số yếu tố của tam giác đó được gọi là giải tam giác.

Chú ý: Áp dụng định lí côsin, sin và sử dụng máy tính cầm tay, ta có thể tính (gần đúng) các cạnh và góc của một tam giác trong các trường hợp sau:

+ Biết hai cạnh và góc xen giữa.

+ Biết ba cạnh.

+ Biết một cạnh và hai góc kề.

Ví dụ: Giải tam giác ABC biết $b = 12$, $C = 60^\circ$, $A = 100^\circ$.

Hướng dẫn giải

Theo định lí tổng ba góc của tam giác, ta có: $A + B + C = 180^\circ$.

Suy ra $B = 180^\circ - (A + C) = 180^\circ - (100^\circ + 60^\circ) = 20^\circ$.

Áp dụng định lí sin, ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{\sin 100^\circ} = \frac{12}{\sin 20^\circ} = \frac{c}{\sin 60^\circ}$$


Suy ra:

$$a = \frac{12}{\sin 20^\circ} \cdot \sin 100^\circ \approx 34,6$$

$$c = \frac{12}{\sin 20^\circ} \cdot \sin 60^\circ \approx 30,4$$

Vậy tam giác ABC có: $A = 100^\circ$, $B = 20^\circ$, $C = 60^\circ$; $a \approx 34,6$; $b = 12$; $c \approx 30,4$.

Ví dụ: Để đo khoảng cách giữa hai đầu C và A của một hồ nước người ta không thể đi trực tiếp từ C đến A, người ta tiến hành như sau: Chọn 1 điểm B sao cho đo được khoảng cách BC, BA và góc BCA. Sau khi đo, ta nhận được $BC = 5\text{m}$, $BA = 12\text{m}$, $\angle BCA = 37^\circ$. Tính khoảng cách AC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí sin đối với tam giác ABC ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{\sin A} = \frac{12}{\sin 37^\circ}$$

$$\Rightarrow \sin A = \frac{5 \cdot \sin 37^\circ}{12} \approx 0,2508$$

$$\Rightarrow A \approx 14^\circ 31'$$

$$\Rightarrow B \approx 180^\circ - (37^\circ + 14^\circ 31') = 128^\circ 29'.$$

Áp dụng định lí sin, ta có: $\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}$

$$\Rightarrow AC = \frac{AB}{\sin C} \cdot \sin B = \frac{12}{\sin 37^\circ} \cdot \sin 128^\circ 29' \approx 15,61 \text{ (m)}$$

Vậy khoảng cách $AC \approx 15,61 \text{ m}$.

6. Công thức tính diện tích tam giác

Đối với tam giác ABC: A, B, C là các góc của tam giác tại đỉnh tương ứng; a, b, c tương ứng là độ dài của các cạnh đối diện với đỉnh A, B, C; p là nửa chu vi; S là diện tích; R, r tương ứng là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.

Ta có các công thức tính diện tích tam giác ABC sau:

$$+) S = pr = \frac{(a + b + c)r}{2}$$

$$+) S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C.$$

$$+) S = \frac{abc}{4R}$$

$$+) \text{ Công thức Heron: } S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Ví dụ:

a) Tính diện tích tam giác ABC biết các cạnh $b = 14$ cm, $c = 35$ cm và $A = 60^\circ$.

b) Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác ABC, biết các cạnh $a = 4$ cm, $b = 5$ cm, $c = 3$ cm.

Hướng dẫn giải

a) Áp dụng công thức tính diện tích tam giác ABC, ta có:

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 35 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 35 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{245\sqrt{3}}{2} \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích tam giác ABC là: $\frac{245\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$.

b) Ta có nửa chu vi của tam giác ABC là: $p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{4+5+3}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ (cm)}$.

Áp dụng công thức Heron, ta có diện tích tam giác ABC là:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{6 \cdot (6-4) \cdot (6-5) \cdot (6-3)} = \sqrt{36} = 6 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

$$\text{Mặt khác: } S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 3}{4 \cdot 6} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ (cm)}.$$

$$\text{Ta có: } S = pr \Rightarrow r = \frac{S}{p} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (cm)}.$$

Vậy diện tích tam giác ABC là 6 cm^2 , bán kính đường tròn ngoại tiếp là $2,5 \text{ cm}$; bán kính đường tròn nội tiếp là 1 cm .

B. Bài tập tự luyện

B1. Bài tập tự luận

Bài 1. Tính diện tích tam giác ABC biết $a = 12$ cm, $b = 15$ cm, $c = 23$ cm.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{12+15+23}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ (cm)}.$$

Áp dụng công thức Heron cho tam giác ABC ta có:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \sqrt{25.(25-12).(25-15).(25-23)} = \sqrt{6500} \approx 80,62 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích tam giác ABC là $80,62 \text{ cm}^2$.

Bài 2. Cho $A = \frac{3\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ và $\tan \alpha = \sqrt{2}$. Chứng minh $A = 7 - 4\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt{2} \Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{2} \cos \alpha$$

$$\text{Suy ra } A = \frac{3\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$$

$$= \frac{3\sqrt{2} \cos \alpha - \cos \alpha}{\sqrt{2} \cos \alpha + \cos \alpha}$$

$$= \frac{(3\sqrt{2} - 1) \cos \alpha}{(\sqrt{2} + 1) \cos \alpha}$$

$$= \frac{3\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{(3\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} = 7 - 4\sqrt{2}$$

$$\text{Vậy } A = 7 - 4\sqrt{2}.$$

Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$\text{a) } 3\sin 150^\circ + \tan 135^\circ + \cot 45^\circ$$

$$\text{b) } \cot 135^\circ - \tan 60^\circ \cdot \cos^2 30^\circ$$

Hướng dẫn giải

$$\text{a) } 3\sin 150^\circ + \tan 135^\circ + \cot 45^\circ$$

$$= 3.\sin(180^\circ - 30^\circ) + \tan(180^\circ - 45^\circ) + \cot 45^\circ$$

$$= 3.\sin 30^\circ - \tan 45^\circ + \cot 45^\circ$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{2} + (-1) + 1 = \frac{3}{2}.$$

$$\text{b) } \cot 135^\circ - \tan 60^\circ \cdot \cos^2 30^\circ$$

$$= \cot(180^\circ - 45^\circ) - \tan 60^\circ \cdot \cos^2 30^\circ$$

$$= -\cot 45^\circ - \tan 60^\circ \cdot \cos^2 30^\circ$$

$$= (-1) - \sqrt{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = -\frac{4 + 3\sqrt{3}}{4}.$$

Bài 4. Cho góc α , biết $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = 4\sin^2 \alpha + 3\cos^2 \alpha$.

Hướng dẫn giải

Ta có:


$$A = 4\sin^2 \alpha + 3\cos^2 \alpha = (3\sin^2 \alpha + 3\cos^2 \alpha) + \sin^2 \alpha = 3(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + \sin^2 \alpha$$

$$\text{Vì } \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \text{ và } \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Thay vào A ta có: } A = 3 \cdot 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{7}{2};$$

$$\text{Vậy } A = \frac{7}{2}.$$

Bài 5. Một hồ nước nằm ở góc tạo bởi hai con đường. Hãy tính khoảng cách từ B đến C, biết góc tạo bởi hai con đường là góc A bằng 120° và khoảng cách từ A đến B là 3 km, khoảng cách từ A đến C là 4 km.



Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ = 37.$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{37} \approx 6,08 \text{ (km)}.$$

Vậy khoảng cách từ B đến C khoảng 6,08 km.

Bài 6. Giải tam giác ABC biết $AB = 15$, $BC = 35$, $B = 60^\circ$. (Độ dài cạnh AC làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, số đo góc A và C làm tròn đến độ).

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC, ta có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos B$$

$$= 15^2 + 35^2 - 2 \cdot 15 \cdot 35 \cdot \cos 60^\circ = 925.$$

$$\text{Do đó } AC = \sqrt{925} \approx 30,4.$$

Mặt khác:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{15^2 + 925 - 35^2}{2 \cdot 15 \cdot \sqrt{925}} \approx -0,08.$$

$$\Rightarrow A \approx 95^\circ$$

$$\Rightarrow C = 180^\circ - (A + B) \approx 180^\circ - (95^\circ + 60^\circ) = 25^\circ$$

Vậy tam giác ABC có:

$$A \approx 95^\circ; B = 60^\circ; C \approx 25^\circ.$$

$$AB = 15, AC \approx 30,4; BC = 35.$$

B2. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1. Nếu $3\cos x + 2\sin x = 2$ và $\sin x < 0$ thì giá trị đúng của $\sin x$ là:

A. $-\frac{5}{13};$

B. $-\frac{7}{13};$

C. $-\frac{9}{13};$

D. $-\frac{12}{13}.$

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: $3\cos x + 2\sin x = 2$

$$\Leftrightarrow (3\cos x + 2\sin x)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow 9\cos^2 x + 12\cos x \cdot \sin x + 4\sin^2 x = 4(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$\Leftrightarrow 5\cos^2 x + 12\cos x \cdot \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x(5\cos x + 12\sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ 5\cos x + 12\sin x = 0 \end{cases}$$

Với $\cos x = 0 \Rightarrow \sin x = 1$ loại vì $\sin x < 0$.

Với $5\cos x + 12\sin x = 0$, ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 5\cos x + 12\sin x = 0 \\ 3\cos x + 2\sin x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -\frac{5}{13} \\ \cos x = \frac{12}{13} \end{cases}.$$

Vậy $\sin x = -\frac{5}{13}$.

Bài 2. Biết $\tan \alpha = 2$, giá trị của biểu thức $M = \frac{3\sin \alpha - 2\cos \alpha}{5\cos \alpha + 7\sin \alpha}$ bằng:

A. $-\frac{4}{9}$;

B. $\frac{4}{19}$;

C. $-\frac{4}{19}$;

D. $\frac{4}{9}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cách 1: Vì $\cos \alpha \neq 0$ nên chia cả tử và mẫu của M cho $\cos \alpha$ ta có:

$$M = \frac{3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 2}{5 + 7 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{3 \cdot \tan \alpha - 2}{5 + 7 \cdot \tan \alpha} = \frac{3 \cdot 2 - 2}{5 + 7 \cdot 2} = \frac{4}{19}.$$

Cách 2: Ta có: $\tan \alpha = 2 \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2 (\cos \alpha \neq 0) \Leftrightarrow \sin \alpha = 2\cos \alpha$, thay $\sin \alpha = 2\cos \alpha$

vào M ta được $M = \frac{3 \cdot 2\cos \alpha - 2\cos \alpha}{5\cos \alpha + 7 \cdot 2\cos \alpha} = \frac{4\cos \alpha}{19\cos \alpha} = \frac{4}{19}$.

Bài 3. Cho $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ và góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khi đó.

A. $\cot \alpha = \frac{4}{3}$;

B. $\sin \alpha = \frac{3}{5}$;

C. $\tan \alpha = \frac{4}{5}$.

D. $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\Leftrightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \sin \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$$

Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin \alpha > 0$. Do đó $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}, \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\frac{4}{3}.$$

Vậy đáp án đúng là B.

Bài 4. Cho $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ và góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khi đó.

A. $\cot \alpha = \frac{4}{3}$;

B. $\sin \alpha = \frac{3}{5}$;

C. $\tan \alpha = \frac{4}{5}$.

D. $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\Leftrightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \sin \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$$

Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin \alpha > 0$. Do đó $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}, \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\frac{4}{3}.$$

Vậy đáp án đúng là B.

Bài 5. Biết $\tan \alpha = 2$, giá trị của biểu thức $M = \frac{3\sin \alpha - 2\cos \alpha}{5\cos \alpha + 7\sin \alpha}$ bằng:

A. $-\frac{4}{9}$;

B. $\frac{4}{19}$;

C. $-\frac{4}{19}$;

D. $\frac{4}{9}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cách 1: Vì $\cos \alpha \neq 0$ nên chia cả tử và mẫu của M cho $\cos \alpha$ ta có:

$$M = \frac{3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 2}{5 + 7 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{3 \cdot \tan \alpha - 2}{5 + 7 \cdot \tan \alpha} = \frac{3 \cdot 2 - 2}{5 + 7 \cdot 2} = \frac{4}{19}.$$

Cách 2: Ta có: $\tan \alpha = 2 \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2 (\cos \alpha \neq 0) \Leftrightarrow \sin \alpha = 2 \cos \alpha$, thay $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$

vào M ta được $M = \frac{3.2 \cos \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \cos \alpha + 7.2 \cos \alpha} = \frac{4 \cos \alpha}{19 \cos \alpha} = \frac{4}{19}$.

Bài 6. Nếu $3 \cos x + 2 \sin x = 2$ và $\sin x < 0$ thì giá trị đúng của $\sin x$ là:

A. $-\frac{5}{13}$;

B. $-\frac{7}{13}$;

C. $-\frac{9}{13}$;

D. $-\frac{12}{13}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: $3 \cos x + 2 \sin x = 2$

$$\Leftrightarrow (3 \cos x + 2 \sin x)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow 9 \cos^2 x + 12 \cos x \cdot \sin x + 4 \sin^2 x = 4(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$\Leftrightarrow 5 \cos^2 x + 12 \cos x \cdot \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x(5 \cos x + 12 \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ 5 \cos x + 12 \sin x = 0 \end{cases}$$

Với $\cos x = 0 \Rightarrow \sin x = 1$ loại vì $\sin x < 0$.

Với $5 \cos x + 12 \sin x = 0$, ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 5 \cos x + 12 \sin x = 0 \\ 3 \cos x + 2 \sin x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -\frac{5}{13} \\ \cos x = \frac{12}{13} \end{cases}$.

Vậy $\sin x = -\frac{5}{13}$.