


## Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ $0^\circ$ đến $180^\circ$ . Định lí cosin và định lí sin trong tam giác

### A. Lý thuyết

#### 1. Giá trị lượng giác của một góc từ $0^\circ$ đến $180^\circ$

##### 1.1 Định nghĩa



Với mỗi góc  $\alpha$  ( $0 \leq \alpha \leq 180^\circ$ ) ta xác định một điểm  $M(x_0, y_0)$  trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc  $xOM = \alpha$ . Khi đó ta có định nghĩa:

+) sin của góc  $\alpha$ , kí hiệu là  $\sin \alpha$ , được xác định bởi:  $\sin \alpha = y_0$ ;

+) cosin của góc  $\alpha$ , kí hiệu là  $\cos \alpha$ , được xác định bởi:  $\cos \alpha = x_0$ ;

+) tang của góc  $\alpha$ , kí hiệu là  $\tan \alpha$ , được xác định bởi:  $\tan \alpha = \frac{y_0}{x_0}$  ( $x_0 \neq 0$ );

+) cotang của góc  $\alpha$ , kí hiệu là  $\cot \alpha$ , được xác định bởi:  $\cot \alpha = \frac{x_0}{y_0}$  ( $y_0 \neq 0$ ).

Các số  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\tan \alpha$ ,  $\cot \alpha$  được gọi là các giá trị lượng giác của góc  $\alpha$ .

#### Chú ý:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} (\alpha \neq 90^\circ);$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (0 < \alpha < 180^\circ).$$


$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha (0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ);$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha \quad (0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ);$$

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha \quad (0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ);$$

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha \quad (0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ).$$

## 1.2. Tính chất



Trên hình bên ta có dây cung NM song song với trục Ox và nếu  $\angle xOM = \alpha$  thì

$\angle xON = 180^\circ - \alpha$ . Với  $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$  thì:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha,$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha \quad (\alpha \neq 90^\circ),$$

$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha \quad (\alpha \neq 0^\circ, \alpha \neq 180^\circ).$$

**Ví dụ:** Tính giá trị của biểu thức sau:

$$A = \cos 0^\circ + \cos 20^\circ + \cos 40^\circ + \dots + \cos 160^\circ + \cos 180^\circ.$$

**Hướng dẫn giải:**

$$\begin{aligned} A &= \cos 0^\circ + \cos 20^\circ + \cos 40^\circ + \dots + \cos 160^\circ + \cos 180^\circ \\ &= \cos 0^\circ + \cos 180^\circ + \cos 20^\circ + \cos 160^\circ + \dots + \cos 80^\circ + \cos 100^\circ \\ &= \cos 0^\circ - \cos 0^\circ + \cos 20^\circ - \cos 20^\circ + \dots + \cos 80^\circ - \cos 80^\circ \\ &= 0. \end{aligned}$$

## 1.3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Góc $\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\parallel$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot \alpha$	$\parallel$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\parallel$

**Chú thích:** Dấu “ $\parallel$ ” biểu thị sự không xác định của giá trị lượng giác tại góc đó.

**Ví dụ:**

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2};$$

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2};$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3};$$

$$\cot 120^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

**Chú ý:** Cách sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác:

– Ta có thể tìm giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ  $0^\circ$  đến  $180^\circ$  bằng cách sử dụng các phím: sin, cos, tan trên máy tính cầm tay.

**Ví dụ:** Dùng máy tính cầm tay, tính các giá trị lượng giác sau (làm tròn đến hàng phần chục nghìn).

$$\sin 55^\circ, \cos 140^\circ, \tan 80^\circ.$$

**Hướng dẫn giải:**

Để tính các giá trị lượng giác trên, sau khi đưa máy tính về chế độ “độ” ta làm như sau:

	Nút ấn	Kết quả (đã làm tròn)
$\sin 55^\circ$	$\sin \Rightarrow 5 \Rightarrow 5 \Rightarrow =$	0,8192
$\cos 140^\circ$	$\cos \Rightarrow 1 \Rightarrow 4 \Rightarrow 0 \Rightarrow =$	-0,7660
$\tan 80^\circ$	$\tan \Rightarrow 8 \Rightarrow 0 \Rightarrow =$	5,6713

– Ta có thể tìm số đo (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ  $0^\circ$  đến  $180^\circ$  khi biết giá trị lượng giác của góc đó bằng cách sử dụng các phím: SHIFT cùng với sin; cos; tan trên máy tính cầm tay.

**Ví dụ:** Sử dụng máy tính cầm tay, tìm số đo góc của  $\alpha$  (từ  $0^\circ$  đến  $180^\circ$ ) và làm tròn đến độ, biết:

a)  $\sin \alpha = 0,56$

b)  $\cos \alpha = -0,95$

c)  $\tan \alpha = 0,42$

**Hướng dẫn giải:**

Để tính gần đúng số đo góc  $\alpha$  trong mỗi trường hợp trên, sau khi đưa máy tính về chế độ “độ”, ta làm như sau:

	Nút ấn	Kết quả (đã làm tròn)
$\sin \alpha = 0,56$	$\text{SHIFT} \Rightarrow \sin \Rightarrow 0,56 \Rightarrow =$	$34^\circ$
$\cos \alpha = -0,95$	$\text{SHIFT} \Rightarrow \cos \Rightarrow -0,95 \Rightarrow =$	$162^\circ$
$\tan \alpha = 0,42$	$\text{SHIFT} \Rightarrow \tan \Rightarrow 0,42 \Rightarrow =$	$23^\circ$

## 2. Định lí côsin

Cho tam giác ABC có  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AB = c$ . Khi đó:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac\cos B,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

**Lưu ý:**

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc},$$


$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca},$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

**Ví dụ:** Chứng minh  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$ .

**Hướng dẫn giải:**

Cho tam giác ABC với  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$ .



Cho tam giác ABC, đặt  $AB = c$ ,  $AC = b$ ,  $BC = a$ ,  $\cos A = \cos \alpha$

Kẻ BH vuông góc với AC.

Xét các tam giác vuông BHC và AHB, áp dụng định lý Py-ta-go ta có:

$$\begin{aligned} BC^2 &= BH^2 + HC^2 \\ &= BH^2 + (AC - AH)^2 \\ &= BH^2 + AC^2 - 2.AC.AH + AH^2 \\ &= (BH^2 + AH^2) + AC^2 - 2.AC.AH \\ &= AB^2 + AC^2 - 2.AC.AH \end{aligned}$$

( $BH^2 + AH^2 = AB^2$  do áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông AHB).

Xét tam giác vuông AHB, ta lại có:


$$\cos A = \frac{AH}{AB}$$

$$\Rightarrow AH = AB \cdot \cos A = c \cdot \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } a^2 = BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AC \cdot AH \\ &= c^2 + b^2 - 2b \cdot c \cdot \cos \alpha \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha \text{ (đpcm).} \end{aligned}$$

**Ví dụ:** Cho tam giác ABC có  $A = 60^\circ$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 8$ . Tính BC.

**Hướng dẫn giải:**



Áp dụng định lí Cosin trong tam giác ABC ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$$

Thay số ta có:

$$BC^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow BC^2 = 36 + 64 - 48 = 52$$

$$\Leftrightarrow BC = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

Vậy  $BC = 2\sqrt{13}$ .

### 3. Định lí sin

Cho tam giác ABC có  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AB = c$  và bán kính đường tròn ngoại tiếp là  $R$ . Khi đó:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

**Lưu ý:**

$$a = 2R\sin A,$$

$$b = 2R\sin B,$$

$$c = 2R\sin C.$$

**Ví dụ:** Chứng minh định lí sin.


**Hướng dẫn giải:**

Ta chỉ cần chứng minh  $\frac{a}{\sin A} = 2R$ , các dấu bằng kia chứng minh hoàn toàn tương

tự. Ta xét ba trường hợp sau:

TH1: Tam giác ABC vuông tại A. Khi đó  $\sin A = \sin 90^\circ = 1$ . Vì BC là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên  $a = BC = 2R$ .


$$\text{Vậy } \frac{a}{\sin A} = \frac{BC}{1} = 2R.$$



TH2: Góc A nhọn. Gọi D là điểm sao cho BD là đường kính. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn nên  $A = D$ .

Từ đó  $\sin A = \sin D = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$ .


Suy ra  $\frac{a}{\sin A} = 2R$ .



TH3: Góc A tù. Gọi D là điểm sao cho BD là đường kính. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn nên  $A + D = 180^\circ$ . Suy ra  $\sin A = \sin D$  (hai góc bù nhau có sin bằng nhau).

Ta có  $\sin D = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$

Suy ra  $\frac{a}{\sin A} = 2R$ .






**Ví dụ:** Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc  $35^\circ$  và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc  $15^\circ$ . Tính chiều cao ngọn núi đó so với mặt đất biết rằng tòa nhà cao 60 m.

**Hướng dẫn giải:**

Bài toán trên được mô phỏng lại như hình vẽ với A là vị trí của người đó tại sân thượng của tòa nhà, B là vị trí của người đó tại tầng trệt. C và D lần lượt là đỉnh và chân của ngọn núi.



Từ A hạ AE vuông góc với CD tại E.

$$\text{Theo đề ra ta có } \begin{cases} AB = 60\text{m} \\ \angle DBC = 35^\circ \\ \angle DAE = 15^\circ \end{cases}$$

Ta có:

$$\angle ABD = \angle ABC - \angle DBC = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ;$$

$$\angle BAD = \angle BAE + \angle DAE = 90^\circ + 15^\circ = 105^\circ.$$

Mà  $\angle ADB + \angle BAD + \angle ABD = 180^\circ$  (Tổng 3 góc của một tam giác bằng  $180^\circ$ )

Suy ra:

$$\begin{aligned}
 \angle ADB &= 180^\circ - \angle BAD - \angle ABD \\
 &= 180^\circ - 105^\circ - 55^\circ \\
 &= 20^\circ
 \end{aligned}$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD ta có:

$$\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \angle BAD}$$

$$\Leftrightarrow BD = \frac{AB \cdot \sin \angle BAD}{\sin \angle ADB} = \frac{60 \cdot \sin 105^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 169,45 \text{ (m)}.$$

Xét tam giác CBD vuông tại C, ta có:

$$CD = BD \cdot \sin \angle DBC = 169,45 \cdot \sin 35^\circ \approx 97,19 \text{ (m)}.$$

Vậy ngọn núi cao xấp xỉ 97,19 m.

## B. Bài tập tự luyện

### B.1 Bài tập tự luận

**Bài 1.** Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị các biểu thức sau:

a)  $A = 3 - \sin^2 90^\circ + 2\cos^2 60^\circ - 3\tan^2 45^\circ;$

b)  $B = a^2 \sin 90^\circ + b^2 \cos 90^\circ + c^2 \cos 180^\circ.$

**Hướng dẫn giải:**

a)  $A = 3 - \sin^2 90^\circ + 2\cos^2 60^\circ - 3\tan^2 45^\circ$

$$= 3 - 1^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$


$$= 1.$$

b)  $B = a^2 \sin 90^\circ + b^2 \cos 90^\circ + c^2 \cos 180^\circ$

$$= a^2 \cdot 1 + b^2 \cdot 0 + c^2 \cdot (-1)$$

$$= a^2 - c^2.$$

**Bài 2.** Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m, người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là  $34^\circ$  và  $38^\circ$ . (Hình minh họa như hình bên).



**Hướng dẫn giải:**

Gọi D và C lần lượt là đỉnh và chân của ngọn núi.

Đặt  $BC = x$  (m);

Ta có:  $500 + x$  (m)

Xét tam giác vuông ACD, ta có:

$$\tan \angle CAD = \frac{CD}{AC} \Rightarrow CD = AC \cdot \tan \angle CAD$$

$$\Rightarrow CD = (500 + x) \cdot \tan 34^\circ \quad (1)$$

Xét tam giác BCD, ta có:

$$\tan \angle CBD = \frac{CD}{BC} \Rightarrow CD = BC \cdot \tan \angle CBD$$

$$\Rightarrow CD = x \cdot \tan 38^\circ \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$(500 + x) \cdot \tan 34^\circ = x \cdot \tan 38^\circ$$

$$\Leftrightarrow 500 \cdot \tan 34^\circ + x \cdot \tan 34^\circ = x \cdot \tan 38^\circ$$

$$\Leftrightarrow 500 \cdot \tan 34^\circ = x \cdot \tan 38^\circ - x \cdot \tan 34^\circ$$

$$\Leftrightarrow x \cdot \tan 38^\circ - x \cdot \tan 34^\circ = 500 \cdot \tan 34^\circ$$

$$\Leftrightarrow x.(\tan 38^\circ - \tan 34^\circ) = 500.\tan 34^\circ$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{500.\tan 34^\circ}{\tan 38^\circ - \tan 34^\circ}$$

$$\Leftrightarrow x \approx 3158,5\text{m}$$

$$\Rightarrow CD = 3158,5.\tan 38^\circ \approx 2467,7 \text{ (m)}$$

Vậy chiều cao của ngọn núi là 2467,7 mét.

## B.2 Bài tập trắc nghiệm

**Câu 1.** Tam giác ABC có  $AB = 2$ ,  $AC = 1$  và  $A = 60^\circ$ . Tính độ dài cạnh BC.

A.  $BC = 1$ ;

B.  $BC = 2$ ;

C.  $BC = \sqrt{2}$ ;

D.  $BC = \sqrt{3}$

### Hướng dẫn giải

**Đáp án đúng là: D**

Theo định lí côsin, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A = 2^2 + 1^2 - 2.2.1.\cos 60^\circ = 3$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{3}.$$

**Câu 2.** Tam giác ABC có  $B = 60^\circ$ ,  $C = 45^\circ$  và  $AB = 5$ . Tính độ dài cạnh AC.

A.  $AC = \frac{5\sqrt{6}}{2}$ ;

B.  $AC = 5\sqrt{3}$ ;

C.  $AC = 5\sqrt{2}$ ;

D.  $AC = 10$ .

**Hướng dẫn giải**

**Đáp án đúng là: A**

Theo định lí sin, ta có:

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Leftrightarrow \frac{5}{\sin 45^\circ} = \frac{AC}{\sin 60^\circ}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{5 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{5\sqrt{6}}{2}.$$

**Câu 3.** Tam giác ABC có  $BC = 10$  và  $A = 30^\circ$ . Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A.  $R = 5$ ;

B.  $R = 10$ ;

C.  $R = \frac{10}{\sqrt{3}}$ ;

D.  $R = 10\sqrt{3}$ .

**Hướng dẫn giải**

**Đáp án đúng là: B**

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC, ta có:

$$\frac{BC}{\sin BAC} = 2R \Rightarrow R = \frac{BC}{2 \cdot \sin A} = \frac{10}{2 \cdot \sin 30^\circ} = 10.$$