



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам исследования метилирования свободно циркулирующей ДНК · тест **EpiPrint** (ранняя диагностика онкологического процесса)

Пациент

Код ZVP240274
Индивидуальный № P-671935
Пол мужской
Возраст 54 лет

Образец и метод

Идентификатор EP_-019_39_ZVP240274
Биоматериал плазма крови, cfDNA
Метод · набор WGBS · Vazyme
Референсный геном GRCh38 (hg38)

Сроки исследования

Направитель КДЛ ДОМОДЕДОВО
Забор материала 01.07.2026
Поступление 02.07.2026
Готовность 04.07.2026
Заключение № EP-5109/026-019

Результат



Онкологический сигнал обнаружен

В образце свободно циркулирующей ДНК плазмы крови выявлен профиль метилирования, характерный для онкологического процесса. Расчётная вероятность наличия онкологического процесса — **88%**; категория риска — **высокая**. Результат подлежит подтверждению методами клинического и инструментального обследования.

Интерпретация

Выявленный профиль метилирования ассоциирован с онкологическим процессом. Показано дообследование у профильного специалиста для верификации результата и установления окончательного диагноза.

Ограничения интерпретации

Результат исследования не является установленным диагнозом и не может служить единственным основанием для его постановки. Окончательная интерпретация осуществляется лечащим врачом с учётом клинической картины и данных иных методов обследования.

Предполагаемая локализация источника сигнала

ИСТОЧНИК СИГНАЛА

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Пищевод

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Поджелудочная железа

Предполагаемая локализация источника сигнала указывает ткань или орган, ассоциированные с выявленным профилем метилирования, и предназначена для определения приоритетного направления диагностического поиска.

Протяжённость индикатора отражает степень соответствия профиля метилирования опухолям указанной локализации: большей протяжённости соответствует более высокая степень соответствия. Диагностическую оценку следует начинать с прогноза первого порядка.

Протяжённость индикатора не отражает вероятность наличия злокачественного новообразования и не заменяет топической диагностики.

Ограничения метода

- Исследование не заменяет установленный клинический диагноз и требует подтверждения стандартными методами обследования.
- Диагностическая чувствительность метода снижается на ранних стадиях заболевания и при низкой доле опухолевой ДНК в образце.
- Панель охватывает ограниченный перечень локализаций; отдельные нозологические формы могут не выявляться.

Методика

Исследование профиля метилирования свободно циркулирующей ДНК плазмы крови по панели из 52 маркерных регионов. Референсный геном — GRCh38 (hg38); платформа секвенирования — DNBSEQ/Illumina. Контроль качества образца — **пройден**. Оценка вероятности выполнена путём сопоставления профиля метилирования образца с референсными профилями.

Заведующий лабораторией

[И. О. Фамилия]

врач клинической лабораторной диагностики

Дата выдачи: 04.07.2026



