



Universidade de Aveiro
Departamento de Física

Exame Teórico


Física Computacional — 2016/2017

23 de junho de 2017

Duração: 2h30

Justifique as suas respostas às perguntas. O uso de calculadora não é permitido.

1. (1.5 + 1.5 + 2.0 val.) Considere a seguinte reação química:



O sistema de equações diferenciais que descreve a evolução com o tempo das concentrações u_1, u_2 e u_3 das espécies A, B e C é o seguinte

$$\begin{cases} u'_1 = \frac{du_1}{dt} = -K_1 u_1 u_2 + K_2 u_3, \\ u'_2 = \frac{du_2}{dt} = -K_1 u_1 u_2 + K_2 u_3, \\ u'_3 = \frac{du_3}{dt} = +K_1 u_1 u_2 - K_2 u_3, \end{cases}$$

onde, obviamente, as constantes K_1 e K_2 são reais e positivas.

- Mostre que o sistema de equações não é linear. De que maneira é que isto pode complicar a aplicação de métodos implícitos?
- A estabilidade deste problema não linear pode ser estudada, dadas algumas condições, a partir da matriz jacobiana do vetor das concentrações, definida por

$$A = \begin{bmatrix} \frac{du'_1}{du_1} & \frac{du'_1}{du_2} & \frac{du'_1}{du_3} \\ \frac{du'_2}{du_1} & \frac{du'_2}{du_2} & \frac{du'_2}{du_3} \\ \frac{du'_3}{du_1} & \frac{du'_3}{du_2} & \frac{du'_3}{du_3} \end{bmatrix}.$$

Determine a matriz e explique como faria para determinar os seus valores próprios.

- Os mesmos critérios de estabilidade que foram discutidos a partir dos valores próprios das matrizes de sistemas lineares podem ser usados aqui. Os valores próprios da matriz da alínea b) são $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ e $\lambda_3 = -K_1(u_1 + u_2) - K_2$. Esboce os gráficos das regiões de estabilidade de três hipotéticos métodos numéricos usados para resolver problemas de valor inicial tais que
 - O método seja instável.
 - O método seja incondicionalmente estável.
 - O método seja condicionalmente estável. Discuta a condição de estabilidade.

2. (1.5 + 1.0 + 2.5 val.) As ondas de som estacionárias no interior de um tubo fechado numa extremidade e aberto na outra são soluções da equação

$$v^2(x) \frac{d^2 y(x)}{dx^2} = -\omega^2 y(x),$$

com as condições fronteira

$$y(x=0) = 0, \quad \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=L} = 0.$$

- a) Este problema pode ser resolvido usando o método de shooting. Explique genericamente como funciona este método.
- b) Suponha que quer determinar numericamente a frequência do 4º harmónico usando o método de shooting (com o auxílio do método da secante). Quais são os cálculos exploratórios que têm de ser feitos previamente?
- c) Descreva a estrutura do programa que usaria. Explique a função do método da secante sem entrar em pormenores matemáticos.

3. (1.5 + 2.5 + 1.0 val.)

- a) Explique porque é que a integração numérica por métodos de Monte Carlo se torna mais vantajosa que os métodos numéricos tradicionais de quadratura quando o integral é múltiplo, com um número elevado de variáveis de integração.
- b) Considere uma rede quadrada de n por n spins. A interação entre os spins é descrita pelo modelo de Ising: a energia (em unidades reduzidas) de uma dada configuração α do sistema é dada por uma soma sobre todos os pares de vizinhos próximos:

$$E_{\alpha} = - \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j .$$

A magnetização de uma dada configuração é

$$M_{\alpha} = \sum_{i=1}^{n^2} S_i .$$

Se forem seleccionadas L configurações com igual probabilidade, a estimativa de Monte Carlo da magnetização média será

$$\langle M \rangle_{\text{MC}} = \frac{\sum_{\alpha=1}^L M_{\alpha} e^{-E_{\alpha}/T}}{\sum_{\alpha=1}^L e^{-E_{\alpha}/T}} ,$$

onde M_{α} e E_{α} são a magnetização e a energia da configuração α . Escreva em pseudocódigo um programa para determinar a magnetização média por partícula do sistema a uma dada temperatura, usando configurações geradas com igual probabilidade. Pode assumir que está disponível uma função `randi(nmax, a, b)` que gera uma matriz de $a \times b$ números inteiros aleatórios uniformemente distribuídos entre 0 e $nmax$. Ignore completamente o problema das fronteiras do domínio. Ao contrário do algoritmo de Metropolis, não é necessário desprezar algumas configurações.

- c) O algoritmo da alínea anterior é extremamente ineficiente. Explique o conceito de amostragem por importância.

4. (2.5 + 0.7 + 1.8 val.) Para resolver numericamente a equação de condução de calor a uma dimensão,

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2},$$

pode-se usar uma aproximação de diferenças finitas para a derivada em ordem a x , e fica-se com um conjunto de $(N_x - 2)$ ODE:

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \frac{T(x - \Delta x, t) - 2T(x, t) + T(x + \Delta x, t)}{(\Delta x)^2}.$$

Aplicando o método de Crank–Nicolson, chega-se a

$$\begin{aligned} -T(i-1, n+1) + \left(\frac{2}{\eta} + 2\right)T(i, n+1) - T(i+1, n+1) \\ = T(i-1, n) + \left(\frac{2}{\eta} - 2\right)T(i, n) + T(i+1, n) \end{aligned}$$

com $\eta = k\Delta t/[c\rho(\Delta x)^2]$.

a) Considere um problema deste tipo em que as condições fronteira são

$$T(0, t) = 20, \quad T(L, t) = 25 + 50 \times \tanh(t/1000).$$

O sistema de equações para cada passo de tempo pode ser escrito na forma matricial,

$$A \begin{bmatrix} T(2, n+1) \\ T(3, n+1) \\ \vdots \\ T(N_x - 2, n+1) \\ T(N_x - 1, n+1) \end{bmatrix} = \mathbf{b},$$

onde A é uma matriz quadrada e \mathbf{b} é um vetor coluna. Justificando adequadamente, escreva as duas primeiras e as duas últimas linhas de A e os dois primeiros e os dois últimos elementos de \mathbf{b} .

- b) Explique porque é que se usarmos o método de Euler para este problema já não temos que nos preocupar com a escolha de um método de resolução de sistemas de equações algébricas lineares.
- c) Para este problema, explique as vantagens do método de Crank–Nicolson em relação ao método de Euler. São estas as duas únicas alternativas possíveis?