

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

7. Πρότυπα πάνω από περιοχές κύριων ιδεωδών (Συνέχεια)


Η απόδειξη της ύπαρξης της διάσπασης σε αναλλοίωτους παράγοντες βασίζεται στο παρακάτω λήμμα, το οποίο αποτελεί μια εκτέλεση του Θεωρήματος 7.1.

Λήμμα 7.5. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και M ένα ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n . Αν N είναι υποπρότυπο του M , τότε υπάρχει βάση $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ του M , ένας μη αρνητικός ακέραιος $d \leq n$ και στοιχεία $a_1, a_2, \dots, a_d \in R$ τέτοια ώστε

- $a_i \mid a_j$, για κάθε $1 \leq i \leq j \leq d$, και
- το σύνολο $\{a_1 e_1, a_2 e_2, \dots, a_d e_d\}$ αποτελεί βάση του N .

Η απόδειξη του Λήμματος 7.5, η οποία παραλείπεται, χρησιμοποιεί τεχνικές γραμμικής άλγεβρας και συγκεκριμένα την κανονική μορφή *Smith* (βλ. [1, Κεφάλαιο 4]).

Παράδειγμα 7.6. Ας δούμε τι ακριβώς μας πληροφορεί το Λήμμα 7.5 στην περίπτωση των αβελιανών ομάδων. Έστω $R = \mathbb{Z}$ και $M = \mathbb{Z}[i]$. Όπως είδαμε στο Παράδειγμα 5.2 (ε), το M είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο τάξης 2 με βάση $\{1, i\}$. Στην βάση αυτή, μπορούμε να φανταστούμε το M ως το σύνολο των ζευγών με ακέραιες συντεταγμένες στο (μιγαδικό) επίπεδο



όπως κάναμε στο Παράδειγμα 2.3.


Μια άλλη βάση του M είναι το σύνολο $\{1 + 2i, i\}$. Πράγματι, κάθε $\alpha + \beta i \in M$ μπορεί να γραφεί ως

$$\alpha + \beta i = \alpha + 2\alpha i - 2\alpha i + \beta i = \alpha(1 + 2i) + \underbrace{(\beta - 2\alpha)}_{\in \mathbb{Z}} i$$


και αν

$$0 = \gamma(1 + 2i) + \delta i = \gamma + (2\gamma + \delta)i$$

τότε $\gamma = \delta = 0$. Στην νέα αυτή βάση, το “πλέγμα” της προηγούμενης εικόνας παίρνει την μορφή




Ας θεωρήσουμε το υποπρότυπο $N = M(1 + 2i)$. Αυτό είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο με βάση το $\{1 + 2i, -2 + i\}$ (γιατί;), σε συμφωνία με το Θεώρημα 7.1. Στην βάση αυτή και την αρχική βάση του M , τα “πλέγματα” των δύο αυτών προτύπων μοιάζουν ως εξής



Οι βάσεις $\{1, i\}$ και $\{1 + 2i, -2 + i\}$ των M και N , αντίστοιχα, δεν ικανοποιούν τις συνθήκες του Λήμματος 7.5. Μια ακόμη βάση του N είναι το σύνολο $\{1 + 2i, 5i\}$ (γιατί;). Η βάση

αυτή μαζί με την βάση $\{1 + 2i, i\}$ του M που είδαμε παραπάνω ικανοποιούν τις συνθήκες του Λήμματος 7.5 με $a_1 = 1$ και $a_2 = 5$, με την εικόνα που προκύπτει να είναι η εξής



Το Λήμμα 7.5 μας πληροφορεί ότι μπορούμε πάντα να βρούμε δύο τέτοιες βάσεις.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.3 (Υπαρξη αναλλοίωτων παραγόντων). Θα αποδείξουμε την ύπαρξη της διάσπασης σε αναλλοίωτους παράγοντες. Για το λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι το M έχει ένα σύνολο με d γεννήτορες. Από την Πρόταση 5.4 έπεται ότι υπάρχει ένα ελεύθερο R -πρότυπο F τάξης d και ένας R -επιμορφισμός $\phi : F \rightarrow M$ και από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, έπεται ότι $M \cong F/N$, όπου $N = \ker(\phi)$.

Εφαρμόζοντας το Λήμμα 7.5 στο F και το N , μπορούμε να γράψουμε

$$F = Re_1 \oplus Re_2 \oplus \cdots \oplus Re_d$$

$$N = Ra_1e_1 \oplus Ra_2e_2 \oplus \cdots \oplus Ra_\ell e_\ell,$$

για κάποια $e_1, e_2, \dots, e_d \in M$, $\ell \leq d$ και $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in R$ τέτοια ώστε $a_i \mid a_{i+1}$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$. Από την Άσκηση 21, έχουμε

$$\begin{aligned} M &\cong F/N \\ &= \frac{Re_1 \oplus Re_2 \oplus \cdots \oplus Re_\ell \oplus Re_{\ell+1} \oplus \cdots \oplus Re_d}{Ra_1e_1 \oplus Ra_2e_2 \oplus \cdots \oplus Ra_\ell e_\ell \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0} \\ &\cong \frac{Re_1}{Ra_1e_1} \oplus \frac{Re_2}{Ra_2e_2} \oplus \cdots \oplus \frac{Re_\ell}{Ra_\ell e_\ell} \oplus Re_{\ell+1} \oplus \cdots \oplus Re_d \\ &\cong R^{d-\ell} \oplus R/(a_1) \oplus R/(a_2) \oplus \cdots \oplus R/(a_\ell) \end{aligned}$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να αποδείξουμε την μοναδικότητα της τάξης του M ως R -πρότυπο.

Απόδειξη Θεωρήματος 7.3 (Μοναδικότητα τάξης). Έχοντας κατά νου την διάσπαση (7.4), αν

$$M \cong R^n \oplus M_{\text{tor}} \cong R^k \oplus M_{\text{tor}},$$

για κάποια $n, k \geq 0$, τότε

$$M/M_{\text{tor}} \cong R^n \cong R^k.$$

Από το Θεώρημα 5.6 (μοναδικότητα τάξης ελεύθερου προτύπου), έπεται ότι $n = k$. $\square$

Η απόδειξη της μοναδικότητας της διάσπασης σε αναλλοίωτους παράγοντες βασίζεται στο παρακάτω λήμμα.

Λήμμα 7.7. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και $p \in R$ ένα ανάγωγο στοιχείο. Αν M είναι κυκλικό R -πρότυπο με $\text{Ann}_R(M) = (a)$, για κάποιο $a \in R$, τότε

$$\dim_{R/(p)}(M/pM) = \begin{cases} 1, & \text{αν } p \mid a \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $pM := (p)M$.

Απόδειξη. Στην απόδειξη του Θεωρήματος 5.6 είδαμε ότι το M/pM είναι $R/(p)$ -πρότυπο. Επειδή το p είναι ανάγωγο, το Λήμμα 2.14 μας πληροφορεί ότι το ιδεώδες (p) του R είναι μεγιστικό και κατά συνέπεια το $R/(p)$ είναι σώμα από την Πρόταση 1.10. Επομένως, έχει νόημα να υπολογίσουμε την ποσότητα $\dim_{R/(p)}(M/pM)$.

Παρατηρούμε ότι

$$pM \cong \frac{(p) + (a)}{(a)}$$

(γιατί;). Επομένως, από το τρίτο θεώρημα ισομορφισμού, έπεται ότι

$$\frac{M}{pM} \cong \frac{R/(a)}{((p) + (a))/(a)} \cong \frac{R}{(p) + (a)}.$$

Αν $p \mid a$, τότε $(p) + (a) = (p)$ και γι αυτό

$$\dim_{R/(p)}(M/pM) = \dim_{R/(p)}(R/(p)) = 1.$$

Διαφορετικά, υποθέτουμε ότι $p \nmid a$. Στην περίπτωση αυτή, ισχυριζόμαστε ότι $(p) + (a) = R$ και κατά συνέπεια

$$\dim_{R/(p)}(M/pM) = \dim_{R/(p)}(R/R) = \dim_{R/(p)}(0) = 0.$$

Πράγματι, επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έχουμε

$$(p) + (a) = (d),$$

για κάποιο $d \in R$. Επομένως, $(p) \subseteq (d)$ που σημαίνει ότι $d \mid p$. Όμως, το p είναι ανάγωγο και γι αυτό οι μόνοι διαιρέτες του είναι τα αντιστρέψιμα στοιχεία και τα συντροφικά του. Αν τα d και a είναι συντροφικά, τότε $d = up$ για κάποιο $u \in R^\times$. Όμως,

$$(a) \subseteq (d) = (up) = (p),$$

που σημαίνει ότι $p \mid a$, το οποίο είναι αδύνατο. Άρα, $d \in R^\times$ και γι αυτό $(d) = R$. $\square$

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.3 (Μοναδικότητα αναλλοίωτων παραγόντων). Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι¹ $M = M_{\text{tor}}$ και θεωρούμε δύο διασπάσεις σε αναλλοίωτους παράγοντες

$$M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_\ell \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_k,$$

όπου $\text{Ann}_R(M_i) = (a_i)$, $\text{Ann}_R(N_j) = (b_j)$ για κάθε $1 \leq i \leq \ell$ και $1 \leq j \leq k$ με $a_i \mid a_{i+1}$ και $b_j \mid b_{j+1}$ για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$ και $1 \leq j \leq k - 1$, αντίστοιχα.

Θα δείξουμε ότι $\ell = k$. Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, από το Θεώρημα 2.12, έπεται ότι είναι και περιοχή μοναδικής παραγοντοποίησης. Συνεπώς, υπάρχει ανάγωγο $p \in R$ τέτοιο ώστε $p \mid a_1$ και κατά συνέπεια $p \mid a_i$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Από το Λήμμα 7.7 έπεται ότι

$$\dim_{R/(p)} (M_i/pM_i) = 1$$

για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Άρα,

$$\begin{aligned} \dim_{R/(p)} (M/pM) &= \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_\ell}{pM_1 \oplus pM_2 \oplus \cdots \oplus pM_\ell} \right) \\ &= \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_1}{pM_1} \oplus \frac{M_2}{pM_2} \oplus \cdots \oplus \frac{M_\ell}{pM_\ell} \right) \\ &= \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_1}{pM_1} \right) + \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_2}{pM_2} \right) + \cdots + \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_\ell}{pM_\ell} \right) \\ &= \ell, \end{aligned}$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την Άσκηση 21. Όμως, από το Λήμμα 7.7 έπεται επίσης ότι $\dim_{R/(p)} (N_j/pN_j) \leq 1$, για κάθε $1 \leq j \leq k$. Συνεπώς,

$$\ell = \dim_{R/(p)} (M/pM) = \sum_{j=1}^k \dim_{R/(p)} (N_j/pN_j) \leq k.$$

Ομοίως, $k \leq \ell$ και η ισότητα έπεται. □

Βιβλιογραφία

- [1] Μ. Π. Μαλιάκας, και Ο. Π. Ταλέλλη, *Πρότυπα πάνω από Περιοχές Κυρίων Ιδεωδών και Εφαρμογές*, Εκδόσεις Σοφία, 2009.

¹Στην περίπτωση αυτή το M ονομάζεται *πρότυπο στρέψης* (βλ. Άσκηση 18).