कब परामर्श लें

स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट · ऑडियोलॉजिस्ट · फिजियोथेरेपिस्ट

1 स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कब परामर्श लें

शिशु और बच्चे

- 6 महीने तक आ-ऊ जैसी मीठी आवाज़ें न निकालना या आवाज़ों पर प्रतिक्रिया न देना, या 9 महीने तक बा-बा, मा-मा जैसी आवाज़ें न दोहराना
- 12 महीने तक इशारा न करना, हाथ न हिलाना या नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना
- 18 महीने तक कोई शब्द न बोलना या बहुत कम शब्द बोलना, या 2 साल तक दो शब्द जोड़कर न बोलना
- उम्र के अनुसार बोली का स्पष्ट न होना
- हकलाना, या आवाज़ का भर्राया हुआ होना या गले पर ज़ोर पड़ना
- खाने, चबाने या निगलने में कठिनाई
- पहले से आई बोलने या भाषा की क्षमता का खो जाना

वयस्क

- स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट के बाद अस्पष्ट बोली (जीभ लड़खड़ाना), शब्द ढूँढने में कठिनाई, या दूसरों की बात समझने में परेशानी
- 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक भर्राई या कमज़ोर आवाज़
- खाते या पीते समय खाँसी या अटकना, या भोजन का गले में फँसना
- याददाश्त, सोचने या बातचीत में बदलाव, जिसमें पार्किंसन रोग या डिमेंशिया शामिल हैं
- हकलाना या आवाज़ पर ज़ोर पड़ना, जो काम या रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करे

आपात स्थिति: अचानक बोली का अस्पष्ट होना या चेहरे का एक ओर लटक जाना स्ट्रोक हो सकता है। तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाएँ।

2 ऑडियोलॉजिस्ट से कब परामर्श लें

शिशु और बच्चे

- नवजात की सुनने की जाँच न होना या उसमें पास न होना
- 6 महीने तक तेज़ आवाज़ पर न चौंकना, या आवाज़ की ओर न मुड़ना
- 12 महीने तक नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना, या बा-बा, मा-मा जैसी आवाज़ें न निकालना
- बोलने में देरी या अस्पष्ट बोली
- कान में बार-बार संक्रमण, कान दर्द, या कान से पानी या मवाद आना
- टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ रखना, या ध्यान और पढ़ाई में कमज़ोर होना

वयस्क

- बार-बार दोहराने के लिए कहना, या शोर वाली जगह पर बातचीत समझने में कठिनाई
- टीवी या फ़ोन की आवाज़ तेज़ रखना
- कान में घंटी बजना, भनभनाहट या भारीपन महसूस होना
- चक्कर आना या संतुलन की समस्या
- काम पर या हेडफ़ोन से तेज़ शोर के संपर्क में आना
- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नियमित रूप से सुनने की जाँच करानी चाहिए, और श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) उपयोग करने वालों को समय-समय पर जाँच करानी चाहिए

आपात स्थिति: एक या दोनों कानों से अचानक कम सुनाई देना आपात स्थिति है। तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

3 फिजियोथेरेपिस्ट से कब परामर्श लें

शिशु और बच्चे

- 4 महीने तक गर्दन न संभलना, 9 महीने तक बिना सहारे बैठ न पाना, या 18 महीने तक चल न पाना
- हाथ-पैर अकड़े हुए या बहुत ढीले होना, या शरीर के एक तरफ़ का ज़्यादा उपयोग करना
- पंजों के बल चलना, बार-बार गिरना, या चलने का असामान्य तरीका
- शिशुओं में गर्दन का एक ओर झुका रहना या गर्दन में कसाव
- खराब मुद्रा (पोश्चर), चपटे पैर, या तालमेल की कमी
- सेरेब्रल पाल्सी या विकास में देरी जैसी स्थितियाँ

वयस्क

- लगातार पीठ, गर्दन, कंधे या घुटने का दर्द, या जोड़ों में अकड़न
- सर्जरी, फ्रैक्चर या चोट के बाद स्वास्थ्य लाभ
- स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट के बाद कमज़ोरी या अंगों की हरकत में कमी
- संतुलन की समस्या, बार-बार गिरना, या चलने में कठिनाई
- पार्किंसन या अन्य तंत्रिका संबंधी रोगों में चलने-फिरने की कठिनाई
- खेल की चोटें, या लंबे समय तक बैठकर काम करने से दर्द

आपात स्थिति: पीठ दर्द के साथ पैरों में कमज़ोरी, सुन्नपन, या पेशाब या मल पर नियंत्रण खोना हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

जल्दी जाँच कराना हमेशा बेहतर परिणाम देता है। समझ नहीं आ रहा किसे दिखाएँ? अपॉइंटमेंट बुक करें, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे।