ఎప్పుడు సంప్రదించాలి

స్పీచ్-లాంగ్వేజ్ పాథాలజిస్ట్ · ఆడియాలజిస్ట్ · ఫిజియోథెరపిస్ట్

1 స్పీచ్-లాంగ్వేజ్ పాథాలజిస్ట్‌ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి

శిశువులు మరియు పిల్లలు

- 6 నెలల వరకు ఊ... ఆ... వంటి మృదువైన శబ్దాలు చేయకపోవడం లేదా శబ్దాలకు స్పందించకపోవడం, లేదా 9 నెలల వరకు బా-బా, మా-మా వంటి శబ్దాలు పలకకపోవడం
- 12 నెలల వరకు వేలు చూపించకపోవడం, చేయి ఊపకపోవడం లేదా పేరు పిలిస్తే స్పందించకపోవడం
- 18 నెలల వరకు మాటలు లేకపోవడం లేదా చాలా తక్కువ మాటలు ఉండటం, లేదా 2 సంవత్సరాల వరకు రెండు మాటలు కలిపి మాట్లాడకపోవడం
- వయసుకు తగినట్లు మాట స్పష్టంగా లేకపోవడం
- నత్తి, లేదా గొంతు బొంగురుగా/ఒత్తిడిగా ఉండటం
- తినడం, నమలడం లేదా మింగడంలో ఇబ్బంది
- ఇంతకు ముందు ఉన్న మాట లేదా భాషా నైపుణ్యాలు తగ్గిపోవడం

పెద్దలు

- స్ట్రోక్ లేదా మెదడు గాయం తర్వాత మాట ముద్దగా లేదా అస్పష్టంగా రావడం, పదాలు దొరకకపోవడం లేదా ఇతరులు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- 2-3 వారాల కంటే ఎక్కువ కాలం గొంతు బొంగురుగా లేదా బలహీనంగా ఉండటం
- తినేటప్పుడు లేదా తాగేటప్పుడు దగ్గు, పొలమారడం, లేదా ఆహారం గొంతులో ఇరుక్కున్నట్లు అనిపించడం
- పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి లేదా మతిమరుపు (డిమెన్షియా)తో సహా జ్ఞాపకశక్తి, ఆలోచన లేదా సంభాషణలో మార్పులు
- పని లేదా దైనందిన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే నత్తి లేదా గొంతుపై ఒత్తిడి

అత్యవసరం: ఆకస్మికంగా మాట ముద్దగా మారడం లేదా ముఖం ఒకవైపు వంగిపోవడం స్ట్రోక్ కావచ్చు. వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి వెళ్లండి.

2 ఆడియాలజిస్ట్‌ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి

శిశువులు మరియు పిల్లలు

- నవజాత శిశువుకు వినికిడి స్క్రీనింగ్ చేయించకపోవడం లేదా అందులో ఉత్తీర్ణత కాకపోవడం
- 6 నెలల వరకు పెద్ద శబ్దాలకు ఉలిక్కిపడకపోవడం లేదా శబ్దం వైపు తిరగకపోవడం
- 12 నెలల వరకు పేరు పిలిస్తే స్పందించకపోవడం లేదా బా-బా, మా-మా వంటి శబ్దాలు పలకకపోవడం
- మాట ఆలస్యంగా రావడం లేదా స్పష్టంగా లేకపోవడం
- తరచుగా చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు, చెవి నొప్పి, లేదా చెవి నుండి నీరు/చీము కారడం
- టీవీ సౌండ్ ఎక్కువగా పెట్టడం, లేదా శ్రద్ధ మరియు చదువులో వెనుకబడటం

పెద్దలు

- తరచుగా మళ్లీ చెప్పమని అడగడం, లేదా గోలగా ఉన్న చోట సంభాషణను అనుసరించడంలో ఇబ్బంది
- టీవీ లేదా ఫోన్ వాల్యూమ్ ఎక్కువగా పెట్టడం
- చెవిలో రింగింగ్, గుయ్యిమనే శబ్దం లేదా బరువుగా అనిపించడం
- తల తిరగడం లేదా సమతుల్యత సమస్యలు
- పనిలో లేదా హెడ్‌ఫోన్ల ద్వారా పెద్ద శబ్దాలకు గురికావడం
- 60 ఏళ్లు పైబడినవారు క్రమం తప్పకుండా వినికిడి పరీక్ష చేయించుకోవాలి; వినికిడి యంత్రం వాడేవారు తరచుగా తనిఖీ చేయించుకోవాలి

అత్యవసరం: ఒకటి లేదా రెండు చెవుల్లో ఆకస్మికంగా వినికిడి తగ్గడం అత్యవసరం. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోండి.

3 ఫిజియోథెరపిస్ట్‌ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి

శిశువులు మరియు పిల్లలు

- 4 నెలల వరకు మెడ నిలపకపోవడం, 9 నెలల వరకు సహాయం లేకుండా కూర్చోలేకపోవడం, లేదా 18 నెలల వరకు నడవకపోవడం
- కాళ్లు చేతులు బిగుసుకుపోవడం లేదా మరీ వదులుగా (మెత్తగా) ఉండటం, లేదా శరీరంలో ఒక వైపు ఎక్కువగా వాడటం
- కాలి వేళ్లపై నడవడం, తరచుగా పడిపోవడం లేదా అసాధారణంగా నడవడం
- శిశువులో తల ఒకవైపు వాలి ఉండటం లేదా మెడ బిగుసుకోవడం
- సరైన భంగిమ లేకపోవడం, చదునైన పాదాలు లేదా సమన్వయ లోపం
- సెరిబ్రల్ పాల్సీ లేదా అభివృద్ధి ఆలస్యం వంటి సమస్యలు

పెద్దలు

- నిరంతర వెన్ను, మెడ, భుజం లేదా మోకాలి నొప్పి, లేదా కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం
- శస్త్రచికిత్స, ఎముక విరగడం లేదా గాయం తర్వాత కోలుకోవడం
- స్ట్రోక్ లేదా మెదడు గాయం తర్వాత బలహీనత లేదా కదలిక కోల్పోవడం
- సమతుల్యత సమస్యలు, తరచుగా పడిపోవడం లేదా నడవడంలో ఇబ్బంది
- పార్కిన్సన్స్ లేదా ఇతర నాడీ సంబంధిత వ్యాధులతో కదలిక ఇబ్బందులు
- క్రీడా గాయాలు, లేదా ఎక్కువసేపు కూర్చుని పని చేయడం వల్ల నొప్పి

అత్యవసరం: వెన్ను నొప్పితో పాటు కాళ్లలో బలహీనత, తిమ్మిరి, లేదా మూత్రం/మలవిసర్జనపై నియంత్రణ కోల్పోవడం ఉంటే వెంటనే వైద్య సహాయం అవసరం.

ముందుగా పరీక్ష చేయించుకోవడం ఎల్లప్పుడూ మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియదా? అపాయింట్‌మెంట్ బుక్ చేసుకోండి, మేము మార్గనిర్దేశం చేస్తాము.