

Alle Aufgaben sind zusammen mit dem Lösungsweg in möglichst einfacher Form darzustellen. Skizzen müssen qualitativ und quantitativ richtig sein.

Abgabetermin: Zu Beginn der nächsten Vorlesung

Aufgabe 1: Linearität von Fourierreihen (Superposition)

Skizzieren Sie den Graphen der $2T_0$ -periodischen Funktion

$$f(x) = \begin{cases} A|x| & (-T_0 < x < 0), \\ 0 & (0 < x < T_0). \end{cases}$$

mit $A \in \mathbb{R}$. Schreiben Sie $f(x)$ als Summe einer geraden und einer ungeraden Funktion und bestimmen Sie deren Fourierreihen. Bestimmen Sie dann damit die reelle Fourierreihe von $f(x)$ durch Superposition.

Lösung:

$$f(x) = \frac{AT_0}{4} + \frac{AT_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k - 1}{\pi k^2} \cos\left(\frac{\pi}{T_0} k x\right) + \frac{(-1)^k}{k} \sin\left(\frac{\pi}{T_0} k x\right)$$

Aufgabe 2: Komplexe Orthogonalitätsrelationen

Formulieren Sie analog zu den (reellen) Orthogonalitätsrelationen aus Kapitel 1.2.1. eine komplexe Orthogonalitätsrelation und leiten Sie damit direkt die Formel für die komplexen Fourierkoeffizienten c_k für

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{i k x}$$

her.

Aufgabe 2: Komplexe Fourierreihe

Gegeben ist die 2π -periodische Funktion

$$f(x) = e^{-x}, \quad \text{für } x \in [0, 2\pi).$$


- Skizzieren Sie diese Funktion im Intervall $[-4\pi, 4\pi]$.
- Berechnen Sie die komplexe Fourier-Reihe.
- Bestimmen Sie die reellen Fourierkoeffizienten a_k, b_k mit Hilfe der komplexen Koeffizienten aus b).
- Welchen Wert nimmt die Fourierreihe an der Stelle $x = 2\pi$ an? *Hinweis:* Skript Seite 6 Kapitel 1.4.1.

Lösung zu b):

$$f(x) = \frac{1 - e^{-2\pi}}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1 - i k}{1 + k^2} e^{i k x}$$

Aufgabe 3: Linearität von Fourierreihen


Gegeben ist der Graph der π -periodischen Funktion $x(t)$:



- Die Funktion $x(t)$ kann als Linearkombination einer Dreiecksfunktion $x_1(t)$ und einer Rechteckschwingung $x_2(t)$ aufgefasst werden, deren reelle Fourier-Reihen in Abb. 1 aufgeführt sind. Formulieren Sie diese Linearkombination, d.h. finden Sie λ_1 und λ_2 so, dass $x(t) = \lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t)$.
- Bestimmen Sie die reelle Fourier-Reihe von $x(t)$ mit Hilfe der Linearität und den tabellierten reellen Fourier-Reihen von $x_1(t)$ und $x_2(t)$.
- Geben Sie die komplexe Fourierreihe an.

Rechteckskurve


$$y(t) = \begin{cases} \hat{y} & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{für } \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{2} + \frac{2\hat{y}}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \cdot \sin(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

Dreieckskurve

$$y(t) = \begin{cases} -\frac{2\hat{y}}{T} t + \hat{y} & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \frac{2\hat{y}}{T} t - \hat{y} & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases} \quad \text{für}$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{2} + \frac{4\hat{y}}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{3^2} \cdot \cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2} \cdot \cos(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

Abbildung 1: Rechtecks- und Dreiecksschwingung (aus Papula)

Viel Spaß!