

Anàlisi multivariant: Exercicis 1.1

Vicent Caselles Ballester

2024-03-02

Exercici 1

Carreguem les dades.

```
data(crabs, package = 'MASS')
```

Mirem els tipus de variables que tenim al dataset.

```
str(crabs)
```

```
## 'data.frame': 200 obs. of 8 variables:
## $ sp : Factor w/ 2 levels "B","O": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ sex : Factor w/ 2 levels "F","M": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ index: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ FL : num 8.1 8.8 9.2 9.6 9.8 10.8 11.1 11.6 11.8 11.8 ...
## $ RW : num 6.7 7.7 7.8 7.9 8 9 9.9 9.1 9.6 10.5 ...
## $ CL : num 16.1 18.1 19 20.1 20.3 23 23.8 24.5 24.2 25.2 ...
## $ CW : num 19 20.8 22.4 23.1 23 26.5 27.1 28.4 27.8 29.3 ...
## $ BD : num 7 7.4 7.7 8.2 8.2 9.8 9.8 10.4 9.7 10.3 ...
```

Veiem que tenim 8 variables, una l'índex de les diferents observacions, així que ens dona poca informació. En podríem prescindir, en la meua opinió. Tenim 5 variables numèriques, dos factors (sexe, l'altra diria que és subespècie – confirmat fent `??crabs`).

Per a trobar les mitjanes, medianes, etc. es pot fer servir la funció `summary`.

```
summary(crabs[unlist(lapply(crabs, is.numeric))])
```

```
##      index      FL      RW      CL      CW
## Min.   : 1.0    Min.   : 7.20  Min.   : 6.50  Min.   :14.70  Min.   :17.10
## 1st Qu.:13.0    1st Qu.:12.90  1st Qu.:11.00  1st Qu.:27.27  1st Qu.:31.50
## Median :25.5    Median :15.55  Median :12.80  Median :32.10  Median :36.80
## Mean   :25.5    Mean   :15.58  Mean   :12.74  Mean   :32.11  Mean   :36.41
## 3rd Qu.:38.0    3rd Qu.:18.05  3rd Qu.:14.30  3rd Qu.:37.23  3rd Qu.:42.00
## Max.   :50.0    Max.   :23.10  Max.   :20.20  Max.   :47.60  Max.   :54.60
##      BD
## Min.   : 6.10
## 1st Qu.:11.40
## Median :13.90
## Mean   :14.03
## 3rd Qu.:16.60
## Max.   :21.60
```

Per a dur a terme el resum d'acord als factors, ho faig amb diferents funcions del paquet `dplyr`.

```
cat("Resum per als crancs blaus i femelles")
```

```
## Resum per als crancs blaus i femelles
```

```
require(dplyr, quietly = TRUE)
```

```
crabs %>%  
  filter(sex == "F",  
         sp == "B") %>%  
  select(FL, RW, CL, CW, BD) %>% summary()
```

```
##           FL           RW           CL           CW  
## Min.      : 7.20   Min.      : 6.50   Min.      :14.70   Min.      :17.10  
## 1st Qu.:11.53   1st Qu.:10.62   1st Qu.:23.93   1st Qu.:27.90  
## Median :13.15   Median :12.20   Median :27.90   Median :32.35  
## Mean    :13.27   Mean    :12.14   Mean    :28.10   Mean    :32.62  
## 3rd Qu.:15.28   3rd Qu.:13.88   3rd Qu.:32.75   3rd Qu.:37.83  
## Max.    :19.20   Max.    :16.90   Max.    :40.90   Max.    :47.90  
##           BD  
## Min.      : 6.10  
## 1st Qu.:10.03  
## Median :11.60  
## Mean    :11.82  
## 3rd Qu.:13.88  
## Max.    :18.10
```

```
cat("Resum per als crancs taronja i femelles")
```

```
## Resum per als crancs taronja i femelles
```

```
require(dplyr)
```

```
crabs %>%  
  filter(sex == "F",  
         sp == "O") %>%  
  select(FL, RW, CL, CW, BD) %>% summary()
```

```
##           FL           RW           CL           CW  
## Min.      :10.70   Min.      : 9.20   Min.      :21.40   Min.      :24.00  
## 1st Qu.:15.60   1st Qu.:13.60   1st Qu.:31.05   1st Qu.:34.88  
## Median :18.00   Median :14.65   Median :34.70   Median :39.55  
## Mean    :17.59   Mean    :14.84   Mean    :34.62   Mean    :39.04  
## 3rd Qu.:19.90   3rd Qu.:16.68   3rd Qu.:39.70   3rd Qu.:44.05  
## Max.    :23.10   Max.    :20.20   Max.    :46.20   Max.    :52.50  
##           BD  
## Min.      : 9.70  
## 1st Qu.:13.80  
## Median :15.65  
## Mean    :15.63  
## 3rd Qu.:17.85  
## Max.    :21.10
```

```
cat("Resum per als crancs blaus i mascles")
```

```
## Resum per als crancs blaus i mascles
```

```
require(dplyr)
```

```
crabs %>%  
  filter(sex == "M",
```

```

      sp == "B") %>%
select(FL, RW, CL, CW, BD) %>% summary()

##           FL           RW           CL           CW
## Min.      : 8.10   Min.      : 6.70   Min.      :16.10   Min.      :19.00
## 1st Qu.:12.65   1st Qu.:10.65   1st Qu.:27.23   1st Qu.:31.52
## Median :15.10   Median :11.70   Median :32.45   Median :37.10
## Mean     :14.84   Mean     :11.72   Mean     :32.01   Mean     :36.81
## 3rd Qu.:17.05   3rd Qu.:13.28   3rd Qu.:37.15   3rd Qu.:42.52
## Max.     :21.30   Max.     :15.80   Max.     :47.10   Max.     :54.60
##           BD
## Min.      : 7.00
## 1st Qu.:11.00
## Median :13.60
## Mean     :13.35
## 3rd Qu.:15.60
## Max.     :20.00

cat("Resum per als crancs taronja i mascles")

## Resum per als crancs taronja i mascles
require(dplyr)
crabs %>%
  filter(sex == "M",
         sp == "O") %>%
  select(FL, RW, CL, CW, BD) %>% summary()

##           FL           RW           CL           CW
## Min.      : 9.10   Min.      : 6.90   Min.      :16.70   Min.      :18.60
## 1st Qu.:14.10   1st Qu.:10.78   1st Qu.:28.75   1st Qu.:31.73
## Median :16.70   Median :12.10   Median :33.35   Median :36.30
## Mean     :16.63   Mean     :12.26   Mean     :33.69   Mean     :37.19
## 3rd Qu.:18.80   3rd Qu.:13.70   3rd Qu.:39.02   3rd Qu.:43.08
## Max.     :23.10   Max.     :16.80   Max.     :47.60   Max.     :52.80
##           BD
## Min.      : 7.40
## 1st Qu.:12.95
## Median :15.00
## Mean     :15.32
## 3rd Qu.:17.77
## Max.     :21.60

No coneixia la funció fivenum. Dóna la següent informació: minimum, lower-hinge, median, upper-hinge,
maximum; d'acord a la documentació.

crabs %>%
  select(FL, RW, CL, CW, BD) %>% lapply(FUN = fivenum)

## $FL
## [1]  7.20 12.90 15.55 18.10 23.10
##
## $RW
## [1]  6.5 11.0 12.8 14.3 20.2
##
## $CL

```

```
## [1] 14.70 27.25 32.10 37.25 47.60
##
## $CW
## [1] 17.1 31.5 36.8 42.0 54.6
##
## $BD
## [1] 6.1 11.4 13.9 16.6 21.6
```

Utilitzo àlgebra lineal per a respondre aquesta pregunta. Aquesta es la matriu per a les dades generals.

```
# src: https://datascienceplus.com/understanding-the-covariance-matrix/
nums = crabs %>%
  select(FL, RW, CL, CW, BD) %>% scale(scale=F) %>% t()
nums %*% t(nums) / (200 - 1)
```

```
##           FL           RW           CL           CW           BD
## FL 12.217297  8.158045 24.35668 26.55080 11.822581
## RW  8.158045  6.622078 16.35466 18.23964  7.836659
## CL 24.356677 16.354662 50.67992 55.76138 23.971389
## CW 26.550801 18.239640 55.76138 61.96768 26.091867
## BD 11.822581  7.836659 23.97139 26.09187 11.729065
```

A continuació faig els càlculs per a cada una de les combinacions entre els dos factors (que cada un té dos nivells).

```
for (s in levels(crabs$sp)){
  for (x in levels(crabs$sex)){
    cat(paste('Showing results for sex', x, 'and sp\n', s, sep = ' '))
    nums = crabs %>%
      filter(sex == x,
             sp == s) %>%
      select(FL, RW, CL, CW, BD) %>%
      scale(scale=F) %>% t()
    n = ncol(nums)
    print(nums %*% t(nums) / (n - 1))
  }
}
```

```
## Showing results for sex F and sp
## B           FL           RW           CL           CW           BD
## FL  6.905408  6.278918 15.47333 17.79808  7.102939
## RW  6.278918  5.947302 14.25319 16.38927  6.555298
## CL 15.473327 14.253188 35.04224 40.21036 16.137927
## CW 17.798082 16.389273 40.21036 46.29084 18.528996
## BD  7.102939  6.555298 16.13793 18.52900  7.576065
## Showing results for sex M and sp
## B           FL           RW           CL           CW           BD
## FL 10.255955  6.543106 23.29552 26.61182 10.170510
## RW  6.543106  4.459057 15.07893 17.26043  6.548061
## CL 23.295522 15.078927 53.41674 60.98231 23.238878
## CW 26.611816 17.260429 60.98231 69.78092 26.588878
## BD 10.170510  6.548061 23.23888 26.58888 10.239286
## Showing results for sex F and sp
## O           FL           RW           CL           CW           BD
## FL  8.844657  6.725527 17.17195 19.25430  8.012033
## RW  6.725527  5.515004 13.39709 15.04582  6.211682
## CL 17.171947 13.397094 34.07253 38.07648 15.908188
```

```
## CW 19.254302 15.045820 38.07648 42.80072 17.763110
## BD 8.012033 6.211682 15.90819 17.76311 7.576914
## Showing results for sex M and sp
## O FL RW CL CW BD
## FL 12.355024 7.598151 26.61889 29.31460 12.324465
## RW 7.598151 4.820771 16.53423 18.23423 7.647053
## CL 26.618890 16.534229 57.93047 63.77230 26.763355
## CW 29.314604 18.234229 63.77230 70.34842 29.488253
## BD 12.324465 7.647053 26.76336 29.48825 12.441045
```

Per a calcular el que es demana a l'últim apartat, itero per les dues espècies i

```
require(knitr)
```

```
## Loading required package: knitr
final_df = data.frame(tr = numeric(),
                      tr_p = numeric(),
                      det = numeric(),
                      dets2 = numeric())
for (s in levels(crabs$sp)){
  nums = crabs %>%
    filter(sp == s) %>%
    select(FL, RW, CL, CW, BD) %>%
    scale(scale=F) %>% t()
  n = ncol(nums)
  sigma = (nums %*% t(nums) / (n - 1))
  trace = sum(diag(sigma))
  tracep = trace/4
  dets = det(sigma)
  dets2 = dets^(1/4)
  row = list(trace, tracep, dets, dets2)
  final_df[nrow(final_df) + 1, ] <- row
}
rownames(final_df) <- levels(crabs$sp)

kable(final_df)
```

	tr	tr_p	det	dets2
B	133.2470	33.31175	0.0770612	0.5268766
O	130.0708	32.51769	0.2457478	0.7040806