


中醫藥二型糖尿病飲食指南。©




如果您像大部份的糖尿病患者一樣，那麼您也需要更好的飲食營養建議。一種更好的飲食習慣可以幫助您控制您的血糖。當您的家人，西醫生，以及中醫師給您不同的飲食營養建議時，您在食物的選擇上可能變得更困難。好消息是，很多您所熟悉的食物，我們的西醫師和中醫師其實都認為對防治您的糖尿病是有利的！因此，本飲食指南將和您一起，幫助您去尋找這些食物。

中醫藥二型糖尿病飲食習慣

現在，您已決定把飲食習慣掌握在自己手中！現在市面上有很多信息告訴您二型糖尿病患者該如何飲食，比如您的醫生和營養師可能會有一種觀點，而您的飲食文化或家人又可能會有另一種觀點。

例如，西醫會說所有的蔬菜都適合糖尿病，而中醫則會說某些蔬菜對於糖尿病患者是否有利取決於患者的體質和糖尿病的類型。在這本書裡，我們會教您哪一些蔬菜是從西醫和中醫的角度而言都對您的情況有利。西醫擔心水果會提高您的血糖，而中醫則會覺得有些水果對您的糖尿病有幫助。在這本書裡，我們建議無論您的情況如何，或即使糖尿病類型不同，都應適量食用的水果。不過當您吃水果的時候，最好食用那些中醫所推薦的，對您糖尿病類型有益的水果。

這本指南是中醫藥專家、西醫藥專家和像您一樣的華人合力編纂的。由於它結合了中醫和西醫的觀點，所以，這些建議可能會同您的藥劑師，中醫師或您的家人的建議有點不同。



用碗的比例去平衡你的飲食習慣



少吃

白飯 或 白/雞蛋/粉麵類


熱辣, 辛辣, 油膩, 全脂, 油炸或重口味的食物

垃圾食品, 巧克力, 薯片, 糖果, 冰淇淋或麵包

酒精類, 水果汁, 冰飲或凍飲, 咖啡或過多咖啡因的食物

少吃鹽, 醬油, 醬汁, 糖或人造糖

使用餐盤比例來均衡你的飲食



少吃

白飯 或 白/雞蛋/粉麵類
熱辣, 辛辣, 油膩, 全脂, 油炸或重口味的食物
垃圾食品, 巧克力, 薯片, 糖果, 冰淇淋或麵包
酒精類, 水果汁, 冰飲或凍飲, 咖啡或過多咖啡因的食物
少吃鹽, 醬油, 醬汁, 糖或人造糖

均衡餐量

若您用碗就餐，那麼
您應該：

2碗蔬菜

1碗碳水化合物

1碗蛋白質

此圖與其他指南中的盤子圖類似，但在碗中盛裝多少取決於您的身材和您平時的運動量，請向醫生或者營養師諮詢您需要攝入多少熱量。




注意：餃子是一半碳水化合物一半蛋白質



中醫症狀中的二型糖尿病

對二型糖尿病的理解，中西醫稍有差異。為了更好地治療您的二型糖尿病，我們會請一位持有中醫牌照的中醫師對您進行醫療詢問，以便診斷出與您本人相符的中醫症狀。

以下描述會有效地幫助您了解一些常見的中醫症狀，因為在中醫角度上，不是所有二型糖尿病患者的治療方法都是一致的。下述症狀中與您情況一致的，我們會有相對應的適合您的飲食建議。注意：這並不是一種中醫診斷，因為只有專業的中醫師才能給出中醫診斷。



藍色營養建議: 清熱營養建議

熱性類型糖尿病患者通常會有下列症狀:

- 過度口渴
- 口乾
- 尿頻



其他症狀可能包括發燒, 疼痛或感染帶有綠色或黃色膿水, 紅眼睛或紅皮膚, 發熱, 以及對酒精或辛辣的食物感到噁心。這通常和早期糖尿病有關, 一般也會跟中醫理論上所說的“肺熱”或“胃熱”一起發生。

黃色營養建議: 清熱或去濕營養建議

熱性或濕型的糖尿病患者通常會有下列症狀:

- 過度口渴或過度飲水
- 過度飢餓, 尤其是飯後
- 腹脹, 尤其是飯後
- 舌頭有層次地佈著黃色黏稠物



根據不同的病情, 某些中醫所述症狀可能跟胃熱或脾胃氣虛有關。這在中醫上對應“胃熱, 脾氣虛, 或肝氣鬱結”症狀。

紅色營養建議: 溫和營養建議

分佈性濕氣性糖尿病患者通常會有下列症狀:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • 尿頻多尿- 或者小便混濁和/或夜尿次數增加 | • 腰背和膝蓋酸痛 |
| • 口渴 | • 瘋癩 |
| • 面容發黑 | • 疲勞或昏睡 |
| • 頭暈或眩暈 | • 性無能或早洩 |
| • 耳鳴 | |



其他症狀或包括反胃, 糞便黏稠或沾有油脂黏液和/或臉色蒼白, 情緒低落, 思維遲鈍, 情感冷淡, 容易出汗, 牙齒脫落, 體重降低和免疫力低下。這在中醫上對應“脾氣虛或有濕氣”和/或“腎陰虛”症狀。

純熱氣性糖尿病型

藍色營養建議：清熱營養建議



	多吃	少吃
蔬菜 佔碗的一半份量	涼, 中性, 補腎的蔬菜: 牛油果, 青瓜, 海藻, 西葫蘆, 白木, 雲耳, 木耳, 冬菇, 豆芽, 杞子, 紅蘿蔔, 紅菜頭, 番茄, 牛皮菜, 茄子, 蘑菇, 意大利青瓜, 西洋菜, 大白菜品種, 豆芽, 竹筍, 白菜品種, 甜椒, 薄荷, 洋薊, 花菜, 豬乸菜, 茭蒿, 絲瓜, 芥蘭, 馬蹄, 皇帝菜, 牛皮菜, 銀杏, 瓢瓜, 秋葵, 番薯苗, 芥白, 豆苗, 合掌瓜, 毛瓜	溫和的蔬菜: 羅勒, 小椰菜, 椰菜, 辣椒, 韭菜花 品種, 芫茜, 椰子, 白蘿蔔, 茴香, 蒜頭, 薑, 羽衣甘藍, 韭菜, 生菜, 芥蘭品種, 洋蔥品種, 蘿蔔, 牛皮菜, 蔥, 蔥頭, 潼菜, 芋艿
蛋白質 佔碗的四分之一份量	海鮮: 蠔, 沙丁魚, 白魚 一些肉: 雞肉, 瘦鴨肉, 豬肉 其他蛋白質: 雞蛋和豆腐 果仁: 開心果 低脂肪羊芝士	紅肉 牛奶芝士
碳水化合物 佔碗的四分之一份量	全穀類: 大麥, 小米, 糙米, 全麥蕎麥 豆和澱粉類蔬菜: 番薯, 茄子, 馬鈴薯, 芋頭, 蓮藕, 百合, 粟米, 青豆, 胡豆, 鷹嘴豆, 菜豆, 大豆, 紅小豆, 利馬豆, 綠豆, 南瓜, 豆角, 地瓜, 蕎米, 小扁豆 一些水果: 梨的品種, 葡萄, 柚子, 山楂, 檸檬, 青檸, 石榴, 野果 適量的豆漿或低脂肪羊奶的產品	白米 或 白麵 減低白米用量, 煮飯或煲粥時可加入其他粗糧穀物。 盡量少吃粉麵類和全蛋麵
其他食物	湯: 以肉湯為主, 澱粉類蔬菜不宜過多 茶: 菊花, 蒲公英 山芋/甘薯/紅薯麵 由於這些麵不會令您的血糖升高, 所以它是最好的麵食替代品。	辛辣, 油膩, 肥膩, 油炸和重口味的食物: 蔥油餅 肉煎餅, 油條, 零食: 巧克力, 薯片, 糖果, 雪糕, 甜點, 含酒精飲料, 果汁, 凍飲, 咖啡 以及咖啡因含量高的飲料, 鹽, 醬油, 調味醬汁, 糖或其他甜味劑

熱或濕氣性糖尿病型



黃色營養建議：清熱或去濕營養建議

	多吃	少吃
蔬菜 佔碗的一半份量	中性和涼性的蔬菜： 青瓜, 蘆筍, 生菜品種, 菠菜品種, 西芹品種, 蘿蔔, 白蘿蔔品種, 蘑菇品種, 苦瓜, 蒲公英, 西蘭花, 大頭菜, 通菜, 塗菇菜, 油菜品種, 大白菜品種, 竹筍, 白菜品種, 甜椒, 薄荷, 朝鮮薊, 花椰菜, 豬乸菜, 茭蒿, 絲瓜, 芥蘭, 皇帝菜, 紅蘿蔔, 牛皮菜, 銀杏, 瓢瓜, 秋葵, 番薯苗, 芥白, 豆苗, 合掌瓜, 毛瓜	溫和或濕氣的蔬菜： 羅勒, 豆芽, 甜菜, 小椰菜, 椰菜, 辣椒, 韭菜花品種, 芫茜, 椰子, 茄子, 茴香, 蒜頭, 薑, 羽衣甘藍, 韭菜, 芥蘭品種, 洋蔥品種, 蘿蔔, 牛皮菜, 蔥, 海藻, 蔥頭, 芋艿, 蕃茄
蛋白質 佔碗的四分之一份量	海鮮：蛤蜊, 魚 一些肉：雞, 瘦鴨肉, 豬肉 低脂肪羊芝士	紅肉 豆腐 牛奶芝士
碳水化合物 佔碗的四分之一份量	全穀類：糙米, 小米, 粥跟黑芝麻, 潼菜, 黎麥 豆和澱粉類蔬菜：大豆, 黑豆, 紅小豆, 綠豆, 蕎蕎甘藍, 冬瓜, 牛蒡, 蕎蕎, 南瓜, 蕎米, 小扁豆, 豌豆, 豆角 水果：西瓜 低脂肪羊奶品 另他：黑芝麻種子	白米 或 白麵 減低白米用量, 煮飯或煲粥時可加入其它粗糧穀物。盡量少吃粉麵類和全蛋麵 馬鈴薯, 番薯, 地瓜 牛奶
其他食物	湯：以肉湯為主, 澱粉類蔬菜不宜過多 茶：菊花茶, 蒲公英茶, 綠茶, 金銀花茶, 薄荷茶 山芋/甘薯/紅薯麵 由於這些麵不會令您的血糖升高, 所以它是最好的麵食替代品。	辛辣, 油膩, 肥膩, 油炸和重口味的食物：蔥油餅 肉煎餅, 油條 零食：巧克力, 薯片, 糖果, 雪糕, 甜點 含酒精飲料, 果汁, 凍飲, 咖啡 和 咖啡因含量高的飲料 鹽, 醬油, 調味醬汁 糖或其他甜味劑

濕或弱氣性糖尿病型

紅色營養建議：溫和營養建議



	多吃	少吃
蔬菜 佔碗的一半份量	<p>溫和及中性蔬菜:</p> <p>羅勒, 小椰菜, 卷菜心, 辣椒, 韭菜品種, 芫茜, 茴香, 蒜頭, 薑, 羽衣甘藍, 韭菜, 芥蘭品種, 洋蔥品種, 蔥, 蔥頭, 荷蘭豆, 甜豆, 芋艿, 椰子, 紅蘿蔔, 牛皮菜, 銀杏, 瓢瓜, 秋葵, 番薯苗, 荸白, 豆苗, 合掌瓜, 節瓜/毛瓜</p>	<p>涼或濕氣的蔬菜:</p> <p>莧菜, 洋薊, 蘆筍, 牛油果, 竹筍, 甜菜, 豆芽, 甜椒, 苦瓜(單獨吃), 雲耳, 白菜, 西蘭花, 花菜, 芹菜, 皮菜, 豬乸菜, 皇帝菜, 節瓜, 蘿蔔品種, 蒲公英蔬菜, 矮瓜, 芥蘭, 杞子, 金銀花, 生菜品種, 蘑菇, 薄荷, 大白菜品種, 蘿蔔, 海苔, 絲瓜, 潁菜, 西葫蘆, 堆菇菜, 蕃茄, 茄蒿, 馬蹄, 西洋菜, 白木耳, 木耳, 油菜品種, 意大利青瓜</p>
蛋白質 佔碗的四分之一份量	<p>海鮮: 鰻魚, 海參, 蚌, 吞拿魚</p> <p>一些肉: 豬肉, 雞, 瘦鴨肉, 羊肉</p> <p>胡桃果仁: 核桃, 杏仁, 花生, 松子, 葵花籽</p>	<p>過多紅肉 (牛肉或羊肉)</p> <p>豆腐</p> <p>奶製品, 芝士</p>
碳水化合物 佔碗的四分之一份量	<p>全穀類: 糙米, 蕎, 黍麥, 全燕麥</p> <p>豆和澱粉類蔬菜:</p> <p>豌豆, 黑豆, 小扁豆, 番薯, 地瓜, 冬瓜, 大頭菜, 防風草, 豆角, 紅小豆</p> <p>甜度較低的水果: 檸檬, 石榴</p>	<p>白米或白麵</p> <p>減低白米用量, 烹飯或煲粥時可加入其它粗糧穀物。盡量少吃粉麵類和全蛋麵</p> <p>大麥, 玉米, 小米, 綠豆, 黃豆, 小麥</p> <p>涼氣的水果: 柑桔類 (柚子, 檸檬, 橙, 柚子), 梨, 西瓜</p>
其他食物	<p>湯: 以肉湯為主, 澱粉類蔬菜不宜過多 砂仁, 草果, 小豆蔻, 丁香, 肉豆蔻/肉蔻, 薑黃, 黑胡椒, 薑, 咖哩 山芋/甘薯/紅薯麵 由於這些麵不會令您的血糖升高, 所以它是最好的麵食替代品。</p> <p>醋</p>	<p>辛辣, 油膩, 肥膩, 油炸和重口味的食物: 蔥油餅 肉煎餅, 油條, 零食: 巧克力, 薯片, 糖果, 雪糕, 甜點, 含酒精飲料, 果汁, 凍飲, 咖啡 和咖啡因含量高的飲料, 鹽, 醬油, 調味醬汁</p> <p>糖或其他甜味劑</p>

在外面吃飯時的秘訣

您在外面吃的飯菜



您應該吃的飯菜



當您在外面吃飯時，請叫額外的蔬菜或低脂肪蛋白質食物。把這些額外的食物加在您的飯或麵中，用以平衡您的飲食。把吃剩的帶回家，再吃一餐。



對所有其他二型糖尿病的建議

吃飯時間

- 每天吃飯的時間都要一樣
- 在早上七點至十一點之間吃一餐熱的飯菜
- 全天的碳水化合物攝入量要平衡
- 除非醫生建議之外，避免吃宵夜



吃飯的部份

- 不要暴食
- 注意您吃飯菜的頻率(以及裝飯加飯的頻率)，尤其是碳水化合物
- 在第二次添飯前等幾分鐘，您可能就會發現其實您的肚子沒那麼餓
- 吃飯時用小碗，不用大碗



煮飯時

- 用蒸代替炒
- 用芥花籽油或橄欖油代替其他油



請按照季節來吃食物

- 傳統中醫學注重季節，請你多吃當季的蔬菜和水果



運動

- 差不多每天做輕微的活動，比如步行，氣功，游泳，太極或柔和的瑜伽
- 柔和運動會讓您的心臟保持律動正常，但不宜太劇烈



中藥

- 如果您現在有吃中藥，請告訴您的醫生



其他秘訣



早餐時一定要吃一些蛋白質。比較容易和快捷的方法是：加一顆蛋，或從剩菜中攝入有蛋白質的食物。另外，因為不需要烹煮，所以吃剩的蔬菜也是很方便快捷的早餐。

小吃：一小份含蛋白質的水果，例如核桃。

注意：這算是碳水化合物的一部分



替代醬油和其他調味料



對於紅色營養建議，醋是替代醬油的好選擇

對於黃色和藍色營養建議，則用檸檬汁替代醬油



如何閱讀營養標籤

Nutrition Facts	
份量/ 湯匙 / (18g)	
份量約/ 4	
Amount Per Serving	
Calories 25 Fat Cal/ 15	
% Daily Value	
Total Fat / 1.5g	2%
Sat Fat / 0g	0%
Trans Fat / 0g	
Cholest / 0 mg	0%
Sodium / 133 mg	6%
碳水化合物 / 2g	1%
食物纖維 / 1g	
糖 / 1g	
Proteins / 1g	
Vitamin A 4%	Vitamin C 0%
Calcium 2%	Iron 4%
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.	

一次吃多少? 一份。

一包中有多少份量?
四份

碳水化合物包括糖和
食物纖維。

食物纖維是很好的碳
水化合物, 我們建議您
多吃一些。

糖是在碳水化合物中不
是一個好的選擇。我們
建議您少吃一些。當比
較兩個營養標籤時, 選
擇含糖量較少的標籤。

碳水化合物的秘訣



不喜歡糙米？首先，浸泡糙米三十分鐘。然後將半糙米，半白米混合在您的電飯煲裡。浸泡會令糙米更加柔軟。

湯是一種平衡飲食的健康餐。注意：湯麵中的麵不可超過湯麵的四分之一。



一種很好麵食替代品是日本白瀧或甘薯麵。它是甘薯做成的麵條。您可以放在湯裡試試！豆腐麵條也是個好選擇。但對於紅色營養建議，則要小心，因為豆腐是非常寒涼！



“我聽說這些對治療糖尿病效果很好！”

茶和飲料

喝清茶。甜的或奶茶會提高您的血糖，避免有珍珠的奶茶，他們會提高您的血糖。茶一般是涼性的，但即使您患有寒或濕氣性糖尿病，它也不會對您身體有害。紅茶比綠茶或茉莉花茶更具暖性，避免喝果汁，避免加糖飲料。如果您想喝低糖飲料，請選擇加了甜菊糖的飲料。




苦瓜

在中醫和西醫裡，由於苦瓜可以降低您的血糖，所以它對糖尿病是有利的。但是也不宜吃太多。如果您正在使用紅色營養建議，我們會建議在餐前熱一下苦瓜，加大蒜和生薑一起煮一下。

南瓜

很多中國人認為南瓜對糖尿病有利。南瓜澱粉值很高，所以請適量食用。這可能對藍色和黃色營養建議的人最有幫助。



玉米鬚

玉米鬚(茶)也許會,或也許不會對糖尿病有利,請適度飲用。



粉絲和米粉

粉絲和米粉跟普通麵條有同樣的碳水化合物

糖尿病是無法被徹底治療好的

但良好的飲食習慣,適量的運動和些許的藥物醫療對治療糖尿病是有好處的。

瘦的人也會患糖尿病

雖然減輕體重通常會對糖尿病有利,但由於瘦的人也會患有糖尿病,所以依然需要平衡他們的飲食。

對於清熱營養建議 (藍色), 這些蔬菜, 吃多點
 Eat More of these Vegetables for Clear Heat (Blue) Diet

 洋薊, 朝鮮薊 Artichoke	 牛油果, 酪梨, 鱷梨; 肥仔膏 Avocado	 竹筍 Bamboo Shoots	 豆芽, 大豆芽 Bean sprouts	 紅菜頭, 甜菜 Beet Root
 甜椒 Bell/Sweet Pepper	 雲耳 Black Fungus	 白菜仔心 Baby Bok Choy	 菜心, 白菜芯 Choy Sum	 花菜, 花椰菜 Cauliflower
 豬乸菜 Collard Greens	 茼蒿, 皇帝菜 Tung Ho, Crown Daisy	 青瓜, 黃瓜 Cucumber	 中國茄子, 茄瓜, 矮瓜 Eggplant	 芥蘭 Mustard Greens, Gai Lan
 杞子, 枸杞子 Goji Berry, Gokei	 薄荷 Mint	 蘑菇 Mushroom	 大白菜, 黃牙白, 紹菜 Napa Cabbage	 海草, 海苔, 海藻 Seaweed
 青江菜 Shanghai Bok Choy	 冬菇, 香菇 Shitake Mushroom	 絲瓜 Si/Sing Gwa, Sponge Gourd, Chinese Okra	 西葫蘆 Summer Squash	 蕃茄 Tomato
 馬蹄 Water Chestnut	 西洋菜 Watercress	 銀耳, 白木耳 White Fungus/Jelly, Silver Ear	 木耳 Wood Ear Mushrooms	 意大利瓜, 意大利青瓜 Zucchini

對於清熱營養建議 (藍色)而言算碳水化合物的蔬菜
Vegetables that Count as Carbohydrates for Clear Heat (Blue) Diet



注意：這只是針對您熟悉的不同糖尿病症狀所提供的膳食建議。中國傳統醫學具有其複雜多變性，因而沒有絕對的教條來衡量哪種蔬菜應只能多吃或少吃。

對於清熱或去濕營養建議(黃色), 這些蔬菜, 吃多點

Eat More of these Vegetables for Clear Heat/Dry Damp (Yellow) Diet

 洋薊, 朝鮮薊 Artichoke	 竹筍 Bamboo Shoots	 甜椒 Bell/Sweet Pepper	 苦瓜, 涼瓜, 莴苣 Bitter Melon	 白菜品種 Bok Choy Varieties
 西蘭花 Broccoli	 花菜, 花椰菜 Cauliflower	 西芹, 芹菜 Celery	 唐芹, 中國芹菜 Wild/Chinese celery	 豬乸菜 Collard Greens
 茼蒿, 皇帝菜 Tung Ho, Crown Daisy	 青瓜, 黃瓜 Cucumber	 白蘿蔔, 蘿蔔 Daikon	 韓國蘿蔔 Korean Daikon	 青蘿蔔 Green Daikon
 大頭菜, 咔嘞頭, 茄藍 Kohlrabi	 生菜 Lettuce	 A菜, 萵苣 Chinese Lettuce	 薄荷 Mint	 蘑菇 Mushroom
 芥蘭 Mustard Greens, Gai Lan	 大白菜, 黃牙白, 紹菜 Napa Cabbage	 娃娃菜 Baby (Napa) Cabbage	 絲瓜 Si/Sing Gwa, Sponge Gourd, Chinese Okra	 菠菜 Spinach
 塌菇菜, 塌棵菜 Taku Choy, Tatsoi	 馬蹄 Water Chestnut	 西洋菜 Watercress	 油菜 Yau Choy	 蘆筍 Asparagus

對於清熱或去濕營養建議(黃色), 這些蔬菜, 吃多點
 Eat More of these Vegetables for Clear Heat/Dry Damp (Yellow) Diet



對於清熱或去濕營養建議 (黃色)而言算碳水化合物的蔬菜
 Vegetables that Count as Carbohydrates for Clear Heat/Dry Damp (Yellow) Diet



注意: 這只是針對您熟悉的不同糖尿病症狀所提供的膳食建議。中國傳統醫學具有其複雜多變性, 因而沒有絕對的教條來衡量哪種蔬菜應只能多吃或少吃

對於溫和營養建議(紅色), 這些蔬菜, 吃多點

Eat More of these Vegetables for Warming (Red) Diet

 羅勒 Sweet/ Italian Basil	 九層塔, 紫蘇; 紫蘇屬 Thai Basil	 韭菜花,韭菜蕾 Chive Flowers	 韭黃 Yellow Chives	 韭菜 Gai Choy, Garlic Chives, Chinese Leek
 球芽甘藍,小椰菜 Brussel Sprouts	 椰菜,包心菜 Cabbage	 紫菜苔,紅椰菜 Purple Cabbage	 芫茜,香菜 Cilantro, Coriander, Chinese Parsley	 椰子 Coconut
 辣椒 Chilli Pepper	 指天椒 Thai Chili	 蒜頭 Garlic	 薑 Ginger	 羽衣甘藍 Kale
 洋蔥(棕,紅,白) Onion	 蔥 Green Onion, Scallion	 芥蘭 Mustard Greens, Gai Lan	 芥蘭仔 Baby Mustard Greens	 大芥菜 Large Mustard Greens
 蔥頭,香蔥頭 Shallot	 芋艿 Taro Stem			

對於溫和營養建議 (紅色) 而言算碳水化合物的蔬菜 Vegetables that Count as Carbohydrates for Warming (Red) Diet



對於溫和營養 (紅色) 香料的建議 Spices for Warming (Red) Diet



注意：這是只針對您熟悉的不同糖尿病症狀所提供的膳食建議。中國傳統醫學具有其複雜多變性，因而沒有絕對的教條去衡量哪種蔬菜只能多吃或只能少吃。

對所有症狀有利的中性食物

Neutral Foods Good for All Conditions

 瓠瓜 Opo, Gourd, Bottle Gourd	 茭白 Cane Shoots	 紅蘿蔔 Carrot	 合掌瓜, 佛手瓜 Chayote, Alligator Pear	 節瓜, 毛瓜 Fuzzy Gourd/ Melon, Hairy Cucumber
 銀杏 Ginkgo	 豆苗 Pea Sprouts/ Shoots	 大豆苗 Large Pea Sprouts/ Shoots	 牛皮菜, 紅牛皮菜 Rainbow Chard	 荷蘭豆 Snow Peas
 甜豆 (Sugar) Snap Peas,	 番薯苗 Yam Leaves, Yam Sprouts	 秋葵, 羊角豆 Okra, Lady's Fingers		

對所有症狀而言算碳水化合物的中性蔬菜

Neutral Vegetables for All Conditions that Count as Carbohydrates



注意：這只是針對您熟悉的不同糖尿病症狀所提供的膳食建議。中國傳統醫學具有其複雜多變性，因而沒有絕對的教條來衡量哪種蔬菜應只能多吃或少吃。

This diet guide is brought to you by:

這個飲食指南是由以下機構帶給您的：



Center for Vulnerable Populations
At San Francisco General Hospital and Trauma Center



UNIVERSITY OF
SAN FRANCISCO