

GESTIÓN ÉTICA DE COLONIAS FELINAS: MÉTODO CER 3.0

Introducción

La sociedad cada vez es más sensible en cuanto a la protección del medioambiente y los seres vivos. Así lo respaldan diversos tipos de manifiestos y normativas europeas y autonómicas, entre otras. Pero, sin duda, el mayor avance en los últimos tiempos ha sido la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, de ámbito nacional. Gracias a ella, miles de animales en este país están ahora más protegidos, aunque por desgracia se aprobó algunas carencias.

Además, todos sabemos que las mejoras en materia de leyes que han supuesto grandes avances sociales han llegado casi siempre de la mano de los movimientos sociales y la presión ciudadana. Una sociedad más íntegra e igualitaria pasa por respetar y proteger a aquellos seres vivos vulnerables o desamparados, que además se ven directa e indirectamente perjudicados por actividades humanas.

Para muchas personas la protección animal significa cuidar especies protegidas y mascotas. Sin embargo, la protección animal engloba muchos otros animales y se relaciona con otros ámbitos, como la economía, la política y la salud pública, entre otros, y con nuestro propio futuro como especie. Por ejemplo, al igual que los veterinarios reivindican el concepto *One Health*, es decir, que la salud humana está íntimamente relacionada con la salud animal, algo similar ocurre con el bienestar y la protección de los animales y del medio ambiente; no tiene sentido gestionarlos de forma independiente, ya que nunca debemos olvidar la transversalidad; todo está interrelacionado.

Gestión de colonias felinas


Hace siglos que los gatos conviven con nosotros. Se cree que su domesticación empezó en el neolítico cuando se encontraron los primeros esqueletos de gatos en asentamientos humanos. Por eso, desde entonces, los hemos visto desde siempre con nosotros en pueblos y, cada vez más, en ciudades.

Los gatos comunitarios solían pasar desapercibidos para la población. Además, se les veía como una herramienta útil para mantener controlados o alejados a otros animales considerados perjudiciales para las personas y/o sus recursos. Sin embargo, en los últimos años debido al rápido crecimiento de su población, ha aumentado su visibilidad y con ello los problemas de convivencia y las quejas.

Esta sobrepoblación sin gestionar es lo que se conoce como **colonias descontroladas**. Existen colonias en las que puede haber más de 30 individuos, cuando lo ideal es que una colonia esté formada por un máximo de 10, dependiendo del espacio y los recursos disponibles para su supervivencia.

Pero ¿a qué se debe esta superpoblación? En ello intervienen tres factores: la propia naturaleza de estos animales, ya que los felinos son bastante prolíficos y adaptables al entorno, la **irresponsabilidad de ciertas personas** y la reacción tardía e insuficiente por parte de las instituciones en cuanto a la prevención de este problema y su gestión. Pero sin duda, el origen de este descontrol se debe a que todavía hay dueños inmorales que siguen abandonando en la calle a sus gatos o las camadas no deseadas, se les siguen perdiendo por no proteger su entorno y continúan dejando salir a sus gatos sin castrar, sin vigilar y, además, sin identificar, perpetuando así otro gran lastre en la conciencia colectiva: la impunidad.

Por eso, esta Asociación pretende ayudar a la administración y la población mediante la **concienciación, el fomento de la adopción y la tenencia responsable** y la **gestión ética y efectiva de colonias felinas** como objetivos principales.



Clasificación de los gatos domésticos

La clasificación más extendida es la que elaboró la protectora americana Alley Cats Allies. Esta clasificación tiene en cuenta **el hábitat y socialización** de los felinos con los seres humanos. De esta forma, dividen a los gatos domésticos de la siguiente manera:

- **Indoor e Indoor/Outdoor.** Dependen de una casa.
 - *Indoor* (caseros) si habitan en una casa todo el tiempo.
 - *Indoor/Outdoor* (paseantes o merodeadores) si viven en una casa, pero salen de ella puntualmente.
- **Stray y Feral.** No dependen de una casa. Debido a la traducción, su significado no es igual al nuestro.
 - *Stray* (~~callejeros~~ = perdidos/extraviados y abandonados) si han vivido en una casa antes de acabar en la calle. Normalmente fallecen si no se les rescata en poco tiempo. Algunos consiguen sobrevivir y adaptarse, pasando a ser considerados también como comunitarios.
 - *Feral* (~~ferales~~ = comunitarios) si han nacido en calle; no conocen una casa.

Los gatos **caseros y paseantes** tienen una esperanza de vida de 20 años, aunque la de los paseantes es menor ya que sus vidas corren más peligros en el exterior. Tienen un aspecto saludable, limpio, rondan su peso ideal o sufren sobrepeso, en ocasiones llevan collares y algunos se muestran mansos con las personas, aunque su comportamiento es variable según la situación o la persona con la que interactúe.

Bastantes gatos que vemos en las calles inicialmente fueron gatos caseros que por diversas razones acabaron fuera de sus hogares, es decir, son **gatos perdidos/extraviados**, o peor, **gatos abandonados**. Estos gatos tienen muy poca esperanza de vida —seis meses de media—, porque no están preparados para la dura vida en la calle. Tienen que esquivar atropellos, perros, encontrar comida, etc. Algunos incluso se deprimen, lo que provoca que dejen de comer y mueran poco después. Si se rescata a estos gatos pueden volver a adaptarse a un hogar. Si no, los pocos que sobreviven, tras un tiempo se les puede considerar gatos comunitarios, ya que apenas vuelven a socializar con humanos.

Por último, los mal llamados *ferales* por la traducción, en los países hispanohablantes serían los felinos considerados como **comunitarios** propiamente dicho, y son los descendientes de gatos que malviven en las calles de nuestras ciudades, ya sean perdidos o abandonados.


Estos animales, nacidos en la calle, apenas tienen contacto con las personas, en todo caso, tan sólo el mínimo imprescindible para su supervivencia, por lo que no se acercan ni se dejan acariciar por las personas, salvo por sus gestoras, y no siempre. Son temerosos, huidizos y desconfiados. Por estas razones, estos gatos no se suelen adaptar a una casa, aunque como en todo, puede haber excepciones.

La esperanza de vida de estos animales suele ser corta, alrededor de los 6 años, pero con ayuda humana pueden llegar a 10 o 12 años en colonias relativamente seguras. Por eso lo más importante es cuidarlos y proteger el lugar que ya consideran su territorio, su hogar.

Por lo tanto, las formas más comunes con las que debemos llamar a los **gatos comunitarios** son:

- ✓ **Adecuados:** gato urbano, gato libre o de vida libre, gato libre no socializado, gato de colonia.
- ✗ **No adecuados:** gato callejero, gato errante, gato asilvestrado o silvestre, gato feral, gato cimarrón.

TIPOS DE GATOS Y ACTUACIÓN SEGÚN SU SOCIALIZACIÓN



¿Qué es el CER?

Los gatos comunitarios son animales territoriales e independientes, pero tienden a formar colonias por cuestión de alimento, cobijo y parentesco. Estas colonias suelen organizarse mediante una **jerarquía matriarcal compleja**.




Como en la actualidad apenas existe suficiente alimento para ellos en las ciudades, suelen depender de una o varias personas. Por ello, hay gestoras que establecen los conocidos «**puntos de alimentación**», en los que se colocan tolvas y recipientes para pienso seco y agua limpia.

Pero alimentar una colonia sin controlar su población crea o agrava el problema de la sobrepoblación. Hace años esto se “solucionaba” con el sacrificio; una medida cruel, injusta e ineficaz. La eliminación de una colonia felina genera el efecto conocido como «**nicho vacío**», es decir, aparecen gatos de otros territorios adyacentes para recolonizar el territorio liberado. También, en ocasiones, se han intentado llevar a cabo reubicaciones de colonias. Pero al igual que con el sacrificio, esta medida también suele ser un completo fracaso, además de compleja. En palabras de expertos: «**la mejor reubicación es aquella que no se hace**». Esta actuación solo debe realizarse cuando ya no queda ninguna otra opción viable, como, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una gran demolición o una nueva construcción sin ningún lugar cercano donde puedan reubicarse los gatos por sí mismos, con ayuda del traslado gradual del punto de alimentación.

Ahora, por suerte para todos, existen alternativas como **el método C.E.R.**, acrónimo de Capturar, Esterilizar y Retornar a los gatos en su colonia.

La castración es una operación quirúrgica que consiste en la extirpación de las glándulas genitales en machos (**orquiectomía**) y la extirpación de los ovarios y el útero en hembras (**ovariohisterectomía**).




Terminológicamente, la esterilización consistiría literalmente en impedir la reproducción volviendo estéril al sujeto, que suele conseguirse cuando se utilizan técnicas sencillas como la vasectomía en machos y la ligadura de trompas en hembras, sin extracción de órganos de los aparatos sexuales.

Sin embargo, en países anglosajones, de dónde procede toda esta nomenclatura, con ambos términos se refieren a **gonadectomías** (extirpación de los órganos reproductivos), pero con distinción de sexo. Es decir, utilizan el término *spay* = esterilizar, para referirse a la ovariectomía (abrev. OHE) de las hembras, y *neuter* = castración, para la orquiectomía (abrev. ORQ) de los machos.

Por esto, aunque lo más adecuado en lugares hispanohablantes sería utilizar el término castración, en diferentes documentos científicos se utilizan ambos términos para referirse a lo mismo.

Sobre lo que no cabe duda, es que la orquiectomía y la ovariectomía son los métodos elegidos por la mayoría de los veterinarios para el control poblacional animal.

Después, una vez castrados, estos animales regresan a su territorio **marcados en una oreja** para así poder identificarlos visualmente y no volver a capturarlos innecesariamente. Este método ha demostrado ser altamente eficaz para controlar la población y, además, mejorar su calidad de vida, su relación con el entorno y la convivencia con las personas.



En las colonias donde se alcanza más del 90% de individuos esterilizados, su censo desciende, y entre el 70 y 90 % el censo se estabiliza y se considera que están en buenas condiciones.

Estado de la colonia felina	% Esterilizados	Censo (Nº individuos)
Controlada	>90%	Disminuye
Estable	70-75 al 90%	Estable
En vías de estabilización	50 al 70-75%	Aumento controlado
Inicio del programa	1 al 50%	Aumento descontrolado
Descontrolada	0%	Aumento descontrolado

Sin embargo, es importante mencionar que el método CER ya no sólo consiste en castrar; el **CER 3.0** incluye desparasitar interna y externamente, vacunar de trivalente e identificar a los gatos mediante microchip a nombre de la administración, aprovechando la sedación y anestesia de la operación. Así también se previenen parasitosis, enfermedades y contagios, y se puede llevar una buena trazabilidad y seguimientos de los animales, entre otras ventajas.

El ciclo reproductivo de las gatas

Las hembras felinas tienen varias peculiaridades reproductivas que no se dan en hembras de otras especies, tal y como se podría pensar.

La gestación de las gatas, período que se extiende desde la fecundación del óvulo hasta el parto, dura de 64 a 69 días; son **poliétricas estacionales de días largos**, es decir, que una sola puede tener varios celos al año, prioritariamente en primavera y otoño (más luz y temperaturas cálidas, sin ser extremas), y con cada camada suelen nacer 4 cachorros de media, por lo que el crecimiento puede ser exponencial. Para mayor preocupación, a esto hay que añadir que el celo cada vez comienza antes, incluso en época invernal, y a edades cada vez más tempranas; unos 4 meses.

Además, son de **ovulación inducida**, a diferencia de la perra, la vaca o la yegua, que son ovuladoras espontáneas. Es decir, las gatas necesitan un estímulo para producir la ovulación, y este estímulo solo se produce si tiene lugar la cópula, o, lo que es lo mismo, cuando un gato monta a una gata, hay casi un 100% de probabilidades de que ésta se quede preñada, ya que ovula justo en el momento preciso.

Por si esto fuera poco, en la gata también pueden ocurrir dos fenómenos reproductivos característicos en las gatas, la **superfecundación**, por el cual distintos óvulos pueden ser fecundados en un mismo período ovulatorio, y la **superfetación**, por el que puede ocurrir otra fecundación durante el primer mes de gestación de una monta anterior, coexistiendo fetos de diferentes edades (aunque normalmente los fetos más tempranos suelen fallecer por maceración fetal).

- **Orquiectomía (ORQ).** Para la castración de los machos, siempre es necesario extirpar por completo ambos testículos, para que terminen con su función hormonal y así las conductas sexuales asociadas que se pretenden evitar, aunque conviene señalar que en algunos animales la conducta puede continuar durante algunas semanas o incluso algún mes después de la castración (esperma residual), y en un porcentaje muy, muy pequeño, no desaparecerán.

Varios estudios veterinarios muestran que **la desaparición del comportamiento agresivo entre machos, la reducción del vagabundeo y la desaparición del marcaje con orina es, mínimo, de un 85 %**. Cabe destacar que el marcaje de los machos con orines es especialmente fuerte debido a la felinina, una feromona que usan para marcar de forma inequívoca su territorio.

En cuanto a la salud de los propios gatos, la castración reduce la aparición de procesos relativamente frecuentes como la hiperplasia quística benigna de próstata, hernias perianales, cuadros de hiperestrogenismo, incremento de niveles de testosterona y evita tumores testiculares.

- **Ovariohisterectomía (OHE):** para la castración de las hembras, además de extirpar ambos ovarios, que son los que generan su función hormonal, también es adecuado extirpar el útero.

En cuanto al comportamiento hormonal, con la castración dejan de ocurrir las vocalizaciones producidas durante el proestro y el estro, que pueden durar en total de 1 a 2 semanas, y posibles marcajes sexuales con orina, aunque suelen ser poco frecuentes. También en estas etapas las gatas suelen ser más cariñosas, pueden frotar la cabeza y cuello contra objetos, y rodar por el suelo.

Pero, sin duda, los mayores de los beneficios de la castración en hembras se refieren a su salud.

Las gatas enteras (sin castrar), tienen **7 veces más riesgo de desarrollar tumores mamarios felinos (TMF)** que las castradas, los cuales, a su vez, suelen ser **malignos en un 90%** aprox. de los casos. Así, el riesgo de padecer TMF disminuye un 91% si se esterilizan antes de los 6 meses de edad, un 86% si se operan alrededor del año, y tan sólo un 11% si se realiza a los 2 años.

También se evita la **piometra** (infección del útero), que, si no se trata rápidamente, produce la muerte del animal, los tumores de útero y ovarios, y mejoran algunos trastornos endocrinos como la diabetes mellitus y el hiperestrogenismo, patologías sistémicas como la epilepsia y algunas dermatosis. Por último, se evita el riesgo de sufrir **mastitis** (inflamación del tejido mamario, que puede derivar en infección) al no tener camadas o las **pseudogestaciones** (embarazos psicológicos, aunque son poco frecuentes en gatas).

Cabe destacar que la histerectomía, remoción del útero, pero no de los ovarios, impide la reproducción, pero no la ovulación, ni por tanto los riesgos de salud mencionados ni las manifestaciones del celo.



Beneficios del método CER

Si bien es cierto que los beneficios de los programas CER suelen notarse sobre todo a medio y largo plazo, también hay ciertas ventajas que se aprecian desde el inicio. En general, este método:

1. Evita las molestias acústicas para los vecinos causadas por las peleas, principalmente de los machos, y de los celos, sobre todo de las gatas.
2. Disminuye el merodeo (desplazamientos) de los felinos; los gatos pasan más desapercibidos.
3. Mejora las condiciones de salubridad y estéticas del entorno. Con puntos de alimentación higiénicos y autorizados, se evitan malos olores, suciedad y dispersión de basuras, entre otros.
4. Disminuye la aparición de excrementos y orines en zonas arenosas, como en zonas infantiles.
5. Disminuye el peligro de accidentes de tráfico por el cruce de gatos, para personas y felinos.
6. Ahorro de recursos públicos: menos quejas (y menos burocracia); menos avisos e intervenciones policiales, menor saturación del Centro de Protección Animal (CPA), etc.
7. Mejora la imagen y la reputación de la ciudad: disminuyen los gatos enfermos, heridos y fallecidos en vía pública.
8. Aumenta el bienestar, la empatía y la concienciación social. Una convivencia respetuosa entre fauna urbana y personas genera valores positivos en la ciudadanía.
9. La presencia de gatos comunitarios en jardines de hospitales beneficia el comportamiento, el ánimo y la recuperación de pacientes, sobre todo psiquiátricos.

Medidas complementarias al método CER

A pesar del éxito de muchos programas CER, no todas las colonias se consiguen mantener siempre controladas de forma estable, debido a la llegada de nuevos individuos desconocidos y sin esterilizar. Estos gatos pueden proceder de otras colonias en proceso de control o sin controlar; sin embargo, como se ha visto anteriormente, el gran problema es el incesante abandono de gatos y los gatos caseros cuya familia humana no cumple con la tenencia responsable.

Para conseguir que el programa CER sea efectivo a largo plazo, la administración puede y debe implantar otras valiosas medidas basadas en la **concienciación** ciudadana. Es decir, fomentar la empatía y responsabilidad en el cuidado y respeto hacia los animales. Esto se puede conseguir mediante jornadas y campañas de concienciación como:

- Campañas económicas de esterilización de gatos caseros del propio municipio para evitar camadas no deseadas.
- Campañas económicas de identificación de gatos caseros para que, en caso de pérdida o extravío, el retorno a su hogar sea lo más rápido posible.
- Campañas de difusión para el fomento de adopción responsable frente a compra, por ejemplo, con cartelería en mobiliario urbano de la ciudad.
- Promover el contacto con animales. Por ejemplo, informar sobre lo que consiste en ser una casa de acogida temporal de un gato, asimilando así la responsabilidad que implica tener un animal en casa, pero sin la obligación de adoptarlo en ese momento.
- Información mediante folletos y redes sociales municipales sobre los cuidados necesarios de los gatos y su tenencia responsable, con el fin de prevenir posibles problemas de convivencia, evitando los frecuentes abandonos por problemas de comportamiento, por ejemplo.
- Jornadas de visitas al Centro de Protección Animal (o similar), para que los vecinos puedan conocer directamente a los animales y las condiciones en las que viven fuera de un hogar, a pesar de lo bien cuidados que estén.
- Charlas en colegios y talleres educativos en la ciudad, por ejemplo, sobre protección en ventanas y terrazas, enriquecimiento ambiental, etc.

Por último, pero no por ello menos importante, es **dar a conocer las leyes y otras normativas y sancionar cuando corresponda** a las personas que ejercen una tenencia irresponsable de gatos, sobre todo en casos graves y/o reincidentes.

Antecedentes y ejemplos

El programa CER, **recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el único método eficaz**, ya está funcionando en muchos países de todo el mundo desde hace décadas, incluido en nuestro entorno europeo.

La primera persona documentada en la implantación del método CER (en inglés, TNR: Trap – Neuter - Return) fue la activista británica Ruth Plant, pionera en el bienestar animal, ya que, entre otras propuestas, promovió este sistema de control de colonias felinas en el **Reino Unido** durante la búsqueda de una solución a la preocupante sobrepoblación de gatos surgida tras la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50.

Después de esta puesta en marcha, este método se extendió y se empezó a implantar como alternativa humanitaria a la eutanasia desde finales de 1970 en adelante, e incluso el ámbito académico se interesó por este método, gracias a la conferencia científica sobre «La ecología y el control de los gatos callejeros» en Londres, y a la Federación de Universidades para el Bienestar Animal (UFAW), que publicó los estudios presentados en dicha conferencia.

Simultáneamente, en 1976 nació en **París** la asociación École du Chat (Escuela del Gato), cuyo objetivo era la integración y control de los gatos vagabundos en su territorio de nacimiento. Años después, en 1992, el Ayuntamiento de París llevó a cabo una prueba piloto en uno de los distritos, tras lo cual, sólo 5 años después, más de 45 departamentos franceses habían puesto en marcha campañas de esterilización similares con ayuda de entidades como La Fondation Brigitte Bardot, y la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal (ADDA) de Francia.

En **EE. UU.**, algunas entidades comenzaron a utilizar este método en la década de los 60, pero el éxito comenzó claramente en 1996 en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Diego (California).

En este país hoy día también se están realizando campañas impresionantes por medio de asociaciones a favor de la esterilización de los animales sin o con dueño. Entre ellas caben destacar a la Alley Cat Allies (ACA), organización sin ánimo de lucro fundada en 1990 en Maryland (estado adyacente a Washington D.C.), basada en la exitosa experiencia de Inglaterra, y a la Neighborhood Cats, con sede en Nueva York. Estas organizaciones realizan y asisten en programas TNR de en diversos puntos de EE. UU. Además, ofrecen muchísima información y herramientas para el control humanitario de colonias felinas en todo el mundo.

Pero, sin duda, una de las ciudades más conocidas, si no la que más, por la idílica convivencia entre felinos y vecinos, es **Roma**. Los felinos que viven en el Coliseo, los Foros o la Pirámide de Cestio son de sobra conocidos por los turistas. En esta ciudad los más de 120.000 gatos han sido declarados como “patrimonio biocultural”, convirtiéndose en un bien tutelado y reconocidos como un bien propio de la “Ciudad Eterna” por su valor educativo, social y turístico.

Incluso, en ciudades y países considerados del tercer mundo, se realizan significativas campañas de castración como por ejemplo en **Lamú** (isla al Noreste de Kenia), con sus poco más de 12.000 habitantes, y que se han ido extendiendo desde los 90 a otros lugares como la isla de Faza, Sierra Leona, Isla Mauricio, Granada, etc., a través de un programa denominado “Pet Respect”, con clínicas móviles pertenecientes a la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA).

Otros lugares internacionales donde también está implantado el método CER/TNR son **Alemania, Bélgica, Holanda, Japón y Canadá**.

Aquí, en **España**, las ciudades pioneras en aplicar el método CER con éxito probado, fueron Barcelona en 2.003, junto con una ordenanza modélica; Gijón (Asturias), en 2.005, y Zaragoza en 2.012, aunque fue en la localidad de la Costa Brava de Anpuriabrava (Girona) la primera que puso en marcha un programa serio de esterilización, con resultados óptimos, gracias a la iniciativa de unos residentes. Después les siguieron la Comunidad Valenciana, País Vasco, Baleares, Madrid, etc.

Hoy en día, los mejores ejemplos de una “**Gestión 3.0**” de colonias felinas, son las que llevan a cabo los ayuntamientos de Yecla (Murcia), Albarracín (Teruel) y, sin duda, Córdoba (Andalucía).

En **Córdoba**, el éxito del programa CER se ha divulgado en numerosos medios informativos. Gracias a un convenio de colaboración entre el ayuntamiento a través de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), el Colegio de Veterinarios de Córdoba y la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac), en los 2 años tras el comienzo de su aplicación en octubre de 2020, han conseguido esterilizar a 2.680 gatos de 118 colonias. De estas, 73 están controladas al 100%, otras 27 lo están a más del 90%, y otras 17 están por encima del 80% de control.

En este admirable programa CER, incluyen la desparasitación, identificación con microchip a nombre del Ayto., y la vacunación de trivalente y rabia de los felinos, recuperan a enfermos y heridos antes de su retorno, y entregan en adopción responsable los adultos sociables y cachorros en la medida de lo posible, aunque a estos últimos como es de esperar, cada vez es más difícil encontrarlos por sus calles.

Ayudas actuales en España

La Dirección General de los Derechos de los Animales, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recientemente ha puesto a disposición información, herramientas y subvenciones para facilitar, fomentar y apoyar esta forma de control poblacional a las distintas administraciones locales, así como a entidades de Protección Animal.

También existen otras ayudas a nivel autonómico, tanto para programas CER como para la creación, mejora y mantenimientos de los Centros de Protección Animales, como en la Comunidad de Madrid, que cada año ofrece subvenciones a Ayuntamientos desde 2017.

Por último, los veterinarios del Grupo de Especialidad de Medicina Felina (GEMFE) de la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales (AVEPA) también han tendido su mano a todas las ciudades que quieran poner en marcha un programa CER en España, con el objetivo de fomentar el control poblacional ético pero sin olvidar la importancia de hacer las operaciones de la forma más rápida, segura y menos traumática para los gatos.

Metodología

Para el desarrollo del programa CER hay que llevar a cabo las siguientes acciones:

- Recopilación de información y planificación: censos, mapeo, gestoras.
- Comunicación con alimentadoras y gestoras de la zona, así como información a mancomunidades de vecinos, polígonos, centros educativos, etc.
- Gestión del material de captura necesario, traslados y clínicas colaboradoras.
- Recuperación de heridos y enfermos no sociables antes del retorno a la colonia.
- Acogida y entrega en adopción responsable de cachorros o adultos sociables.
- Devolución o denuncia por abandono, según las circunstancias.
- Concienciación y mediación con los vecinos en las zonas de actuación.
- Financiación para el desarrollo del proyecto: socios, madrinas/padrinos, donantes, subvenciones locales, autonómicos y/o nacionales, eventos, herencias, patrocinadores, etc.

Material y métodos de captura

Aunque existen numerosos métodos de captura, nosotros nos hemos especializado en el empleo de la sacadera de peces, llamado comúnmente «**caza**». Sus ventajas son obvias: rapidez y efectividad.

Si tenemos en cuenta que el material de captura y los voluntarios encargados de su manejo son los aspectos más importantes de un programa CER, con nuestra experiencia podemos garantizar la implantación de este método de forma exitosa y eficaz.

De todas maneras, según la situación valoramos cada caso para adaptarnos a la actuación más conveniente, ya que la elección del material de captura también dependerá del animal, el número de personas disponibles y el entorno. Los métodos de captura existentes son:

- Transportín
- Jaula trampa: modo automático y modo selectivo
- Jaula trampa *drop-trap* o multicaptura (“freidora”)
- Sacaderas para peces o redes de pesca con mango telescópico (cazas) y redes
- Cepo de aves modificada (“empanadilla”)

Transportín

Ya sea para capturar el gato o simplemente para retenerlo y transportarlo una vez capturado con otro método, el transportín suele ser un elemento indispensable en las capturas. Es importante que sea rígido y tenga un buen cierre.

Suele ser especialmente útil para capturas de cachorros y gatos muy confiados. Se puede poner cebo oloroso dentro y cerrar rápidamente la puerta, o coger el animal a mano (con guante es más seguro, aunque a veces resta sensibilidad y movilidad) desde la nuca e introducirlo de culo al transportín, en posición vertical. Tras ello, siempre es conveniente tapar con una tela de forma que las cuatro esquinas se anuden por arriba, de dos a dos entre esquinas opuestas.

También hay una variante de este método, con ayuda de un caza-saco, que se explica más adelante.



Jaulas trampa


Sin duda, el material más común para las capturas es la jaula trampa. Se puede utilizar de dos maneras. La primera, de forma **no selectiva (automática)**, es decir, captura al primer gato que entra y pisa el mecanismo de cierre. La segunda, de forma **selectiva (manual)**, de esta forma la persona que captura cierra la jaula con la ayuda de algún mecanismo a distancia, ya sea una cuerda atada a un palo o a la propia jaula o un dispositivo electrónico. Esta segunda es útil en colonias donde ya hay gatos castrados o cachorros que no se desea capturar. Es importante tener una tela a mano para tapar la jaula cuando se capture el animal.



Uno de los inconvenientes de las jaulas es que cuando se cierran asustan a los gatos cercanos, que se vuelven recelosos de acercarse a ellas, dificultando su captura. Esto se traduce en que el control de la colonia felina tiende a complicarse y alargarse en el tiempo.

Sin embargo, son fáciles de utilizar y actúan como contenedor del animal para poder transportarlo, ya sea a la clínica veterinaria o donde corresponda, aunque siempre se recomienda colocar bridas en la puerta o puertas para mayor seguridad.

Las jaulas deben tener unas medidas adecuadas, ya que a veces hay machos de gran tamaño, pero también las hay más pequeñas, preparadas para cachorros o sitios estrechos, y con doble entrada, plegables o no, con puertas de guillotina, etc.



Multicaptura

Es una jaula sin suelo y cuadrada, de 1x1m y 35cm de alto, formada por dos piezas plegables: una que conforma las paredes, y otra, el techo que se sujeta a las paredes por medio de ganchos. En un lado tiene una puerta tipo guillotina que es por donde se irá traspasando el gato o gatos hacia otro contenedor. Se pueden capturar varios gatos a la vez.



En otro lateral hay un asa larga que es por donde se levanta y apoya la jaula. Ahí es donde se ata la cuerda de la que hay que tirar cuando los gatos están comiendo en su interior, asegurando que tienen todo el cuerpo y la cola dentro. Una vez que se tira de la cuerda, la jaula cae rápidamente por gravedad.

Cabe destacar que los gatos pueden llegar a desplazarla, por lo que es importante darse prisa en pisar el techo o poner peso encima, taparla con una tela grande para que se calmen, y no colocarla cerca de agujeros en el suelo, ya que podrían escapar por ahí. Además, si hay cachorros en la colonia, conviene poner otra malla con agujeros más pequeños, ya que caben entre los barrotes, o peor aún, pueden quedar con la cabeza atrapada.

Cazas y redes

Son similares a los cazamariposas, pero más grandes y robustos, con todo el borde de metal y con mangos telescópicos retráctiles, aunque también los hay más pequeños y triangulares, que pueden utilizarse con cachorros.

Para personas poco ágiles o sin experiencia, suelen ser complicados de usar con éxito, salvo con gatos muy confiados o débiles. Hay que acercarse bastante, sin que el gato se percate, y después lanzárselo rápidamente con puntería. Suele ser conveniente que haya otra persona, y si es de su confianza mejor, como la alimentadora habitual, para distraerle y relajarle.



Una vez que el gato está atrapado en el caza, éste se pone contra el suelo pisando con ambos pies el borde de metal, para después agarrarle de la nuca o meter el caza-saco por debajo para traspasarlo a un transportín o jaula.




Este método tiene varias ventajas, como su rapidez y discreción ante otros gatos de la zona. De ahí nuestra preferencia y especialización en su manejo. Con este método la colonia se controla en unos tiempos menores con todo lo que eso implica, como el ahorro de recursos personales y económicos.

En ocasiones también sirve de ayuda utilizar un caza modificado al que se conoce como **caza-saco o caza-tubo**, para traspasar a los gatos a un transportín o similar de forma segura.



Los cazas son realmente útiles, ya que además llegan a sitios inaccesibles con otros materiales de captura, ya sea por distancia u obstáculos. Por ejemplo, caben entre las rejillas de muchos recintos donde no hay acceso y no cabe otro material.

También se pueden utilizar **redes** como apoyo a los cazas para cerrar zonas de escape y en rescates de gatos escondidos en vehículos.



Empanadilla

Es un cebo de aves modificado, formado por una estructura rígida metálica y una red resistente. Se tira de una cuerda para que el cebo se cierre, atrapando al animal que se encuentra dentro comiendo el cebo. Doblada mide aprox. 1,20 x 0,50 m, y extendida, por tanto, unos 1,20 x 1,10 m.

En terrenos naturales se sujeta mediante piquetas y en terrenos asfaltados, mediante pesas de unos 10 Kg. (una en cada lateral).



Una vez que el gato está atrapado en la red, se introduce por debajo un caza o caza-saco para después pasarlo a un transportín o jaula.


Hay que tener cuidado con este método de captura, ya que, debido a su fuerza y rapidez al cerrarse, el gato puede sufrir graves daños si se falla o utiliza incorrectamente, y hay que comprobar que no haya agujeros en la red, ya que el gato podría escapar. Por eso este método tan sólo suele utilizarse en gatos muy desconfiados, urgentes, y/o que ya se han capturado anteriormente con otros métodos que ya no funcionan con él.

La ventaja de este método es que puede pasar casi totalmente desapercibido si se camufla, e incluso, aunque se note su presencia, da mucha más confianza a los gatos puesto que no se sienten atrapados en un armazón como ocurre con las jaulas.



Normativa aplicable

La **Cat Classification Task Force (CCTF)**, grupo de especialistas en gatos de la **International Union for Conservation of Nature (IUCN)**, revisa la taxonomía de los gatos cada 5 años para mantenerla actualizada con base a los avances científicos. Según esta clasificación, el gato como especie está considerado como animal doméstico, y por ello nunca puede ser tratado como un animal salvaje, asilvestrado o silvestre, de ahí la importancia de la terminología. Esto no quiere decir que todo individuo de esta especie esté socializado con las personas, ya que las especies no se clasifican únicamente según la conducta o carácter. Esto es muy importante de cara al tipo de protección jurídica que poseen.



Especies y subespecies de felinos no extintos en la actualidad

Así pues, como especie doméstica están amparados en el ámbito nacional por la **Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales**, de aplicación desde el 29 de septiembre del mismo año. Entre las obligaciones que impone a las personas titulares está la de identificar mediante microchip y esterilizar quirúrgicamente a todos los gatos antes de los seis meses de edad (art. 26.i), salvo los inscritos como reproductores a nombre de un criador registrado. **Y en materia de colonias felinas, sus artículos 38 a 42** establecen el método CER como sistema de gestión, obligan a identificar y esterilizar a los gatos comunitarios y reparten las funciones entre ayuntamientos y comunidades autónomas.

En el ámbito penal, la **Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, reformó el Código Penal** en materia de maltrato animal. Creó un título propio —**el Título XVI bis, con los artículos 340 bis, 340 ter, 340 quater y 340 quinquies**— y derogó el anterior artículo 337. Se consideran delito el maltrato que cause la muerte o lesiones graves, el maltrato cruel con independencia de que haya o no lesiones, la explotación sexual y el abandono. La reforma amplió además la protección a cualquier animal vertebrado, y no solo a los domésticos o que conviven con personas.

Por su parte, la **Ley 17/2021, de 15 de diciembre, modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria (art. 611) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 605)**, con aplicación desde el 5 de enero de 2022. Gracias a ella los animales dejaron de tratarse como simples «cosas». Los artículos que conviene citar son estos, en su redacción literal:

- Art. 333: «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. También pueden ser objeto de apropiación los animales, con las limitaciones que se establezcan en las leyes.»
- Art. 333 bis.1: «Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección.»
- Art. 333 bis.2: «El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser sintiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie...»
- Art. 333 bis.3: «Los gastos destinados a la curación y al cuidado de un animal herido o abandonado son recuperables por quien los haya pagado mediante el ejercicio de acción de repetición contra el propietario del animal... aun cuando hayan sido superiores al valor económico de éste.»

Además, estos animales también están amparados por la **Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid**, que insta a las administraciones a su adecuada gestión y, si es posible, en colaboración con entidades de protección animal. A los efectos de esta ley son animales de compañía todos los perros y gatos, independientemente del fin para el que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos de ocio o deporte; y según su art. 11, serán obligatoriamente identificados mediante microchip los perros, gatos, hurones, conejos y équidos, en un plazo de tres meses desde el nacimiento o de uno desde su adquisición.

Conviene saber, además, que la Ley 7/2023 no partió de cero. Varias comunidades autónomas ya regulaban las colonias felinas y el método CER años antes, con distinto grado de exigibilidad. Según

la recopilación normativa que incluye el propio Plan de Acción 2026-2030 de la Dirección General de Derechos de los Animales, el recorrido es este:

- Asturias abrió camino con la Ley 13/2002.
- Ceuta fue la primera en usar la terminología CER/TNR en una norma española, con el Reglamento 2/2015, avalado por el Dictamen del Consejo de Estado nº 865/2014.
- Después llegaron Madrid (Ley 4/2016), Galicia (Ley 4/2017), Murcia (Ley 6/2017), La Rioja (Ley 6/2018, posteriormente derogada), Castilla-La Mancha (Ley 7/2020), País Vasco (Ley 9/2022) y la Comunidad Valenciana (Ley 2/2023).
- Navarra, con la Ley 19/2019, fue la primera en establecer una obligación real y exigible, y no solo declarativa.

Como precedente internacional, Italia protegió legalmente las colonias felinas ya en 1991, con la Legge 281/1991.

Esto tiene una utilidad práctica: si un ayuntamiento alega que la normativa es demasiado reciente o que necesita plazo para adaptarse, en la Comunidad de Madrid la obligación autonómica existe desde 2016, siete años antes de la ley estatal.

Por último, cada vez más ayuntamientos se adhieren al denominado **Manifiesto Felino**, presentado en abril de 2015 en el Congreso de los Diputados durante el Primer Foro Parlamentario sobre la Protección Felina. La **Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA)** presentó dicho Manifiesto, un documento avalado por expertos europeos y redactado con vocación de ser clave en la orientación hacia una coexistencia ética y satisfactoria entre la ciudadanía y las poblaciones felinas.

Fuentes y enlaces de interés

<https://www.avepa.org/index.php/63-grupos/172-gemfe-presentacion>

<https://avatma.org/category/estudios-cientificos-e-informes/gatos/>

<http://otravetemirada.blogspot.com>

<https://www.alleycat.org>

<http://www.thecatgroup.org.uk>

<https://www.catvets.com/guidelines/practice-guidelines>

<https://www.portalveterinaria.com>

<http://www.vetmedicineespanol.com.mx/>

<https://www.fdcats.com/herramientas/>