

Laborator 6: Puncte de echilibru. Stabilitate

În cadrul acestui laborator sunt prezentate instrucțiunile necesare studiului calitativ al soluțiilor în jurul punctelor de echilibru în cazul ecuațiilor scalare autonome și a sistemelor planare de ecuații autonome.

Ecuații scalare autonome

Ecuațiile scalare autonome sunt de forma:

$$x' = f(x)$$

Se considera ecuația autonomă

$$x' = x(1 - x^2)$$

```
> with(DEtools): with(plots):
```

construim funcția din membrul drept:

```
> f:=x->x*(1-x^2);
```

$$f := x \rightarrow x(1 - x^2)$$

```
> ec:=diff(x(t),t)=f(x(t));
```

$$ec := \frac{d}{dt} x(t) = x(t)(1 - x(t)^2)$$

Punctele de echilibru sunt soluțiile reale ale ecuației

$$f(x) = 0$$

```
> pct_ech:=solve(f(x)=0,x);
```

$$pct_ech := 0, 1, -1$$

Pentru studiul stabilității sunt două metode, fie aplicăm Teorema stabilității în prima aproximație, fie prin metoda grafică (analiza portretului fazic).

1. Aplicarea Teoremei stabilității în prima aproximație - se evaluează f' în punctele de echilibru

```
> pct_ech[1];
```

$$0$$

```
> D(f)(pct_ech[1]);
```

$$1$$

Observăm că $f'(0) = 1 > 0$, deci punctul de echilibru 0 este **instabil**.

În mod analog procedăm și în cazul celorlalte puncte de echilibru:

```
> D(f)(pct_ech[2]);
```

$$-2$$

```
> D(f)(pct_ech[3]);
```


$$-2$$

Observăm că $f'(1) = f'(-1) = -2 < 0$, deci punctele de echilibru 1 și -1 sunt **local asimptotic stabile**.

2. Metoda grafica (analiza portretului fazic)

În cazul ecuațiilor scalare autonome MAPLE nu are o comandă de generare a portretului fazic, stabilitatea soluțiilor de echilibru se face prin analizarea câmpului de direcții și reprezentarea grafică a soluțiilor reprezentative utilizând comanda **DEplot**. În cazul ecuației noastre soluțiile reprezentative sunt soluțiile ce satisfac condiții inițiale în 0 mai mici decât -1, soluții ce satisfac condiții inițiale în 0 cuprinse între -1 și 0, soluții ce satisfac condiții inițiale în 0 cuprinse între 0 și 1, soluții ce satisfac condiții inițiale în 0 mai mari decât 1:

```
> DEplot(ec,x(t), t=-2..2,  
[ [x(0)=-3], [x(0)=-2], [x(0)=-1], [x(0)=-1/2], [x(0)=-1/3], [x(0)=0],  
[x(0)=1/3], [x(0)=1/2], [x(0)=1], [x(0)=2], [x(0)=3]] );
```



Sisteme liniare

Se considera sistemul liniar de două ecuații diferențiale:

$$x' = x + y$$

$$y' = x - y$$

Sistemul dat se introduce definind cele două ecuații prin intermediul procedurii **diff**

```
> restart;  
> with(DEtools): with(plots):with(linalg):  
> ec1:=diff(x(t),t)=x(t)+y(t);
```

$$ec1 := \frac{d}{dt} x(t) = x(t) + y(t)$$

```
> ec2:=diff(y(t),t)=x(t)-y(t);
```

$$ec2 := \frac{d}{dt} y(t) = x(t) - y(t)$$

```
> sist:=ec1,ec2;
```

$$sist := \frac{d}{dt} x(t) = x(t) + y(t), \frac{d}{dt} y(t) = x(t) - y(t)$$

Construim matricea sistemului după care calculăm valorile proprii corespunzătoare:

```
> A:=matrix([[1,1],[1,-1]]);
```

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

> **eigenvals(A) ;**

$$\sqrt{2}, -\sqrt{2}$$

Cum prima valoare proprie este strict pozitiva iar a doua este strict negativa atunci punctul de echilibru (0,0) este punct de echilibru **instabil de tip sa**.


Pentru vizualizarea dinamicii generate de acest sistem se reprezinta protretul fazic impreuna cu cateva orbite utilizand comanda **DEplot**

>

cond_in2:=[x(0)=0,y(0)=i]\$i=1..5,[x(0)=-i,y(0)=0]\$i=1..5,[x(0)=0,y(0)=-i]\$i=1..5,[x(0)=i,y(0)=0]\$i=1..5;

cond_in2 := [x(0) = 0, y(0) = 1], [x(0) = 0, y(0) = 2], [x(0) = 0, y(0) = 3], [x(0) = 0, y(0) = 4], [x(0) = 0, y(0) = 5], [x(0) = -1, y(0) = 0], [x(0) = -2, y(0) = 0], [x(0) = -3, y(0) = 0], [x(0) = -4, y(0) = 0], [x(0) = -5, y(0) = 0], [x(0) = 0, y(0) = -1], [x(0) = 0, y(0) = -2], [x(0) = 0, y(0) = -3], [x(0) = 0, y(0) = -4], [x(0) = 0, y(0) = -5], [x(0) = 1, y(0) = 0], [x(0) = 2, y(0) = 0], [x(0) = 3, y(0) = 0], [x(0) = 4, y(0) = 0], [x(0) = 5, y(0) = 0]

> **DEplot([sist],[x(t),y(t)],t=-5..5,x=-6..6,y=-6..6,[cond_in2],arrows=medium, linecolor=blue,stepsize=0.1);**



Sisteme neliniare. Stabilitatea punctelor de echilibru

Sa consideram urmatorul sistem neliniar:

$$\begin{aligned} x' &= x \left(1 - \frac{x}{2} - y \right) \\ y' &= y \left(x - 1 - \frac{y}{2} \right) \end{aligned}$$

Pentru determinarea punctelor de echilibru definim functiile din membrul drept al fiecărei ecuatii

> **f1:=(x,y)->x*(1-x/2-y) ;**

$$f1 := (x,y) \rightarrow x \left(1 - \frac{1}{2} x - y \right)$$

> **f2:=(x,y)->y*(x-1-y/2) ;**

$$f2 := (x,y) \rightarrow y \left(x - 1 - \frac{1}{2} y \right)$$

> **ec1:=diff(x(t),t)=f1(x(t),y(t)) ;**

$$ec1 := \frac{d}{dt} x(t) = x(t) \left(1 - \frac{1}{2} x(t) - y(t) \right)$$

> **ec2:=diff(y(t),t)=f2(x(t),y(t)) ;**

$$ec2 := \frac{d}{dt} y(t) = y(t) \left(x(t) - 1 - \frac{1}{2} y(t) \right)$$

> **sist2:=ec1,ec2;**

$$sist2 := \frac{d}{dt} x(t) = x(t) \left(1 - \frac{1}{2} x(t) - y(t) \right), \frac{d}{dt} y(t) = y(t) \left(x(t) - 1 - \frac{1}{2} y(t) \right)$$

Punctele de echilibru sunt solutiile reale ale sistemului

$$f1(x,y) = 0$$

$$f2(x,y) = 0$$

> **PctEch:=solve({f1(x,y)=0,f2(x,y)=0},{x,y}) ;**

$$PctEch := \{x=0, y=0\}, \{x=0, y=-2\}, \{x=2, y=0\}, \left\{x=\frac{6}{5}, y=\frac{2}{5}\right\}$$

Se observa ca acest sistem are patru puncte de echilibru. Pentru studiul stabilitatii acestora trebuiesc determinate valorile proprii ale jacobianului calculat in aceste puncte de echilibru.

> **PctEch[1,1];PctEch[1,2] ;**

$$x=0$$

$$y=0$$

> **J:=jacobian([f1(x,y),f2(x,y)],[x,y]) ;**

$$J := \begin{bmatrix} 1-x-y & -x \\ y & x-1-y \end{bmatrix}$$

Matricea sistemului liniarizat pentru punctul de echilibru (0,0) este::

> **A1:=subs(PctEch[1,1],PctEch[1,2],eval(J)) ;**

$$A1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

> **eigenvals(A1) ;**

$$1, -1$$

Cum prima valoare proprie este 1 iar a doua este -1 atunci punctul de echilibru (0,0) este punct de echilibru **instabil de tip sa**.

Procedam similar pentru celelalte puncte de echilibru.

> **PctEch[2,1];PctEch[2,2] ;**

$$x=0$$

$$y=-2$$

> A2:=subs (PctEch[2,1],PctEch[2,2],eval(J));

$$A2 := \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

> eigenvals(A2);

3,1

In acest caz punctul de echilibru (0,-2) este un punct de echilibru **instabil de tip nod**.

> PctEch[3,1];PctEch[3,2];

$$x=2$$

$$y=0$$

> A3:=subs (PctEch[3,1],PctEch[3,2],eval(J));

$$A3 := \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

> eigenvals(A3);

-1,1

Si in acest caz punctul de echilibru (0,-2) este un punct de echilibru **instabil de tip sa**.

> PctEch[4,1];PctEch[4,2];

$$x = \frac{6}{5}$$

$$y = \frac{2}{5}$$

> A4:=subs (PctEch[4,1],PctEch[4,2],eval(J));

$$A4 := \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

> eigenvals(A4);

$$-\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\sqrt{11}, -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i\sqrt{11}$$

In acest caz avem valori proprii complexe conjugate a caror parte reala este -2/5, deci punctul de echilibru (6/5,2/5) este un punct de echilibru **asimptotic stabil de tip focus**.

Pentru reprezentarea portretului fazic trebuie aleasa o fereastră ce contine toate punctele de echilibru, in cazul acestui exemplu putem alege **x=-3..3, y=-3..3**, si apoi fixata o lista de conditii pentru a reprezenta cateva orbite.

>

condin:=[x(0)=-1,y(0)=1],[x(0)=-0.5,y(0)=1],[x(0)=1,y(0)=1],[x(0)=1,y(0)=3],[x(0)=2,y(0)=0.5],[x(0)=-1,y(0)=-1],[x(0)=-0.5,y(0)=-1],[x(0)=-1,y(0)=-2.5],[x(0)=1,y(0)=-1],[x(0)=1.5,y(0)=-1],[x(0)=1,y(0)=-2.5];

condin:=[x(0)=-1,y(0)=1],[x(0)=-0.5,y(0)=1],[x(0)=1,y(0)=1],[x(0)=1,y(0)=3],[x(0)=2,y(0)=0.5],[x(0)=-1,y(0)=-1],[x(0)=-0.5,y(0)=-1],[x(0)=-1,y(0)=-2.5],[x(0)=1,y(0)=-1],[x(0)=1.5,y(0)=-1],[x(0)=1,y(0)=-2.5]

```
> DEplot([sist2],[x(t),y(t)],t=-10..10,x=-3..3,y=-3..3,
[condin],linecolor=blue,stepsize=0.1);
```

