**INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA**
**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA**
**RETIRO DE CORONA**

**Fecha:** _____ **Hora:** _____

Yo _____ identificado con ___ N°_____ en calidad de paciente o como responsable del paciente _____ identificado con___ número_____ autorizo a IECO S.A y al equipo odontológico que ésta disponga para realizar el siguiente tratamiento: _____

El (La) Dr.(a). _____ me ha explicado en forma suficiente y adecuada en qué consiste el tratamiento y me ha indicado así mismo cuáles son: beneficios, riesgos, alternativas, implicaciones del acto asistencial que pueden presentarse, y me ha permitido hacer las preguntas necesarias las cuales se me han respondido en forma satisfactoria. Me ha señalado como los riesgos más comunes y frecuentes del tratamiento.

- **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:**

Retirar una corona protésica previamente cementada sobre un diente natural o un implante, según corresponda, con el propósito de evaluar las condiciones de la restauración, los tejidos dentales y las estructuras de soporte, facilitar el acceso al diente o pilar protésico y permitir la realización de tratamientos adicionales o la elaboración de una nueva rehabilitación oral. El retiro podrá realizarse mediante técnicas e instrumental odontológico específico, de acuerdo con el tipo de corona, el material de fabricación, el sistema de cementación y las condiciones clínicas del caso. Dependiendo de la situación, podrá ser posible retirar la corona de forma conservadora o será necesario seccionarla, desgastarla o destruirla parcialmente para permitir su extracción. Una vez retirada, se evaluará el estado de la corona, del diente o pilar, del muñón, de la restauración subyacente y de los tejidos circundantes. Posteriormente, se determinará la necesidad de realizar procedimientos complementarios, restauraciones provisionales, ajustes o la fabricación de una nueva prótesis.

- **BENEFICIOS**:

Permite acceder a las estructuras dentales o protésicas subyacentes para evaluar su estado clínico, identificar posibles filtraciones, caries, fracturas, alteraciones de la cementación o problemas en los tejidos de soporte. Facilita la realización de tratamientos restauradores, endodónticos o periodontales cuando estén indicados, así como la corrección o sustitución de una corona desadaptada, deteriorada o fracturada. Además, contribuye a establecer un diagnóstico más preciso y a planificar una rehabilitación oral que favorezca la función masticatoria, la adaptación protésica y la estética dental, según las necesidades del paciente.

- **RIESGOS**:

Durante el procedimiento pueden presentarse sensibilidad dental, dolor o incomodidad durante la manipulación, irritación o inflamación de los tejidos gingivales, sangrado leve y molestias posteriores. Existe riesgo de fractura, fisura o desprendimiento de fragmentos de la corona, así como de daño accidental en la estructura del diente, el muñón, una reconstrucción previa o el material restaurador subyacente. En dientes previamente debilitados, con grandes restauraciones, tratamiento endodóntico o pérdida importante de estructura dental, puede aumentar el riesgo de fractura o de que se evidencie un daño preexistente que comprometa su pronóstico. También puede presentarse desprendimiento de restauraciones, exposición de dentina o de tejidos previamente cubiertos, sensibilidad al frío, al calor o a la presión, y necesidad de tratamientos adicionales. La corona retirada puede sufrir daños irreversibles, especialmente cuando sea necesario seccionarla o desgastarla, por lo que no se garantiza su reutilización. Una vez retirada, pueden identificarse caries, fracturas, filtraciones u otras alteraciones que no eran visibles previamente y que requieran modificar el plan de tratamiento.

- **ALTERNATIVAS.**

Mantener la corona existente cuando las condiciones clínicas lo permitan, realizar reparaciones o ajustes si son viables, intentar el

- **IMPLICACION DEL ACTO ASISTENCIAL:**

Se presenta vibración, presión, ruido del instrumental rotatorio, incomodidad por la manipulación de la pieza dental y los tejidos circundantes, sensibilidad dental, dolor

retiro mediante una técnica conservadora cuando esté indicada o considerar la sustitución de la corona por una nueva restauración. También podrá evaluarse la remisión a otra área odontológica según los hallazgos clínicos. El paciente puede optar por aplazar o no realizar el procedimiento, entendiendo que mantener una corona desadaptada, deteriorada o asociada a una alteración dental puede favorecer la progresión de caries, filtraciones, inflamación gingival, dolor, infección o deterioro de la estructura dental, dependiendo de la condición presente. La alternativa más apropiada será determinada por el profesional tratante de acuerdo con la valoración clínica y las necesidades individuales.

transitorio y sangrado leve de la encía. Si se requiere desgastar o seccionar la corona, el procedimiento generar calor, vibración y exposición temporal de las estructuras subyacentes, por lo que se utilizarán las medidas clínicas pertinentes para reducir las molestias y proteger los tejidos.

Soy consciente y comprendo las implicaciones del presente consentimiento, me encuentro en capacidad de expresarlo y dejo constancia que los espacios en blanco han sido llenados antes de mi firma.

**AUTORIZACIÓN**

_____**FIRMA** _____

**DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE***

Tipo: _____ No. _____

Parentesco: _____

**FIRMA DEL PROFESIONAL*

No. de Registro Profesional: _____

Nombre del Profesional_____

Tipo y Número de Documento_____

**Parentesco en caso de firma de persona distinta del paciente*

**REVOCACIÓN:** En caso de NO estar de acuerdo con la realización del procedimiento.

_____**FIRMA** _____

**DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE***

Tipo: _____ No. _____

Parentesco: _____

**FIRMA DEL PROFESIONAL*

No. de Registro Profesional: _____

Nombre del Profesional_____

Tipo y Número de Documento_____