

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

2.1. 抗血栓劑 Antithrombotic agents

2.1.1. 血小板凝集抑制劑 Platelet aggregation inhibitors (100/7/1)

2.1.1.1. Acetylsalicylic acid (Aspirin) 製劑 (89/2/1)

如用於抗血小板凝集，以每日一粒為原則。

2.1.1.2. Ticlopidine (原 ticlopidine 與 acetylsalicylic acid 合併使用之情況條文修訂)：(87/4/1、88/9/1、90/1/1、100/7/1)

1. 限無法忍受 acetylsalicylic acid (Aspirin) 或對 acetylsalicylic acid (Aspirin) 有禁忌而需使用抗血小板製劑之病患使用(88/9/1)。
2. 原則上本類製劑與 acetylsalicylic acid (Aspirin) 不宜合併使用，僅於冠狀動脈支架植入術後三個月內，得依病情需要合併使用。(87/4/1、90/1/1)
3. 申報費用時需註明放置支架 (stent) 之日期。(87/4/1、90/1/1、100/7/1)

2.1.1.3. Tirofiban (如 Aggrastat)：(91/2/1、99/10/1、100/7/1)

1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時，作為 heparin 的輔助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。
2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 tirofiban。

2.1.1.4. Abciximab (如 ReoPro)：(90/7/1、100/7/1)

1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時、作為 heparin 的輔助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。
2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 abciximab。

2.1.1.5. Cilostazol (如 Pletal)：(90/6/1、100/7/1、104/4/1、105/5/1)

1. 使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人 (周邊動脈疾病 Fontaine stage II)，用於增加最大及無痛行走距離。
2. 經生活模式改變及其他治療後，仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。
3. 用於無法耐受 acetylsalicylic acid 且屬非心因性栓塞之腦梗塞患者，以預防腦梗塞之再復發，並符合下列條件之一(105/5/1)：
 - (1)對 acetylsalicylic acid 過敏。
 - (2)臨床診斷確定為 acetylsalicylic acid 所導致之消化性潰瘍或上消化道出血、穿孔病史者。需於病歷註明發生時間。
 - (3)最近一年內臨床診斷確定為消化性潰瘍者。病歷上應有明確消化性潰瘍之典型症狀紀錄及發病時間。
 - (4)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道 X 光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血、穿孔病史。需於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道 X 光攝影檢查時間。但對 acetylsalicylic acid 無法耐受，且身體狀況無法忍受內視鏡或消化道 X 光攝影檢查者 (如75歲(含)以上罹有中風或長期卧床者) 不在此限。

2.1.1.6 Clopidogrel (如 Plavix): (90/1/1、93/4/1、94/8/1、96/10/1、100/7/1、101/12/1)

1. 限近期發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人，並符合下列條件之一者使用。(90/1/1、94/8/1、96/10/1)
 - (1)對 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)過敏。
 - (2)臨床診斷確定為 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)所導致之消化性潰瘍或上消化道出血、穿孔病史者。需於病歷註明發生時間。
 - (3)最近一年內臨床診斷確定為消化性潰瘍者。病歷上應有明確消化性潰瘍之典型症狀紀錄及發病時間。
 - (4)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道 X 光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血、穿孔病史。需於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道 X 光攝影檢查時間。但對 acetylsalicylic acid 無法耐受，且身體狀況無法忍受內視鏡或消化道 X 光攝影檢查者(如75歲(含)以上罹有中風、心肌梗塞、週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化或長期卧床者)不在此限。(101/12/1)
2. 置放金屬支架3個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)合併使用；置放塗藥支架6個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)合併使用。需於病歷註明支架置放手術之日期。(90/1/1、94/8/1、101/12/1)
3. 置放金屬支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，1個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)合併使用；置放塗藥支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)合併使用期間可再延長1個月。(101/12/1)
4. 用於已發作之急性冠心症(不穩定性心絞痛和心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長9個月。需於病歷註明住院時間。(93/4/1、94/8/1、96/10/1)

2.1.1.7. Eptifibatide (如 Integrilin): (95/8/1、100/7/1)

1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時、作為 heparin 的輔助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。
2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 eptifibatide。

2.1.1.8. Clopidogrel-acetylsalicylic acid (如 CoPlavix): (100/9/1、101/12/1)

1. 置放金屬支架3個月內得使用；置放塗藥支架6個月內得使用。需於病歷註明支架置放手術之日期。(100/9/1、101/12/1)
2. 置放金屬支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，1個月內得使用；置放塗藥支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，使用期間可再延長1個月。(101/12/1)
3. 用於已發作之急性冠心症(不穩定性心絞痛和心肌梗塞)而住院的病人時，最長9個月。需於病歷註明住院時間。(100/9/1)

2.1.1.9. Ticagrelor (如 Brilinta): (102/7/1)

限用於已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長9個月。需於病歷註明住院時間。

2.1.1.10. Prasugrel (如 Efient): (107/11/1)

限用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長12個月。需於病歷註明住院時間。

2.1.2. 血栓溶解劑 Thrombolytic drugs (100/7/1)

2.1.2.1. rt-PA (如 Actilyse Inj)、tenecteplase (如 Metalyse) :

用於血管 (不含腦血管) 血栓時: (91/12/1、100/7/1、107/11/1)

1. 限具有心臟專科醫師之醫院使用。
2. 應使用於胸痛急性發作十二小時內，心電圖至少有二導極呈現心肌缺氧變化，使用硝化甘油舌下片歷經三十分鐘尚未能解除胸痛，有急性心肌梗塞之臆斷者。
3. 懷疑有急性肺動脈栓塞病人。
4. 有周邊血管血栓病人。(93/1/1)
5. 應使用於無出血傾向之病人。有出血傾向之病人，或最近有手術或出血現象之病人應避免使用。
6. 使用本藥劑前宜先檢查病患血小板、出血時間、凝血時間、凝血原時間及血漿纖維原含量。
7. 醫院於病例發生時，應填寫「全民健康保險使用 rt-PA (Actilyse) 或 tenecteplase (Metalyse Inj.) 申報表 (血管 (不含腦血管) 血栓病患用)」(請詳附表二-A) 併附兩張有意義之不同時段心電圖於當月份醫療費用申報。(93/1/1)
8. 醫院如擬將 rt-PA 或 tenecteplase 列為常備藥品，請於申報時檢附心臟病診斷設備，加護病房 (ICU 或 CCU) 之相關資料，經本保險同意後再按使用規定辦理。

2.1.2.2. rt-PA (如 Actilyse Inj) 用於急性缺血性腦中風時: (93/1/1、100/7/1、107/11/1、112/10/1)

1. 限急性缺血性腦中風4.5小時內使用。(112/10/1)
2. 使用醫院應具有神經內、外專科醫師及加護病房或同等級之設施。
3. 使用本藥品前，應先作病人腦部電腦斷層或磁共振造影檢查、神經學檢查 (含 NIHSS)、心電圖、胸部 X 光、凝血時間、凝血酶原時間、肝腎功能及血糖，並且必須符合「急性缺血性腦中風之血栓溶解治療檢查表」(請詳附表二-C) 之條件。(107/11/1)

4. 醫院於病例發生後，於當月醫療費用申報時，應填寫「全民健康保險使用 rt-PA (Actilyse) 申請表 (急性缺血性腦中風病患用)」(請詳附表二-B)，並附注射前及

24小時、36小時後之腦部電腦斷層（或磁振造影檢查）與 NIHSS。

2.1.2.3. 刪除(101/4/1)

2.1.3. 肝素類 Heparin group

2.1.3.1. Tinzaparin 注射劑（如 Innohep）：90/7/1、91/9/1、100/7/1）

1. 用於治療深層靜脈栓塞，每療程以二瓶為限。
2. 用於預防手術病人深層靜脈栓塞，每療程以一瓶為限。
3. 用於治療肺栓塞。

2.1.3.2. Enoxaparin 注射劑（如 Clexane）：(108/2/1)

依下列情形使用：

1. 治療深部靜脈栓塞(DVT)：每次療程使用小於10天。
2. 治療急性冠心症(ACS)：每次療程使用60mg 1天2次，2~8天。
3. 預防手術後靜脈栓塞：腹部手術，每次療程使用40mg 1天1次，7~10天；膝蓋或髖關節手術，每次療程使用30mg 1天1次，7~10天。

2.1.4. 其他抗血栓劑 Other antithrombotic agents：(100/7/1)

2.1.4.1. Fondaparinux（如 Arixtra）：（100/4/1、100/7/1、103/2/1、111/2/1、111/3/1）

限用於

1. 治療 ST 段升高型心肌梗塞(STEMI)的急性冠狀症候群之病患，藉以預防使用血栓溶解劑治療或原先即不準備接受任何其它型式之再灌流治療的患者發生死亡和心肌再度梗塞。
2. 治療60歲以上患有不穩定型心絞痛或非 ST 段升高型心肌梗塞(UA/NSTEMI)且不適合接受緊急(120分鐘內)侵入性治療(PCI)者，其症狀開始時間需在24小時之內，且血清肌酸酐需小於3.0 mg/dL。(103/2/1、111/2/1)
3. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術後，預防其術後之靜脈血栓(VTE)，限用2.5 mg 針劑皮下注射，每日一劑，最多5週：(103/2/1、111/3/1)
 - (1) 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。
 - (2) 經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）或靜脈攝影（Venography），診斷為靜脈血栓症之病患。(111/3/1)

2.1.4.2. Rivaroxaban(如 Xarelto)（101/1/1、102/2/1、103/5/1、104/12/1、105/5/1、110/7/1、111/2/1、112/3/1）

限用於

1. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用10mg 錠劑，每日一粒，人工髖關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週：(112/3/1)

- (1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患；
- (2)經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）或靜脈攝影（Venography）檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。(112/3/1)
2. 18歲以上非瓣膜性心房纖維顫動病患，須符合下列條件之一：(102/2/1、103/5/1、105/5/1、111/2/1、112/3/1)
- (1)曾發生中風或全身性栓塞。
- (2)左心室射出分率小於40%。
- (3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。
- (4)75歲以上。(111/2/1)
- (5)50歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。(111/2/1、112/3/1)
- (6)每日1次，每次限1粒。(103/5/1)
- (7)排除標準：
- I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。
 - II. 14 天內發生中風。
 - III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。
 - IV. 有增加出血風險的情況。
 - V. 肌酸酐清除率小於15mL/min。
 - VI. 活動性肝病和懷孕。
3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞(103/5/1、104/12/1)：
- (1)須經影像學或血管超音波檢查診斷。
- (2)第1日至21日，每日早晚各一次，每次限用一粒。
- (3)第22日起，每日一次，每次限用一粒，每6個月評估一次。
4. Rivaroxaban 2.5mg 與 aspirin 併用，可用於發生缺血事件高危險族群之冠狀動脈(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件(Atherothrombotic events)：(110/7/1)
- (1)高風險的冠狀動脈硬化須符合：2年內發生2次(含)以上心血管事件(如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術(revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風)。
- (2)高風險的症狀性周邊動脈硬化須符合下列條件之一：
- I. 曾經接受過主動脈股動脈(aorto-femoral)或下肢繞道手術；髂動脈、股動脈及膝下動脈(iliac or infrainguinal)接受經皮動脈血管造型整形術(PTA)。
 - II. 下肢或足部因動脈血管疾病所造成的截肢或壞疽。
 - III. 有間歇性跛行的病史並經血管攝影術有顯著的周邊動脈狹窄(>50%)。如果病人不

適合使用顯影劑(例如有顯影劑過敏史或腎功能不全($\text{eGFR} < 45 \text{ mL/min/1.73m}^2$ 或 $\text{serum creatinine} \geq 1.5 \text{ mg/dL}$), 則須有都普勒超音波等非侵入性測試有顯著的周邊動脈狹窄($>50\%$)。

(3)限 Rivaroxaban 2.5mg, 每日2次, 每次限用1粒。

(4)不得合併雙重抗血小板(DAPT)藥物、P2Y₁₂抑制劑(如 clopidogrel、ticagrelor 或 prasugrel)、cilostazol 或其他抗凝血劑(anti-coagulant, 如 warfarin)。

2.1.4.3. Apixaban (如 Eliquis) (103/6/1、106/4/1、111/2/1)

限用於

1. 非瓣膜性心房纖維顫動病患：

(1)須符合下列條件之一：

I. 曾發生中風或全身性栓塞。

II. 左心室射出分率小於40%。

III. 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。

IV. 75歲以上。(111/2/1)

V. 65歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。(111/2/1)

(2)每日2次, 每次限用1顆。

(3)排除標準：

I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。

II. 14天內發生中風。

III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。

IV. 有增加出血風險的情況。

V. 肌酸酐清除率小於15 mL/min。

VI. 活動性肝病和懷孕。

2. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞：(106/4/1)

(1)須經影像學或血管超音波檢查診斷。

(2)第1日至7日, 每日2次, 每次限用2顆。

(3)第8日起, 每日2次, 每次限用1顆, 每6個月評估一次。

2.1.4.4. Edoxaban(如 Lixiana)：(105/9/1、111/2/1)

限用於

1. 非瓣膜性心房纖維顫動病患：

(1)須符合下列條件之一：

I. 曾發生中風或全身性栓塞。

II. 左心室射出分率小於40%。

III. 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。

IV. 75歲以上。(111/2/1)

V. 65歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。(111/2/1)

(2)每日1次，每次限1顆。

(3)排除標準：

- I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。
- II. 14天內發生中風。
- III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。
- IV. 有增加出血風險的情況。
- V. 肌酸酐清除率小於15 mL/min，或大於95 mL/min。
- VI. 活動性肝病和懷孕。

2. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞：

(1)須經影像學或血管超音波檢查診斷。

(2)接受至少5日非經腸道抗凝血劑注射治療後，開始每日1次，每次限1顆，每6個月評估一次。

2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)：Dabigatran(如 Pradaxa)
(101/6/1、104/12/1、107/9/1、111/2/1、112/3/1)

1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患：

(1)須符合下列條件之一：

- I. 曾發生中風或全身性栓塞。
- II. 左心室射出分率小於40%。
- III. 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。
- IV. 75歲以上(111/2/1)。
- V. 65歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病(111/2/1)。

(2)150mg 或110mg 膠囊，每日2次，每次限1粒；75mg 膠囊每日2次，每次限2粒
(107/9/1)

(3)排除標準：

- I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。
- II. 14 天內發生中風。
- III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。
- IV. 有增加出血風險的情況。
- V. 肌酸酐清除率小於 30 mL/min。
- VI. 活動性肝病和懷孕。

2. 用於靜脈血栓高危險病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。(112/3/1)

(1)須符合下列條件之一：

- I. 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。
- II. 經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography) 或靜脈攝影 (Venography) 檢

測，診斷為靜脈血栓症之病患。(112/3/1)

- (2) 限用75mg，每日至多二粒，人工髖關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週。

(3)排除標準：

- I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。
- II. 14天內發生中風。
- III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。
- IV. 有增加出血風險的情況。
- V. 肌酸酐清除率小於 30 mL/min。
- VI. 活動性肝病和懷孕。

3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞：(107/9/1)

(1)須經影像學或血管超音波檢查診斷。

(2)接受至少5日注射型抗凝血劑治療後，開始每日兩次，每次限150mg 以下，持續治療6個月。

2.2. 血管擴張劑 Vasodilators

2.2.1.(刪除)(101/9/1)

2.2.2.Nimodipine inj (如 Nimotop)：(87/4/1、93/2/1)

預防、治療因動脈瘤引起之蜘蛛膜下出血後，腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損，可使用二星期，需附電腦斷層掃描 (CT Scan) 報告。

2.2.3.Papaverine inj：

限血管攝影及血管手術病例使用。

2.3. 血管收縮劑 Vasoconstrictors

2.3.1.Sumatriptan succinate (如 Imigran)；rizatriptan：(88/9/1、93/8/1、94/11/1、97/1/1、97/6/1、97/9/1、108/5/1)

1. 限符合國際頭痛協會 (International Headache Society) 最新版「偏頭痛」診斷標準者：(97/9/1、108/5/1)

(1)至少有五次能符合(2)至(4)項的發作。

(2)頭痛發作持續4至72小時(若年齡小於18歲，頭痛發作可為持續2到72小時)。(108/5/1)

(3)頭痛至少具下列二項特徵：

- I 單側
- II 搏動性
- III 程度中等或重度(日常生活受限制甚或禁絕)
- IV 上下樓梯或類似之日常活動會使頭痛加劇

(4)當頭痛發作時至少有下列一情形：

- I 噁心或嘔吐

II 畏光及怕吵

2. 偏頭痛之發作嚴重影響日常生活（無法工作或作家事或上課）者。(97/9/1)
 3. 經使用其他藥物無效者。
 4. 每月限用四次，且
 - (1) Sumatriptan succinate 口服劑型藥品每次用量不超過100 mg，每月不超過400 mg。
 - (2) Sumatriptan succinate 鼻噴劑型藥品每次用量不超過一劑（10mg 或20mg），每月不超過四劑（10mg 或20mg）。(93/8/1、94/11/1、97/1/1、97/9/1)
 - (3) Rizatriptan 口服劑型藥品每次用量不超過10 mg，每月不超過40 mg。(97/6/1)
 5. 不得同時處方含有 ergotamine 製劑或其衍生物類藥物。
 6. 不得作為預防性使用。
 7. 不得使用於曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病、Prinzmetal 氏狹心症、冠狀血管痙攣者及高血壓未受控制的患者。
 8. 青少年（12-17歲）符合上述第1、2、3項者，限使用 sumatriptan succinate 鼻噴劑型或 rizatriptan 口服劑型藥品，且二藥品不得併用。6-11歲兒童符合上述第1、2、3項者，限使用 rizatriptan 口服劑型藥品。(97/9/1、108/5/1)
- 2.4. 泌尿道疾患治療藥物 Agents used to treat urological disorders
- 2.4.1. Alprostadil：(86/9/1)
- 如用於勃起機能障礙之治療，不予給付。
- 2.4.2. Potassium citrate（如 Urocit-K tab）：
- 限泌尿道結石或腎小管性酸毒症病人使用。
- 2.4.3. Pentosan Polysulfate Sodium（如 Elmiron Cap）(92/12/1)
1. 用於間質性膀胱炎。
 2. 病患應同時符合下列情形：
 - (1) 出現尿急、頻尿、骨盆腔疼痛、夜尿症狀一年以上。
 - (2) 尿液常規檢查或培養無感染，及尿液細胞學檢查無惡性細胞。
 - (3) 麻醉下膀胱鏡水擴張後出現腎絲球狀出血（glomerulation）或 Hunner's 潰瘍，或未出血但膀胱容量在麻醉下小於500毫升。
 - (4) 連續二天排尿日誌顯示每次排尿量少於300毫升，且每天排尿次數至少大於十次以上。
 - (5) 曾以傳統治療（包括膀胱擴張、藥物、物理治療等）治療四週以上仍無效果者。
 3. 原則上每一療程以六個月為限，療程結束前應評估其療效，如症狀未有改善且無不良反應出現者，可再繼續另一療程。
 4. 需經事前審查核准後使用。
- 2.5. (刪除)(100/7/1)
- 2.6. 降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia

2.6.1. 全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1）

降膽固醇藥物，適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一。但下表所列項目不適用表一，僅適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二。（115/9/1）

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
simvastatin	AC46402100	Simvatin film coating tablets 20mg
	AB47348100	Vatatin F.C. tablets 20mg "STANDARD"
	BC24339100	Simvahexal film-coated tablets 40mg
	AC49672100	Simatin F.C. tablets 20mg
	AC49841100	Simpotin F.C. tablets 20 mg "Weidar"
	AC47924100	Zostatin F.C. tablets 20 mg "S.C."
	BC23970100	Simvahexal film-coated tablets 20mg
	AC49360100	Bezostatin F.C. tablets 40 mg "S.C."
	AC48813100	Simvatenin F.C. tablets 20mg (simvastatin)
	AC56804100	Simvastatin F.C. tablets 20mg "CYH"
	AC49699100	Simatin F.C. tablets 10mg
	AC47907100	Sinty F.C. tablets 20mg
	AC48926100	Simva F.C. tablets 20 mg
	AC49190100	Sivasin film coated tablets 40mg
	AC58207100	Simvatin film coating tablets 40mg
	AC48608100	Simva F.C. tablets 20mg "Union"
	AC49997100	Simatin F.C. tablets 40 mg
	A055967100	Simva F.C. tablets 40mg "Union"
	AC56806100	Sinty F.C. tablets 40mg
lovastatin	AC39403100	Lozutin tablets 20mg (lovastatin)
	AC39307100	Delipic tablets 20mg "Standard" (lovastatin)
	A042389100	Lovatin tablets 20mg "PANBIOTIC"
pravastatin	BC23596100	Mevalotin protect 40mg tablets
	AC52581100	Joinlo tablets 40mg "EVEREST"
	AB49454100	Pratin tablets 40 mg (pravastatin sodium)
	AB48586100	Pavatin protect tablets 20mg "Standard" (pravastatin sodium)
	AB48681100	U-Chu Pavadin tablets 20 mg
	AB46029100	Pratin tablets 10mg (pravastatin sodium)
	AB48644100	Mechol tablets 20mg "Yung Shin"

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
	AB49021100	Pratin tablets 20 mg
	BC23597100	Mevalotin protect 20mg tablets
	AC57126100	Pavatin protect tablets 40mg "Standard" (pravastatin sodium)
	AC48469100	Mechol tablets 10mg "Yung Shin"
	AC57741100	Joinlo tablet 20mg EVEREST
fluvastatin	BC23556100	Lescol XL film-coated tablets 80mg
	BC26147100	Fluvastatin XL film-coated tablets 80mg
	AC56629100	Lecitol XL film-coated Tablets 80mg
atorvastatin	AC55272100	Atorva film-coated tablets 10mg "Standard" (atorvastatin)
	BA25337100	Tulip 20mg film coated tablets
	BA25200100	Tulip 10mg film coated tablets
	AC48879100	Anxolipo F.C. tablet 10 mg
	AC57267100	Atotin F.C. tablets 10mg
	AC51598100	Atoty F.C. tablets 10 mg
	AC58211100	Atotin F.C. tablets 20mg
	AC49226100	Anxolightor F.C. tablets 20 mg
	AC58517100	Atoroty F.C. tablets 20mg
	AC57805100	Atorva F.C. tab. 20mg "Standard" (atorvastatin)
	AA49543100	Atorin F.C. tablet 10mg
	BA25201100	Tulip 40mg film coated tablets
	AA57774100	Atover F.C. Tab. 10mg P.L.
	AC52530100	Atorin F.C. tablets 20mg
	AC55583100	Atorcal F.C. tablets 20mg "S.C."
	AC55895100	Atorcal F.C. tablets 10mg "S.C."
	AA57950100	Atover F.C. tablets 20mg P.L.
	AC55268100	Atorva film-coated tablets 40mg "Standard"(atorvastatin)
	AC55952100	Atoty F.C. tablets 20 mg
	AA56739100	Anxolipo F.C. tablets 20mg
	AC55956100	Lipiminus F.C. tablets 20mg
	AB54967100	Atover F.C. tablets 40 mg "P.L."
	AA49288100	Anxolipo F.C. tablets 40mg

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
	AC56319100	Lipiminus F.C. tablets 10mg
	AC57133100	Atotin F.C. tablets 40mg
	AC52301100	Lipiminus F.C tablets 40mg
	AC57930100	Atova F.C. tablets 10mg "Yu Sheng"
	AC56682100	Atoroty F.C. tablets 10mg
	AC50086100	Atorcal F.C. tablets 40 mg "S.C."
	AB57967100	Atorstin film coated tablets 10mg
	AC58041100	Atoty F.C. tablets 40mg
	AB57772100	Atorstin film coated tablets 40mg
	AB58049100	Atorstin film coated tablets 20mg
	AB51732100	Atorin F.C. tablets 40mg
	AC58262100	Atoroty F.C. tablets 40mg
rosuvastatin	AA57802100	Roty F.C. tablets 10mg
	AA57843100	Roty F.C. tablets 5mg
	BC24597100	Crestor 5mg film-coated tablets
	AC57803100	Roty F.C. tablets 20mg
	BC24129100	Crestor 20mg film-coated tablets
	AB57940100	Rosulator F.C. tablets 10mg "S.C."
	BC26543100	Alvostat film coated tablets 10mg
	AC59266100	Rostatin F.C. tablets 5mg "Standard"
	AC58282100	Rostatin F.C. tablets 10mg "Standard"
	AC58384100	Rosu F.C. tablets 10mg
	AC57130100	Rotlip film-coated tablets 10mg
	AC59652100	Rosulator F.C. tablets 5mg "S.C."
	AC57809100	Rolipostatin 10mg F.C. tablets "Macro"
	BC26900100	Zyrova 20 (rosuvastatin tablets 20mg)
	BC27782100	Zyrova 5 (rosuvastatin tablets 5mg)
	AC58969100	Aladdin F.C. tablets 10mg
	BC27781100	Zyrova 10 (rosuvastatin tablets 10mg)
	AC58067100	Rosutor film-coated tablets 10mg
	BC26544100	Alvostat film coated tablets 20mg
	AC60114100	Rosutor film-coated tablets 5mg
	AC59649100	Rosulip F.C. tablets 5mg C.H.
	AC58270100	Crosuty F.C. tablets 10mg

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
	AC58622100	Rotlip film-coated tablets 5mg
	AC58098100	Crosuty F.C. tablets 5mg
	AC60197100	Rosutor film-coated tablets 20mg
pitavastatin	BC25350100	Livalo tablets 2mg
	AA58648100	Pitarty F.C. tablets 2mg
	BC27002100	Livalo OD tablets 2mg
	AC58526100	Pitastatin F.C. tablets 2mg
	AC58633100	Pitarty F.C. tablets 4mg
	AC58525100	Pitastatin F.C. tablets 4mg
	AC59398100	Pivas F.C. tablets 2mg
	AC59192100	Pitanxo F.C. tablets 4mg
	AC60561100	"EVEREST" Huiton F.C. tablets 2mg
	AC61795100	Pistatin F.C. tablets 2mg
	AC58078100	Pitavol F.C. tablets 2mg
	AC60174100	Pitavastatin F.C. tablets 2mg "CYH"
	AC59193100	Pitanxo F.C. tablets 2mg
	AC60290100	Lavitol film coated tablets 4mg
pravastatin 及 fenofibrate 複方	BC26169100	Pravafen 40mg/160mg hard capsules
atorvastatin 及 amlodipine 複方	BC24392100	Caduet 5mg/20mg tablet
	BC24391100	Caduet 5mg/10mg tablet
	AC59887100	Dualpress F.C. tablets 5mg/10mg
	AC60836100	Dualpress F.C. tablets 5mg/20mg

全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一：(115/9/1)

ASCVD 風險等級	非藥物治療	起始藥物治療 血脂值	主要/（次要） 血脂目標值	處方規定
極高風險	處置各項可改善 心血管風險因子 與藥物治療並行	LDL-C $\geq$ 55mg/dL	LDL-C<55mg/dL(non- HDL-C<85mg/dL)	極高、非常高風險： 一、起始治療：依據基線血脂值、用藥史和臨床狀況，給予中至高強度 statin 或合併 ezetimibe。 二、經起始治療6~8週後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整至高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量，同時考慮合併 non-statin 治療，包含：ezetimibe、PCSK9單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase 抑制劑。 三、更動治療1~3個月內需追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整藥物組合。
非常高風險		LDL-C $\geq$ 70mg/dL	LDL-C<70mg/dL(non- HDL-C<100mg/dL)	
高風險	生活型態改變與 藥物治療並行	LDL-C $\geq$ 100mg/dL	LDL-C<100mg/dL(non- HDL-C<130mg/dL)	高風險： 一、起始治療：依據基線血脂值與臨床狀況，給予中至高強度 statin 或合併 ezetimibe；同時進行生活型態改變。 二、經起始治療6~8週後，檢測血脂指標，如治療
中風險	給藥前應有3-6 個月	LDL-C $\geq$ 115mg/dL	LDL-C<115mg/dL(non- HDL-C<145mg/dL)	
低風險	生活型態改變，	LDL-C $\geq$ 130mg/dL	LDL-C<130mg/dL(non-	

	並處置心血管風		HDL-C<160mg/dL)	達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮使用高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量或同時合併 non-statin 治療，包含：ezetimibe、PCSK9單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase 抑制劑。 三、更動治療1~3個月內需追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整藥物組合。 中、低風險： 一、起始治療：進行生活型態改變，並處置心血管風險因子。 二、經起始治療3~6個月後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每6-12個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，給予中強度 statin。 三、中強度 statin 治療6~8週後追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每6-12個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並可給予高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量或合併 non-statin 治療。
0項心血管風險因子	險因子	LDL-C $\geq$ 160mg/dL	LDL-C<160mg/dL	

●ASCVD 風險等級定義：

一、極高風險：

(一)冠狀動脈疾病合併下列任一臨床狀況：

1. 一年內曾經歷心肌梗塞。
2. $\geq$ 兩次心肌梗塞病史。
3. 多支冠狀動脈阻塞。
4. 急性冠心症合併糖尿病。
5. 周邊動脈疾病或頸動脈狹窄。

(二)周邊動脈疾病合併下列任一臨床狀況：

1. 冠狀動脈疾病。
2. 頸動脈狹窄。

二、非常高風險：

(一)經臨床檢查確診為動脈硬化心血管疾病，包含：

1. 急性冠心症病史。
2. 接受血管再通術(心導管介入治療或外科冠狀動脈繞道手術)。
3. 缺血性中風/短暫性腦缺血發作合併動脈硬化相關疾病或病史。
4. 周邊動脈疾病(曾接受血管再通術、有肢體缺血相關症狀或截肢)。

(二)經影像檢查確認有顯著斑塊負擔，定義為 $\geq 50\%$ 直徑狹窄率，包含：

1. 冠狀動脈血管攝影。
2. 冠狀動脈或周邊血管電腦斷層攝影。
3. 頸動脈或周邊血管超音波。

三、高風險：

(一)糖尿病。

(二)慢性腎臟病(進入透析治療前的慢性腎臟病，包括 $\text{UACR} \geq 30\text{mg/g}$ or $\text{eGFR} < 60\text{mL/min/1.73m}^2$ 至少持續3個月)。

(三) $\text{LDL-C} \geq 190\text{mg/dL}$ 。

(四)冠狀動脈鈣化分數(CAC) ≥ 400 。

四、中風險：2項(含)以上心血管風險因子。

五、低風險：1項心血管風險因子。

●心血管風險因子定義：

一、高血壓。

二、男性 ≥ 45 歲，女性 ≥ 55 歲。

三、早發性冠心病家族史(男性 ≤ 55 歲，女性 ≤ 65 歲)。

四、 HDL-C ：男性 $< 40\text{mg/dL}$ ，女性 $< 50\text{mg/dL}$ 。

五、抽菸。

六、代謝性症候群(符合以下至少三項)：

- (一)腹部肥胖(男性 $\geq 90\text{cm}$ ，女性 $\geq 80\text{cm}$)。
- (二)血壓偏高($\geq 130/85\text{mmHg}$ 或使用高血壓藥物)。
- (三)空腹血糖偏高($\geq 100\text{mg/dL}$ 或使用糖尿病藥物)。
- (四)空腹 TG 偏高($\geq 150\text{mg/dL}$ 或使用治療 TG 血脂藥物)。
- (五)HDL-C 偏低(男性 $<40\text{mg/dL}$ ，女性 $<50\text{mg/dL}$)。

●各風險等級評估建議：

一、極高風險、非常高風險：

- (一)初始評估應檢測完整血脂指標，並應於急性病人入院後24小時內完成血脂檢驗。
- (二)處置各項可改善心血管風險因子，包含：血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。

二、高風險、中風險、低風險：

- (一)給予完整血脂指標檢測，辨識各項可改善心血管風險因子，包含：血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。
- (二)ASCVD 風險分級為高風險，當有嚴重高膽固醇血症、肌腱黃色瘤、早發心血管疾病或家族病史時，應依照台灣家族性高膽固醇血症診斷標準進行家族性膽固醇血症篩檢。
- (三)若未符合上述高風險條件，應以列在低至中風險欄位的心血管風險因子數量作為風險評估。

- 當 LDL-C 達到理想治療目標後，非高密度脂蛋白-膽固醇(non-HDL-C)可作為血脂治療次要標的，其計算方式為總膽固醇數值減掉 HDL-C 數值，尤其適用於合併有三酸甘油脂、糖尿病、或肥胖的病人以做進一步的心血管風險評估。

全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二：（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1）

	非藥物治療	起始藥物治療血脂值	血脂目標值	處方規定
1. 有急性冠狀動脈症候群病史 2. 曾接受心導管介入治療或外科冠動脈搭橋手術之冠狀動脈粥狀硬化患者(108/2/1)	與藥物治療可並行	LDL-C $\geq$ 70mg/dL	LDL-C<70mg/dL	第一年應每3-6個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每6-12個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功能異常，橫紋肌溶解症。
心血管疾病或糖尿病患者	與藥物治療可並行	TC $\geq$ 160mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 100mg/dL	TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL	
2個危險因子或以上	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TC $\geq$ 200mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 130mg/dL	TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL	
1個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TC $\geq$ 240mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 160mg/dL	TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL	
0個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	LDL-C $\geq$ 190mg/dL	LDL-C<190mg/dL	

●心血管疾病定義：

（一）冠狀動脈粥狀硬化患者包含：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)

（二）缺血型腦血管疾病病人包含：

1. 腦梗塞。
2. 暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)
3. 有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)

●危險因子定義：

1. 高血壓
2. 男性 $\geq$ 45歲，女性 $\geq$ 55歲或停經者

3. 有早發性冠心病家族史(男性 ≤ 55 歲，女性 ≤ 65 歲)

4. HDL-C < 40 mg/dL

5. 吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。

2.6.2. Ezetimibe：(94/6/1、115/9/1)

限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、同型接合子性麥脂醇血症(植物脂醇血症)患者，並符合下列條件之一者：

1. 對 statins 類藥品發生無法耐受藥物不良反應(如 Severe myalgia、Myositis)者。
(94/6/1、115/9/1)

2. 經使用 statins 類藥品單一治療6-8週未達治療目標者，得合併使用本類藥品與 statins 類藥品。但下表所列項目，需經使用 statins 類藥品單一治療3個月未達治療目標者，始得與 statins 類藥品併用。(115/9/1)

健保代碼	藥品名稱
AC60610100	Ezetity tablets 10mg
BC27311100	Ezzicad (ezetimibe) 10mg Tablets
BC28252100	Ezta 10 (ezetimibe Tablets 10mg)
BC26552100	Ezetimibe Sandoz 10mg tablets

2.6.3. 含 ezetimibe 及 statin 類之複方製劑：(95/12/1、106/8/1、111/11/1、112/12/1、115/9/1)：

1. 限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)病患。
(106/8/1、115/9/1)

2. 經使用 statin 類藥品單一治療6-8週未達治療目標者，得使用本類藥品。但下表所列項目，需經使用 statin 類藥品單一治療3個月未達治療目標者，始得使用。(115/9/1)

健保代碼	藥品名稱
AC59251100	Agitin tablets 10/20mg
AC60402100	Sacure tablets 10/20mg
BC28502100	Ezta-SM 10+20 (ezetimibe and simvastatin tablets 10mg/20mg)
AC62052100	Zoliton tablets 10/20mg
AC62053100	Zoliton tablets 10/10mg
AC62140100	Zovastin tablets 10/10mg
AC62139100	Zovastin tablets 10/20mg

BC28181100	Cretrol Tab. 10/10 mg
BC28182100	Cretrol Tab. 10/20 mg
BC28884100	Livazebe combination tablets HD (for 4mg)

3. 本品不得與 gemfibrozil 併用。(106/8/1)

2.6.4. PCSK9 血脂調節劑

2.6.4.1. Evolocumab (如 Repatha)：(107/3/1、108/5/1、109/4/1、114/9/1)

1. 使用於發生重大心血管事件之病人

- (1) 須經事前審查核准後使用（請詳附表二-D），每次申請得核准使用12個月，再次申請須檢附評估報告，若血中 LDL-C 較本藥物開始使用前下降程度未達30%，即屬療效不佳，則不再給付。(114/9/1)
- (2) 限給付於發生重大心血管事件之後一年內且使用最大耐受劑量 statin 之病人，如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術（revascularization）、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之動脈粥狀硬化心血管疾病之成人病人，且符合下列條件之一者：(114/9/1)
 - I. 經使用高強度 statin（如 rosuvastatin 20mg 或 atorvastatin 40 mg(含)以上）或病人可耐受之最大劑量的 statin 三個月(含)以上且之後再合併使用 ezetimibe 10 mg 三個月(含)以上，LDL-C 仍高於100 mg/dL 者。
 - II. 對 statin 有禁忌症或確診為對 statin 不耐受之病人，經其他降血脂藥物(至少需有 ezetimibe 10 mg)持續治療3個月，LDL-C 仍高於100 mg/dL 者。

(3) 最高劑量為每兩週使用1支。

(4) 不可同時使用其他 PCSK9血脂調節劑。

2. 使用於同合子家族性高膽固醇血症之病人

- (1) 限經使用最高忍受劑量之 statin+ezetimibe 合併治療6個月，LDL-C 仍高於130mg/dL 者，且符合下列各項條件之一患者使用：
 - I. 經遺傳基因檢測為同合子基因變異或多重不同基因異常，其作用似同合子基因變異，且確診為同合子家族性高膽固醇血症之患者：依中華民國血脂及動脈硬化學會「臺灣血脂異常防治共識節錄—家族性高膽固醇血症之診斷與治療」之「台灣 FH 建議診斷標準」評分總和超過8分(108/5/1)。
 - II. 經遺傳基因檢測未檢出同合子基因變異或多重不同基因異常之同合子家族性高膽固醇血症患者，至少須符合以下三種臨床徵狀：(108/5/1、109/4/1)
 - i. 10歲前出現皮膚或肌腱黃色瘤。
 - ii. 未經藥物治療之 LDL-C>500 mg/dL 且經降高血脂藥物治療後>330mg/dL。
 - iii. 父母有高膽固醇血症(未經藥物治療之 TC>250mg/dL)。
 - iv. 20歲前發生冠心病。
- (2) 需經事前審查核准使用，每次申請之療程以6個月為限。

(3) 使用後需每6個月評估一次 LDL-C，若 LDL-C 連續二次未較治療前降低18%以上，則不予同意再使用。

(4) 限每4週使用1次，每次最多使用3支，或每2週使用1支。(109/4/1)

2.6.4.2 Alirocumab (如 Praluent) (109/1/1、114/9/1)：

限使用於發生重大心血管事件之病人：

1. 須經事前審查核准後使用（請詳附表二-D），每次申請得核准使用12個月，再次申請須檢附評估報告，若血中 LDL-C 較本藥物開始使用前下降程度未達30%，即屬療效不佳，則不再給付。(114/9/1)
2. 限給付於發生重大心血管事件之後一年內且使用最大耐受劑量 statin 之病人，如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術 (revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之動脈粥狀硬化心血管疾病之成人病人，且符合下列條件之一者：(114/9/1)
 - (1) 經使用高強度 statin (如 rosuvastatin 20mg 或 atorvastatin 40 mg(含)以上)或病人可耐受之最大劑量的 statin 三個月(含)以上且之後再合併使用 ezetimibe 10 mg 三個月(含)以上，LDL-C 仍高於100 mg/dL 者。
 - (2) 對 statin 有禁忌症或確診為對 statin 不耐受之病人，經其他降血脂藥物(至少需有 ezetimibe 10 mg)持續治療3個月，LDL-C 仍高於100 mg/dL 者。
3. 最高劑量為每兩週使用1支。
4. 不可同時使用其他 PCSK9 血脂調節劑。

2.7. 乙型擬交感神經阻斷劑 Beta blocking agents：metoprolol succinate 23.75mg (如 Betaloc ZOK 25mg) (93/5/1)

限用於慢性心衰竭病患。

2.8. 其他 Miscellaneous

2.8.1. 腦循環改善劑、腦代謝改善劑及血球流變改善劑：(87/4/1)

因治療上需要使用腦循環改善劑或腦代謝改善劑或血球流變改善劑時，最多使用一類，且需檢附相關之紀錄或報告，並於病歷上詳細記載。

2.8.2. 肺動脈高血壓治療劑(95/1/1、97/6/1、98/12/1、99/11/1、100/4/1、103/7/1、104/6/1、104/8/1、108/5/1、109/1/1、112/3/1、113/1/1、114/6/1)：

此類藥物原則上不得併用，惟符合下列之一情況者，得經事前審查核准通過接受合併治療：

1. WHO Functional Class III 及 IV 嚴重且危及生命之原發性肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療成效不佳時。
 2. WHO Functional Class III 之先天性心臟病續發肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療三個月後成效不佳時。(104/8/1)
- ##### 2.8.2.1. Iloprost (如 Ventavis、Ilomedin-20)：(95/1/1、99/11/1、100/4/1)
1. 吸入劑：限用於原發性肺動脈高血壓之治療。

2. 輸注液：限用於原發性肺動脈高血壓且合併右心室衰竭嚴重度高於 class III。
3. 需經事前審查核准後使用。

2.8.2.2. Sildenafil (如 Revatio)：(97/6/1、100/4/1、102/8/1)

1. 用於原發性肺動脈高血壓、結締組織病變導致之肺動脈高血壓或先天性心臟病併發之肺動脈高血壓(Eisenmenger 症候群)運動能力差 (WHO Functional Class III 及 IV) 患者。(102/8/1)。
2. 不得與任何有機硝酸鹽藥物合併使用。

2.8.2.3. Ambrisentan (如 Volibris) (98/12/1、103/7/1、104/8/1、107/12/1)：

1. 限用於原發性肺動脈高血壓之治療。
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 每次限用1粒。

2.8.2.4. Riociguat (如 Adempas) (104/6/1)：

1. 限用於
 - (1)原發性肺動脈高血壓之治療。
 - (2)無法手術或術後仍持續發生或復發、肺功能分級為 WHO 第 II 級到第 III 級的慢性血栓栓塞性肺高壓 (CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension)之成年患者。
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 每次限用1粒。

2.8.2.5. Bosentan (如 Tracleer) (98/12/1、103/7/1、104/8/1)：

1. 用於原發性肺動脈高血壓。
2. 用於因先天性心臟病續發 WHO Functional Class III 肺動脈高血壓(伴隨先天性 Systemic-to-pulmonary shunts 與 Eisenmenger physiology)。
3. 需經事前審查核准後使用。
4. 每次限用1粒。

2.8.2.6. Macitentan (如 Opsumit) (107/12/1、114/6/1、115/5/1)：

1. 用於原發性肺動脈高血壓：
 - (1)需經事前審查核准使用。
 - (2)每日限用1粒。
2. 用於結締組織病變導致之肺動脈高血壓：
 - (1)限符合下列各項條件之病患使用：
 - I. 經右心導管檢查，證實確實符合肺動脈高血壓之診斷。
 - II. 結締組織病變導致之肺動脈高血壓成年患者(須經肺動脈高血壓相關檢查，如肺功能、高解析胸部電腦斷層、肺部通氣及灌注核醫掃描、血液檢查、心臟超音波檢查、或六分鐘走路測試等排除其他病因)，且使用現有藥物(如：sildenafil 或 tadalafil)治療3個月後成效仍不佳者。(107/12/1、115/5/1)

Ⅲ. 經風濕免疫專科醫師會診，確認有需使用者。

(2) 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以6個月為限。申請時須檢附 NYHA Functional class、六分鐘步行測試、心臟超音波或心電圖、心房衰竭指數(Pro-BNP or NT Pro-BNP)等檢查結果，專科醫師會診意見等病歷紀錄。

(3) 使用後每6個月需重新評估一次治療之療效，前述檢查結果皆無較使用前改善者，應暫停使用並加強結締組織病本身疾病之控制。必要時得於3個月後再行申請使用1次。

(4) 每日限用1粒。

2.8.2.7. Selexipag (如 UPTRAVI) : (108/5/1、114/6/1)

1. 用於經衛生福利部國民健康署認定之 WHO Functional Class III 之原發性肺動脈高壓患者，經 PDE-5i (phosphodiesterase type 5 inhibitor) 和/或 ERA (endothelin-receptor antagonist) 治療療效不佳者，合併 PDE-5i 或 ERA 使用。

(1) 需經事前審查核准使用。

(2) 每日限最多使用4粒。

2. 用於 WHO Functional Class II~III 之結締組織病變導致之肺動脈高血壓成人患者：(114/6/1)

(1) 限符合下列各項條件之病患，合併 PDE-5i 或 ERA 使用：

I. 經 PDE-5i 和 ERA (如：sildenafil 和 macitentan) 併用治療半年後，療效不佳仍處於中低風險，或不耐受靜脈注射或吸入型前列腺環素類(prostacyclin analogues, PCA)藥物之中高風險患者。

Ⅱ. 經風濕免疫專科醫師會診，確認有需使用者。

(2) 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以6個月為限。申請時須檢附最近三個月內的右心導管檢查報告、NYHA Functional class、六分鐘步行測試、心臟超音波或心電圖、心房衰竭指數 (BNP or NT-proBNP) 等檢查結果，專科醫師會診意見等病歷紀錄，若患者臨床條件無法接受右心導管檢查，則需另檢附心臟磁共振造影檢查報告。

(3) 使用後每6個月需重新評估一次治療之療效，若出現下列任一情況者，或出現無法耐受之副作用，應暫停使用並加強結締組織病本身疾病之控制。

I. 因肺動脈高血壓惡化導致住院。

Ⅱ. 六分鐘步行測試(行走距離縮短15%以上)伴隨 WHO 功能分級惡化或需要額外使用其他肺動脈高血壓藥物的治療(例如需使用注射型類前列腺藥品)。

Ⅲ. 因肺動脈高血壓惡化(worsening)需接受肺臟移植。

(4) 必要時得於3個月後再行申請使用1次，惟若再行使用6個月後狀況仍無進步者，則不得再使用。

(5) 每日限最多使用4粒。

2.8.2.8. Treprostinil (如 Remodulin inj.、Tyvaso) : (109/1/1、112/3/1、113/1/1)

1. 吸入劑：限用於治療 WHO Group I 原發性肺動脈高血壓合併 NYH A class III 症狀。
2. 注射劑：限用於特發性或遺傳性肺動脈高壓(WHO functional class III 及 IV)，並符合下列條件：(112/3/1、113/1/1)
WHO 功能性分級第Ⅲ級且非屬於 high risk 病人，須先經 iloprost 吸入劑或口服 ambrisentan、bosentan、macitentan、sildenafil、riociguat 或 selexipag 治療反應不佳或有禁忌症或有實證顯示疾病快速惡化或預後不佳。
3. 需經事前審查核准後使用，每次申請以24週為限，期滿須經再次申請核准後才得以續用。(109/1/1、113/1/1)

2.8.2.9. Tadalafil (如 Adcirca):(114/6/1)

1. 限用於原發性肺動脈高血壓、結締組織病變導致之肺動脈高血壓或先天性心臟病併發之肺動脈高血壓 (Eisenmenger 症候群) 運動能力差 (WHO Functional Class III 及 IV) 之成人病人。
2. 不得與任何有機硝酸鹽藥物 (如 nitroglycerin、isosorbide salts…等) 合併使用。

2.8.2.10. 含 macitentan 及 tadalafil 之複方製劑(如 Opsynvi):(115/5/1)

1. 用於結締組織病變導致之肺動脈高血壓，限符合下列各項條件之病人使用：

(1)經右心導管檢查，證實確實符合肺動脈高血壓之診斷。

(2)結締組織病變導致之肺動脈高血壓成人病人(須經肺動脈高血壓相關檢查，如肺功能、高解析胸部電腦斷層、肺部通氣及灌注核醫掃描、血液檢查、心臟超音波檢查、或六分鐘走路測試等排除其他病因)，且使用現有藥物(如：sildenafil 或 tadalafil)治療3個月後成效仍不佳者。

(3)經風濕免疫專科醫師會診，確認有需使用者。

2. 需經事前審查核准後使用。

(1)每次申請之療程以6個月為限。申請時須檢附 NYHA Functional class、六分鐘步行測試、心臟超音波或心電圖、心房衰竭指數(Pro-BNP or NT Pro-BNP)等檢查結果，及專科醫師會診意見等病歷紀錄。

(2)使用後每6個月需重新評估一次治療之療效，前述檢查結果皆未較使用前改善者，應暫停使用並加強結締組織病本身疾病之控制。必要時得於3個月後再行申請使用1次。

3. 每日限給付1粒，且不得與 PDE-5i 或 ERA 類藥物併用。

2.8.2.11. Sotatercept (如 Winrevair):(115/6/1)

1. 限用於經衛生福利部國民健康署認定之特發性或遺傳性肺動脈高血壓的成人病人(WHO Functional Class III 或 IV 級)，並符合下列條件之一：

(1)WHO 功能性分級第Ⅲ級病人，須先經 PDE 5-I/sGCS (phosphodiesterase type 5 inhibitor/soluble guanylyl cyclase stimulator)或 ERA (endothelin-receptor

antagonist)或PPA(prostacyclin pathway agents, 含口服、吸入、靜脈或皮下注射劑)藥品，至少使用二類以上藥品併用治療半年後，治療反應不佳或藥物耐受不良或有實證顯示疾病快速惡化，經評估後仍處於中高風險(intermediate-high risk)之附加治療(add-on therapy)。

(2)WHO 功能性分級第 IV 級病人，須先經 PDE 5-I/sGCS 或 ERA 或 PPA 靜脈或皮下注射劑等藥品，至少三類以上藥品治療三個月後，治療反應不佳或藥物耐受不良或有實證顯示疾病快速惡化，經評估後仍處於高風險(high risk)之附加治療(add-on therapy)。

2. 停止治療條件：治療期間，經評估有實證顯示疾病惡化或接受肺臟移植後，則應停止治療。

3. 需經事前審查核准後使用，每次申請以24週為限，期滿須經再次申請核准後才得以續用。

2.9. 利尿劑 Diuretics (100/1/1)

2.9.1. Eplerenone (如 Inspra) : (100/1/1、104/12/1)

限使用於對 spironolactone 無法耐受之下述個案：

1. 心肌梗塞後之心衰竭病人。

2. 紐約心臟學會(NYHA) 心臟功能分類第 II 級(含)以上之慢性心衰竭及左心室收縮功能不全(LVEF $\leq$ 30%)的成人患者。(104/12/1)

2.9.2. Amiloride 單方口服製劑 (109/9/1)

1. 限 Liddle's Syndrome 病人經事前審查核准後使用。

2. 送審時須檢附高血壓、血液電解質異常(高血鈉、低血鉀)，酸鹼度偏鹼(如高 serum bicarbonate)、血液醛固酮(aldoosterone)偏低或正常濃度及低血液 renin activity 之病歷資料。

2.9.3. Furosemide 口服液劑(如 Fumide oral solution) : (110/7/1)

限使用於無法吞食錠劑者使用(病歷中應註明不能使用錠劑的原因)。(110/7/1)

2.10. 抗心律不整劑 Antiarrhythmics (100/8/1、111/2/1、112/12/1)

2.10.1. Dronedarone (如 Multaq) (100/8/1、111/2/1、112/12/1)

1. Multaq 適用於最近6個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律(sinus rhythm)狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：

(1)70歲以上，曾有過心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)之病患；(111/2/1)

(2)65歲以上未滿70歲，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者(例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑 $\geq$ 50mm)。(111/2/1、112/12/1)

2. 不得使用於有心衰竭診斷史病人。(112/12/1)

2.11. 抗痛風劑 Antigout agents

2.11.1. Febuxostat (如 Feburic) : (101/4/1、103/3/1、105/8/1、108/12/1)

限慢性痛風患者之高尿酸血症使用，且符合以下條件之一：

1. 曾使用過降尿酸藥物 benzbromarone 治療反應不佳，尿酸值仍高於6.0 mg/dL。
(103/3/1)
 2. 患有慢性腎臟病 ($\text{eGFR} < 45 \text{ mL/min/1.73m}^2$ 或 $\text{serum creatinine} \geq 1.5 \text{ mg/dL}$)，或具尿酸性腎臟結石或尿酸性尿路結石或痛風石，或肝硬化之痛風病人。(103/3/1、105/8/1、108/12/1)
 3. 痛風石病人使用時需於病歷上詳細記載部位(需有照片或 X 光攝影檢查)及醫療理由。(108/12/1)
- 2.11.2. 含 allopurinol 成分製劑(105/2/1)
1. 限使用於痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症之治療。
 2. 本藥品可能發生嚴重藥物不良反應，故不得使用於非核准之適應症。且須充分提醒病人相關不良反應症狀及後續作為。
- 2.12. Ivabradine(如 Coralan) (103/5/1、106/10/1)
1. 限符合下列所有條件之慢性心衰竭患者使用：
 - (1)依紐約心臟協會(NYHA)衰竭功能分級為第二級至第四級。(106/10/1)
 - (2)心臟收縮性功能不全，且 Ejection Fraction $\leq 35\%$ 。
 - (3)竇性心率且每分鐘心跳速率 ≥ 75 。
 - (4)對使用 β -阻斷劑為禁忌症或使用最大可耐受劑量之 β -阻斷劑已達四週(含)以上。(106/10/1)
 2. 每日使用二次，每次用量限不超過一粒。
- 2.13. Tolvaptan(105/9/1、108/7/1、109/3/1、109/10/1)：
- 2.13.1. Tolvaptan (如 Samsca)：(105/9/1、108/7/1、109/3/1)
1. 限用於住院病人有下列情形之一者：
 - (1)罹患心臟衰竭引起之低血鈉症(血清鈉濃度低於125mEq/L)，經傳統治療(包括限水，loop diuretics 及補充鹽分等) 48小時以上症狀仍無法改善之成年患者，鈉濃度達125mEq/L(含)以上應即停藥。(109/3/1)
 - (2)罹患抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 引起之低血鈉症(血清鈉濃度低於125mEq/L)，經傳統治療(包括限水，loop diuretics 及補充鹽分等) 48小時以上症狀仍無法改善之成年患者，鈉濃度達125mEq/L(含)以上應即停藥。
(109/3/1)
 2. 每位病人每年限給付3次療程，同次住院限給付1次療程。每次療程最多給付4日，每日最多給付1粒。
 3. 須於使用後監測肝功能，肝功能指數大於正常上限3倍者應停用。
- 2.13.2. Tolvaptan (如 Jinarc)(108/7/1、109/10/1、111/2/1)：
1. 限腎臟專科醫師處方，須經事前審查核准後使用，每日至多使用2粒，每年檢附評

估資料重新申請。

2. 初次使用限用於已出現病情迅速惡化跡象之第 3 期慢性腎臟病的18歲以上，50歲以下自體顯性多囊性腎臟病(ADPKD) 患者，且腎臟影像呈雙側/瀰漫性水泡，病情須符合下列至少一項(109/10/1、111/2/1)：

- (1)一年之內 eGFR 下降 ≥ 5.0 mL/min/1.73 m² 或五年內 eGFR 每年下降 ≥ 2.5 mL/min/1.73 m²，且排除其它如脫水、藥物、感染、阻塞等原因所致。
- (2) htTKV 符合 Mayo 分期1C-1E disease

3. 病患開始使用 tolvaptan 前，確認下列條件及病史：

- (1)用藥前肝功能正常
- (2)血清尿酸濃度控制在7mg/dL 或以下
- (3)沒有青光眼或經眼科醫師證明眼壓控制良好
- (4)沒有皮膚腫瘤的病史
- (5)沒有電解質異常
- (6)排除懷孕、哺乳、脫水、尿路阻塞、及肝臟損傷病史

4. 出現下列情況時停用 tolvaptan：

- (1)在藥物調整後，肝功能指數仍高於上限三倍
- (2)在使用 tolvaptan 一年後，eGFR 下降仍 ≥ 5 mL/min/1.73 m²
- (3)有明顯副作用以致有危害健康的疑慮時

2.14. Sacubitril+Valsartan (如 Entresto)：(106/3/1、109/6/1、110/7/1、111/5/1)

1. 限符合下列各項條件之慢性收縮性心衰竭患者使用：

- (1)依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) $\leq 35\%$ (初次使用者須檢附半年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果為參考依據；如果是急性心肌梗塞、急性心肌炎或初次裝置左心室再同步心律調節器或左心室再同步去顫復律器者，須經治療至少3個月並附上往後半年內之心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果為參考依據)；或左心室射出分率(LVEF)介於36%至40%且對 SGLT2抑制劑不耐受之病人(109/6/1、110/7/1、111/5/1)。
- (2)經 ACEI 或 ARB 穩定劑量治療，及合併使用 β -阻斷劑最大可耐受劑量已達4週(含)以上或使用 β -阻斷劑有禁忌症而無法使用，且再併用 SGLT-2抑制劑治療12週之後，LVEF 仍 $\leq 35\%$ ，或對 SGLT-2抑制劑無法耐受，仍有心衰竭症狀者。(109/6/1、111/5/1)

2. 不應與 ACEI 或 ARB 合併使用，開始使用本藥，至少要和 ACEI 間隔36小時。
(109/6/1)

3. 曾有血管性水腫(angioedema)病史者，禁止使用。

4. 每日限最多使用2粒。
5. 111年5月1日前已依修訂前之給付規定使用本藥品之病人，得繼續使用本藥品至醫師更新其處方內容。(111/5/1)
- 2.15. Digoxin 口服液劑(如 Cardiacin elixir)：(110/1/1)
限用於年齡1個月以上至未滿7歲兒童。
- 2.16. Dapagliflozin(如 Forxiga)、empagliflozin (如 Jardiance 10mg)：(111/5/1、111/8/1、114/3/1)
1. 慢性收縮性心衰竭：
- (1)用於慢性收縮性心衰竭病人(LVEF $\leq$ 40%)，應完全符合下列條件：
- I. 依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) $\leq$ 40%(初次使用者須檢附一年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果)。
- II. 經 ACEI 或 ARB 穩定劑量治療，及合併使用 β -阻斷劑最大可耐受劑量已達4週(含)以上或使用 β -阻斷劑有禁忌症而無法使用，仍有心衰竭症狀者。
- (2)用於慢性收縮性心衰竭病人(41% $\leq$ LVEF $\leq$ 49%)，應完全符合下列條件：
(114/3/1)
- I. 依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) $\geq$ 41且 $\leq$ 49%(初次使用者須檢附一年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果)。
- II. 經 ACEI 或 ARB 穩定劑量治療，及合併使用 β -阻斷劑最大可耐受劑量已達4週(含)以上或使用 β -阻斷劑有禁忌症而無法使用，仍有心衰竭症狀者。
- III. 過去曾有心臟衰竭住院病史或經心臟專科醫師診斷為心衰竭者。
2. 慢性腎臟病：(114/3/1)
- (1)限用於參加「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期(Pre-ESRD)之病人照護與衛教計畫」之慢性腎臟病病人，應完全符合下列條件：
- I. 接受 dapagliflozin 或 empagliflozin 治療前應穩定接受最大耐受劑量的 ACEI 或 ARB 至少4週。
- II. 起始治療 eGFR $\geq$ 25且 $\leq$ 60mL/min/1.73m²。
- III. uACR $\geq$ 200且 $\leq$ 5000/mg/g。
- IV. 須排除有以下任一情形：
- i. 第1型糖尿病。
- ii. 已知為多囊腎、紅斑性狼瘡相關腎病，或抗中性粒細胞胞漿抗體(ANCA)相關血管炎。

iii. 六個月內接受化療/免疫抑制治療或其他原發性或繼發性腎臟疾病的免疫治療。

iv. 器官移植病史。

v. 急性心肌梗塞、不穩定型心絞痛、中風或12週內短暫性腦缺血發作。

vi. 12週內冠狀動脈血運重建術。

(2)使用後 eGFR 下降至 $<15\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ ，應予停藥。

3. 每日最多處方1粒。

2.17. Tafamidis (如 Vyndamax) : (113/2/1)

1. 限用於成人轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉著症造成之心肌病變(transthyretin-mediated amyloid cardiomyopathy, ATTR-CM)，且符合下列各項條件：

(1)須排除腎功能不全患者($\text{eGFR} < 25\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$)。

(2)須排除為 Amyloid light chain (AL amyloidosis；輕鏈蛋白相關之類澱粉沉積症)。

(3)經心臟核醫掃描(例如:診療項目代碼26023B)等於第三級以上(PYP scintigraphy scan visual score = Grade 3)，並經心臟組織切片(cardiac biopsy)檢查確認。

(4)依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級第二至第三級(class 2 & 3)。

(5) $\text{NT-proBNP} \geq 600 \text{ pg/ml}$ 或 $\text{BNP} \geq 100 \text{ pg/ml}$ (符合其中一項即可)。

(6)心室中膈厚度(interventricular septal wall thickness) $>12\text{mm}$ 且左心室後壁舒張末期厚度(LVPWd: Left Ventricular Posterior Wall Dimensions) $>12\text{mm}$ 。

(7)左心室射出率(LVEF, left ventricular ejection fraction) $\geq 40\%$ 。

2. 限具有心臟專科醫師處方。

3. 須經事前審查核准後使用。

4. 繼續使用條件：

使用藥物治療達1年以上，且確定紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級未達第四級，方可繼續使用。

5. 出現下列任一情況時需停用：接受心室輔助系統、心臟移植或肝臟移植治療。

6. 每日限使用1粒，限給付45個月。

2.18. Captopril 內服液劑 (如 Cen-Capto Oral Solution) : (114/8/1)

限用於未滿12歲兒童之高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變；及12歲以上至未滿18歲患有前述疾病需劑量調整或具有吞嚥障礙而不適用一般錠劑之兒童族群。

2.19. Mavacamten (如 Camzyos) : (115/4/1)

1. 限用於治療症狀性紐約心臟學會(NYHA)分級第二級及第三級阻塞型肥厚性心肌病變(HCM)之18歲以上成人病人，用以改善功能容量與症狀。病人須符合以下條件：

- (1)左心室壁厚度(left ventricular wall thickness) $\geq 15\text{mm}$ (具有HCM家族史者則 $\geq 13\text{mm}$)。
 - (2)經心臟超音波檢測之靜止時、伐式操作(Valsalva maneuver)或運動後之LVOT壓力差 $\geq 50\text{mmHg}$ 且LVEF $\geq 55\%$ 。
 - (3)曾接受過乙型阻斷劑或鈣離子阻斷劑(verapamil或diltiazem)治療並已達最大LVOT壓力差下降效果的劑量後，在治療期間仍無法控制LVOT壓力差；但具禁忌症或無法耐受者不在此限。
2. 須經事前審查核准後使用，第一次申請以6個月為限，期滿需經再次申請核准後使用，每次續用申請以12個月為限。
 3. 續用條件：使用藥物治療達6個月以上，LVEF $\geq 55\%$ ，並且靜止時、伐式操作(Valsalva maneuver)或運動後之LVOT壓力差 $< 50\text{mmHg}$ 或治療前後LVOT壓力差下降幅度達 20mmHg 。
4. 停藥條件：
 - (1)當LVEF $< 50\%$ 時應中斷治療，每4週再次確認心臟超音波參數，直到LVEF $\geq 50\%$ 為止，並依仿單用法重啟治療。
 - (2)當每日劑量 2.5mg 時，發生2次LVEF $< 50\%$ 或1次LVEF $\leq 30\%$ 時，須永久停藥。
 5. 限心臟專科醫師處方。
 6. Camzyos 2.5mg 每日至多給付2粒，Camzyos 10mg 或 15mg 每日至多給付1粒，且 2.5mg 不得與 10mg 或 15mg 併用。