

# **RANDOM NUMBER GENERATION**

## Quantitative Risk Management project work

---

Silvia Baldisserotto, Maysa Jahanbani,  
Claudia Pesci, Phan Ho Tan Phat,  
Andrea Venuta

Università degli Studi di Firenze - Finance and Risk Management

## IMPLEMENTATIONS - LINEAR CONGRUENTIAL GENERATOR

```
1  function [ rn ] = LCG( x )
2
3      if(nargin == 0)
4          x = 1;
5      end
6
7      rn = zeros(x,1);
8
9      for i = 1:x
10         rn(i) = LCGstep();
11     end
12
13 end

14 function [ rnStep ] = LCGstep()
15
16     persistent seed;
17     M = 244944;
18     a = 1597;
19     b = 51749;
20
21     if isempty(seed)
22         seed = 0;
23     end
24
25     seed = mod(seed * a + b, M);
26
27     rnStep = seed / M;
28
29 end
```










## IMPLEMENTATIONS - BOX-MULLER METHOD

```
1  function [ Z ] = BoxMuller( x )
2
3      if(nargin == 0)
4          x = 1;
5      end
6
7      U = rand(x, 2);
8
9      theta = 2 .* pi .* U(:, 2);
10     rho    = sqrt( -2 .* log( U(:, 1) ) );
11
12     Z = [ rho .* cos(theta), rho .* sin(theta) ];
13
14 end
```

## IMPLEMENTATIONS - MARSAGLIA POLAR ALGORITHM


```
1  function [ Z ] = Marsaglia( x )
2
3      if(nargin == 0)
4          x = 1;
5      end
6
7      Z = zeros(x,2);
8
9      for i = 1 : x
10         W = 1;  V = [ 1, 1 ];
11         while not (W < 1)
12             V = 2 * rand(1, 2) - 1;
13             W = V(1) .^ 2 + V(2) .^ 2;
14         end
15
16         Z(i, :) = V .* sqrt(-2 * log(W) / W);
17     end
18 end
```

# PLOTS - UNIVARIATE METHODS




# PLOTS - BIVARIATE METHODS


**norminv(rand()),  $10^2$  samples**




**Box-Muller,  $10^2$  samples**




**Marsaglia,  $10^2$  samples**




**norminv(rand()),  $10^4$  samples**




**Box-Muller,  $10^4$  samples**




**Marsaglia,  $10^4$  samples**



**norminv(rand()),  $10^6$  samples**



**Box-Muller,  $10^6$  samples**



**Marsaglia,  $10^6$  samples**

