

موافقة المريض على بدء علاج تبييض الأسنان

اسم المريض	:	Alston Rebello	هويه الإمارات	:	784-1991-2906159-3
رقم الملف	:	17	تاريخ الميلاد	:	1996-06-20
جنس	:	Male	اسم الطبيب	:	Alan Alfred
	:		جنسية	:	Indian
	:		تاريخ	:	2024-03-02

: لقد تم إعطائي المعلومات المطلوبة حتى أتمكن من اتخاذ قرار حول تبييض أسناني. لـدياالحقفيطرح
أيأسئلةقبلاالموافقةعلماالخضوعللإجراء

وصفالإجراء

تبييض الأسنان داخل العيادة هو إجراء مصمم لتفتيح لون أسناني باستخدام جل بيروكسيد الهيدروجين. خلال العملية، سيتم تطبيق جل التبييض على أسناني لمدة ثلاث مرات ، ١٥ دقيقة للجلسة الواحدة . خلال العلاج بكاملة.سيتم تقييم لون أسناني العلويه وتسجيلها قبل وبعد العلاج

العلاجاتالبديلة

نا افهم أن هناك علاجات بديلة لتبييض الأسنان التي تعطى من قبل طبيب الأسنان التي يمكن ان توفر لي معلومات إضافية. هذه العلاجات تشمل: معجون تبيض الأسنان/جل ومجموعة التبييض المنزلي

مخاطر العلاج

وأنا أفهم أيضا أن نتائج علاج التبييض قد تختلف أو تتراجع بسبب مجموعة متنوعة من الظروف. وأنا أفهم أن جميع الأسنان الطبيعية تقريبا يمكن أن تستفيد من العلاج و يمكن تحقيق تبييض بنسبة كبيرة في معظم الحالات. أدرك أن علاجات التبييض لا تهدف إلى تبييض الأسنان الاصطناعية أو التلييس أو التيجان أو الفشرة أو الخزف أو المواد المركبة ، وأن الأشخاص الذين يعانون من أسنان ملونة صفراء داكنة أو صفراء بنية غالبا ما يحققون نتائج أفضل من الأشخاص ذوي الرمادي أو الرمادي المزرق. أنا أفهم أن الأسنان ذات الألوان المتعددة، اللطخات أو البقع بسبب استخدام التتراسيكلين أو الفلور لا يمكن تبييضهم أيضاً قد يحتاجون الى علاجات اخرى متعددة ويمكن ان لا يتم تبييضهم على الإطلاق. أنا افهم أن الأسنان مع الكثير من الحشوات ، التجاويف أو الشقوق لا يمكن أن يفتح لونها وعادة ما يعالج بطريقة أفضل مع البدائل الاخرى غير التبييض. أنا افهم أن المؤقتات المصنوعة من الأكرليك قد يتغير لونها بعد التعرض للعلاج

أنا أفهم أن العلاج لا ينصح للمرضى الذين يعانون من حساسية معروفة للراتنجات، بيروكسيدات أو جليكول

وأنا أفهم أن علاج التبييض في العيادة تعتبر آمنة عموما من قبل معظم أطباء الأسنان. أدرك أن هناك بعض المضاعفات المحتملة لهذا العلاج تشمل، على سبيل المثال لكن لاتنحصر على ما يلي

حساسية الأسنان / الألم:

خلال ال ٢٤ ساعة الأولى بعد العلاج، يمكن للعديد من المرضى أن يعانون من بعض حساسية الأسنان أو الألم. هذا أمر طبيعي . عادة، حساسية الأسنان أو الألم بعد العلاج تخف بعد بضعة أيام، ولكن قد تستمر لفترات أطول من الوقت في الأفراد سريعون التأثير.الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الحالية، الركود، عاج الأسنان المكشوفة، اسطح الجذور المكشوفة، المينا التالفة أو المفقودة، تصدع الأسنان، الكسور (الشقوق الصغيرة)، تجاويف مفتوحة، تسريب حشوات، أو غيرها من ظروف الأسنان التي تسبب حساسية أو السماح بتغلغل الجل في السن قد تجد أن هذه الشروط تزيد أو تعمل على إطالة حساسية الأسنان أو الألم بعد العلاج

اللثة / الشفاه / التهاب الخد:

د يسبب التبييض التهاب اللثة أو الشفاه أو طرف الخدين. وعادة ما يكون الالتهاب مؤقتا، والذي قد يهدأ في غضون بضعة أيام. ولكنه قد يستمر لفترة أطول، وقد يؤدي إلى ألم أو إزعاج كبير، وهذا يتوقف على درجة تعرض الأنسجة الرخوة للجل

جفاف / تشققالشفاه:

يتضمن العلاج فتح الفم بشكل مستمر للعلاج من قبل كامشة بلاستيكية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف أو تشقق الشفاه أو طرف الخد، والتي يمكن معالجتها عن طريق وضع بلسم الشفاه، جل النفط أو كريم فيتامين E

التجاويفأوتسربالحشوات:

هذه هي الظروف التي تؤثر على جذور الأسنان عندما تتراجع اللثة وهي عبارة عن الشقوق و / أو المنخفضات التي تظهر أكثر قتامة من بقية الأسنان،حيث تلتقي الأسنان باللثة. فقد طبقة المينا نتيجة التفريش الخاطئ للأسنان أو بفعل الأحماض. حتى لو كانت هذه المناطق ليست حساسة حاليا، فإنها يمكن أن تسمح لجل التبييض باختراق الأسنان مما يتسبب في الحساسية والألم والأضرار المحتملة للعصب. وأنا أفهم أنه إذا كانت أسناني تخضع لنفس الحالة لا ينبغي أن تخضع للعلاج

التآكل للسن:

ذه هي الظروف التي تؤثر على جذور الأسنان عندما تتراجع اللثة وهي عبارة عن الشقوق و / أو المنخفضات التي تظهر أكثر قتامة من بقية الأسنان، حيث تلتقي الأسنان باللثة. فقد طبقة المينا نتيجة التفريش الخاطئ للأسنان أو بفعل الأحماض. حتى لو كانت هذه المناطق ليست حساسة حالياً، فإنها يمكن أن تسمح لجل التبييض باختراق الأسنان مما يتسبب في الحساسية والألم والأضرار المحتملة للعصب. وأنا أفهم أنه إذا كانت أسناني تخضع لنفس الحالة لا ينبغي أن تخضع للعلاج

تآكل الجذر:

هذا هو الشرط حيث يبدأ جذر السن في الذوبان إما من الداخل أو الخارج. على الرغم من أن سببه لا يزال غير مؤكد، وأنا أفهم أن هناك أدلة تشير إلى أن حدوث تآكل الجذر أعلى في المرضى الذين خضعوا لعلاج العصب تليها إجراءات التبييض

الإنتكاس:

بعد العلاج، فمن الطبيعي للأسنان التي خضعت لإجراء تبييض أن يتراجع لونها الى حد ما. هذا أمر طبيعي وينبغي أن يكون تدريجيا ، ولكن يمكن تسريعها من خلال تعريض الأسنان لعوامل تلوين الأسنان المختلفة. وعادة ما ينطوي العلاج على ارتداء قالب منزلي أو تكرار العلاج. وأنا أفهم أن نتائج العلاج ليست دائمة ، قد تكون هناك حاجة إلى تكرار العلاج أو اتخاذ العلاجات المنزلية للحفاظ على لون الأسنان المرغوب به. وأنا أفهم أنه بعد العلاج سوف يطلب مني الامتناع عن استهلاك أي مواد ملونة للأسنان لمدة ٤٨ ساعة الأولى

وتشمل هذه المواد: القهوة والشاي والكولا، وجميع منتجات التبغ، الخردل أو الصلصة، والنبذ الأحمر وصلصة الصويا، فطيرة التوت، والصلصات الحمراء وأحمر الشفاه. أنا أفهم أن هناك مواد أخرى ملونة للأسنان يجب تجنبها خلال ال 48 ساعة الأولى بعد العلاج. إذا كان لدي أي أسئلة بخصوص أي مادة من هذا القبيل، أفهم أنه يمكن مناقشته مع الطبيب. يمكن تفسير السلامة والفعالية والمضاعفات المحتملة ومخاطر العلاج لي من قبل طبيب الأسنان الخاص بي وأنا أفهم أن المزيد من المعلومات حول هذا سوف يقدم لي بناء على طلبي. وبما أنه من المستحيل ذكر كل المضاعفات التي قد تحدث نتيجة للعلاج، فإن قائمة المضاعفات في هذا النموذج غير مكتملة

أوافق على التقاط الصور الفوتوغرافية، التصوير والتسجيل و الأشعة السينية بشرط لا يتم الكشف عن هويتي

لقد تم شرح الإجراءات الأساسية للعلاج والمزايا والعيوب والمخاطر و المضاعفات المحتملة من العلاجات البديلة من قبل طبيب الأسنان وقد تلقيت إجابات مرضية

في التوقيع على هذه الاستمارة أقر بأنني قد قرأت أو قرأ لي محتويات هذا النموذج وأنا أفهم تماما المخاطر المحتملة، والمضاعفات والمزايا التي يمكن أن تنتج عن العلاج وأن أوافق على الخضوع للعلاج كما وصفها طبيب الأسنان

قم بالتوقيع هنا فقط إذا تمت الموافقة على جميع الأسئلة		
مريض	شاهد	طبيب
		<div></div>
اسم المريض Alston Rebello تاريخ 2024-03-02	اسم الشاهد uyhhhg تاريخ 2024-03-02	(Alan Alfred - Dental (GD10001 تاريخ 2024-03-02

