

الموافقة على الحقن بالботوكسحقن البوتولينوم(Botox)

اسم المريض	:	Reshma Siya	هوية الإمارات	:	784-6478-3648736-8
رقم الملف	:	4	تاريخ الميلاد	:	1995-05-21
جنس	:	Female	اسم الطبيب	:	dermatology derma
	:		تاريخ	:	2024-02-15
	:		جنسية	:	Other

تعليمات

هذه وثيقة موافقة تم إعدادها للمساعدة في إخبارك فيما يتعلق بحقن البوتوكس ، وخطرها ، والعلاج (العلاجات) البديلة. من المهم أن تقرأ هذه المعلومات بعناية وبشكل كامل. يرجى التهيئة الأولية لكل صفحة ، مشيرة إلى أنك قرأت الصفحة ووقعت الموافقة.

المقدمة

يشمل حقن البوتوكس سلسلة من الحقن الصغيرة لإضعاف العضلات المختارة على سبيل المثال في الحاجب أو تحت العين. يبدأ ضعف العضلات المحقونة في الظهور بعد 2-3 أيام مع وصول تأثير الذروة بعد 7 أيام. يمكن أن تستمر النتيجة 3-6 أشهر. يمكن تكرار الإجراء بعد 3 أشهر ؛ ومع ذلك ، فإن الحقن المعطى لفترة أقل من 3 أشهر قد يقلل من فعالية الحقن.

العلاج البديل

البديل عن العلاج غير الجراحي والجراحي لظهور التجاعيد والخطوط في الجلد يتكون من علاج الكولاجين و بالليزر ورفع الحاجب. ترتبط المخاطر والمضاعفات المحتملة بأشكال العلاج البديلة.

مخاطر حقن البوتوكس

ينطوي كل إجراء على قدر معين من المخاطر ، ومن المهم أن تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يعتمد اختيار الفرد للخضوع لإجراء ما على مقارنة المخاطر بالفوائد المحتملة. على الرغم من أن غالبية المرضى لا يعانون من هذه المضاعفات ، يجب عليك مناقشة كل منهم مع الجراح للتأكد من أنك تفهم المخاطر والمضاعفات المحتملة وعواقب حقن البوتوكس.

النزيف من الممكن ، على الرغم من أنه غير عادي ، تجربة نزيف أثناء أو بعد العملية. لا تتناول أي أدوية تحتوي على الأسبرين أو مضادات الالتهاب لمدة عشرة (10) أيام قبل موعد حقن البوتوكس الخاص بك.

التورم بعد هذا الإجراء ، ليس من غير المألوف الكدمات في موقع الحقن.

التهاب في حالة حدوث التهاب ، قد يكون من الضروري علاج إضافي بما في ذلك المضادات الحيوية. قد يؤدي الإجراء إلى تشوهات مرئية غير مقبولة ، وفقدان الوظيفة و / أو فقدان الإحساس. قد تشعر بخيبة أمل من نتائج الإجراء.

ردود الفعل التحسسية - في حالات نادرة ، تم الإبلاغ عن الحساسية المحلية للمستحضرات الموضعية. قد تنتج التفاعلات الجهازية الأكثر خطورة عن الأدوية المستخدمة أثناء الجراحة والأدوية الموصوفة. قد يتطلب رد الفعل التحسسي معالجة إضافية .

إسقاط الجفون (تدلي الجفون) - هذه مضاعفات نادرة ولكنها عابرة تحدث في 1-2٪ من المرضى. يمكن تقليل الإصابة عن طريق وضع الحقن اللاحقة.

من المهم أن تقرأ المعلومات المذكورة أعلاه بعناية وأن تجيب على جميع أسئلتك قبل التوقيع على هذه الموافقة.

لقد قرأت نسخة من الموافقة السابقة على الإجراء ، أفهمه ، أقبل هذه الحقائق ، وأصرح الدكتور . dermatology derma ، بإجراء عملية حقن البوتوكس.

قم بالتوقيع هنا فقط إذا تمت الموافقة على جميع الأسئلة		
طبيب	شاهد	مريض

		
dermatology derma - Dermatology (0) تاريخ 2024-02-15	اسم الشاهد gdgdfg تاريخ 2024-02-15	اسم المريض Reshma Siya تاريخ 2024-02-15

