Pdo-Arabic شركة تنمية نفط عمان-العربية									
Patient Name اسم المريض	:	Reshma Siya			Emirates ID هويه الإمارات	:	784-6478-3648736-8		
File No رقم الملف	:	4	DOB تاريخ الميلاد	:	1995-05-21	Nationality جنسیة	:	Other	
Gender جنس		Female	Doctor's Name اسم الطبيب		dermatology derma	Date تاريخ	:	2024-03-04	

ما هو الشد بالخيط PDO؟

شد الوجه بالخيوط هو شكل جديد نسبيًا من شد الوجه عير الجراحي. إذا كان وجهك يعاني من ترهل أو ترهل الجلد وتريد مظهرًا مشدودًا وأكثر شبابًا ، فقد يكون هذا العلاج مناسبًا. لا توجد جروح أو شقوق ، فقط حقن.

كيف يعمل؟

خيوط بولى ديوكسانون (PDO) هي خيوط طبية خاصة أرق من الشعر ، مصنوعة من البروتين. أكنت الأبحاث أن PDO يريح الأوتار والعضلات ، في حين أن تفاعل الجسم الخريب يحسن تدفق الدم إلى المنطقة التي تحفز تكوين الكولاجين الجديد (إنتاج الكولاجين الجديد في الجلد). كما أنه يحفز الإيلاستين وحمض الهيالوروبيك ، وكلا المادتين أساسيان للحفاظ على بشرة متينة وشابة.

هل هو آمن؟

تتمتع خيوط PDO بسجل حافل بالأمان لأكثر من عقد من الزمان في الجراحة وإعلاق الجرح. حصلت خيوط PDO على موافقة إدارة الخذاء والدواء.

ماذا يحدث أثناء العلاج؟

يتم تطبيق حقن الليدوكائين الموضعي على نقاط الدخول ثم يتم إدخال الخيوط في الجلد من خلال إبرة دقيقة - إما في الجلد نفسه أو في العضلات أو في الدهون تحت الجلد. ينتج عن العلاج تحسن فوري في المظهر ولكن النتائج ستتحسن خلال الأيام والأسابيع التالية حيث يحفز PDO التكوّن الجديد ، مما يزيد من كمية الكولاجين في الجلد. يتحسن مظهر الجلد من حيث الملمس العام ، ويصبح أكثر سمكًا ، وأكثر إحكامًا ، مع تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ما هي المناطق التي يمكن معالجتها؟

هذا علاج متعدد الاستخدامات للغاية ويمكن استخدامه في أي جزء من الوجه والرقبة لعلاج ترهل الحواجب ، والخطوط الأنفية ، وتجاعيد الجبهة الرأسية والأفقية ، وتعلى الخدين ، وخطوط الماريونيت ، وترهل خط القك ، بالإضافة إلى التجاعيد والثنيات على الذقن والرقبة .

ما النتائج التي يمكنني توقعها؟

تؤدي علاجات شد الجلد بالخيوط إلى تحسن فوري وطبيعي في مظهر الجلد. ثم تبدأ عملية خلق البروتين الطبيعي بعد حوالي 10-14 يومًا. خلال الأسابيع التالية ، ستستمر النتائج في التحسن ، حيث تبلغ نروتها عند حوالي 6 أشهر وتستمر لمدة تصل إلى عامين حيث ينتج جسمك الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك. يحتبر هذا الشكل من عمليات شد الوجه عير الجراحية علاجًا طويل الأمد. الخيط نفسه قابل للتحلل البيولوجي تمامًا وينوب في عضون 12 أسبوعًا ، وبعد ذلك يتشكل كولاجين جديد حول الخيط لمواصلة دعم النتائج ، والحفاظ على ملمس داعم ومرن للبشرة.

قد لا يكون العلاج مناسبًا إذا:

كان لديك حب شباب نشط / جلد مشقوق أو معرض للإصابة بقرح البرد.

تتاولت الأدوية المضادة للتختر مثل الأمبرين / الوارفارين / الهيبارين أو تتاولت الكحول خلال 48 ساعة من العلاج (ننصحك بالاستمرار في تتاول الأدوية الموصوفة ولكن التوقف عن تتاول بعض المكملات الغذائية المجانية مثل زيت زهرة الربيع المسائية وفيتامين دوأ و هـ والأسماك الزيوت وزيت بنور الكتان والمختيسيوم والثوم والجنكة قبل العلاج).

العلاج غير مناسب إذا:

كات حاملا أو مرضعة.

لديك مرض مناعي ذاتي أو مرض السكري أو العدوى.

معلومات ما بعد العلاج

ما الذي يجب / لا ينبغي عليك فعله بعد العلاج؟

لن يواجه معظم الداس مشكلة في استئداف الأنشطة العادية بعد العلاج مباشرة إذا تم اتباع جميع التعليمات ، فستكون العملية مريحة وسريعة وتوفر وقدًا فعالًا للشفاء.

نصانح عامة حول الرعاية اللاحقة:

- يمكن توقع بعض الألم / الانزعاج بعد العلاج ، ويمكن تتاول الإيبوبروفين إذا لزم الأمر.
- في بعض الإجراءات سلصف لك مضاد حيوى عن طريق الفم (الوجمئلين 1000 مجم لمدة 5 ايام.
 - عدم القيام بأي إجراءات جمالية أخرى (مثل التوكسين ، والفيلر ، والتقشير ، إلخ) لمدة 7 أيام
- تجتب درجات الحرارة المرتقعة والكحول ومضادات التختر لمدة 7 أيام. يجب على أولئك الذين يتناولون مضادات التختر الموصوفة مثل الأسبرين / الوارفارين الاستمرار في فعل ذلك ولكن يجب أن يدركوا أن احتمالية ظهور الكدمات.
 - · اعسلى المنطقة المعالجة برفق حسب الحاجة ، لكن لا تفركي أو تدلكي لمدة أسبوعين.
- من المهم عدم الإفراط في تمديد المنطقة المعالجة (أي فتح الله على اتساعه) لمدة 4 أسابيع (تجدب علاج الأسدان خلال هذا الرقت إن أمكن)
- لا تستخدم ترددات الراديو أو IPL أو الليزر أو عيرها من العلاجات الحرارية بالقرب من المنطقة المعالجة لمدة 10 أسابيع.

هل هناك أي آثار جانبية؟

هناك حد أدتى من التعطل ولا توجد مخاطر تخدير عامة. تسمح الإبر المتخصصة بمعالجة المناطق الصغيرة بشكل فعال. نظرًا لحدم وجود شقوق ، لا يلزم إجراء عرز ، ومن عير المحتمل حدوث نديات.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها:

الأثار الجانبية الأقل شيوعًا:

ألم / شد

لتوء الخيط ، تجعيد الجلد

تزیف / کدمات / ورم دموی

العدوي ، الورم الحبيبي

تورم / الْتهاب

الشقيقة (التروس)

عدم التماثل

صدمة عصب الوجه

لاذع / خدش / سحب الأحاسيس

رد فعل تحسسي

الموافقة على العلاج

لقد قرأت ورقة معلومات العلاج ذات الصلة وأبلغت تمامًا بالمخاطر والعواقب المحتملة التي ينطوي عليها العلاج أعلاه. أنا أفهم أن النتيجة ليست مضمونة. المعلومات التي قدمتها صحيحة. لم أخفى أي معلومات طبية معروفة. سأتصل بطبيبي إذا كان لدى أي استفسارات حول علاجي.

Sign here, only if all of your questions have been answered to your satisfaction قم بالتوقيع هنا، فقط إذا تمت الإجابة على جميع أسئلتك بما يرضيك						
Patient	Doctor					
مریض	طبیب					
	Irch & Spinulary					
Patient Name	Doctor Name					
اسم المريض	اسم الطبیب					
Reshma Siya	dermatology derma - Dermatology (0)					
Date	Date					
تاریخ	تاريخ					
2024-03-04	2024-03-04					

