

1. EINTAGSFLIEGEN (EPHEMEROPTERA)

01

Englisch: Mayflies • Das Herzstück des Fliegenfischens

ANATOMISCHE ERKENNUNGSMERKMALE

- **Flügelhaltung:** In Ruhe steil und aufrecht nach oben gerichtet wie ein Segel. Können nicht flach auf den Rücken gelegt werden.
- **Hinterleib:** Schlank, elegant, oft deutlich nach oben gebogen.
- **Schwanzfäden (Cerci):** 2 bis 3 extrem lange, feine Fäden am Körperende.

VERHALTEN & BEDEUTUNG

- **Schlupf (Hatch):** Nymphen steigen zur Oberfläche auf. Die Fliege bricht aus der Hülle ("Dun") und verweilt kurz flugunfähig im Oberflächenfilm.
- **Paarungstanz:** Charakteristisches, rhythmisches Auf- und Abtanzen in großen Schwärmen über dem Wasser.

WICHTIGSTE FLIEGENMUSTER (FLY PATTERNS)

Nymphen:

Pheasant Tail Nymph

Gold Ribbed Hare's Ear

Trockenfliegen:


Adams (Universal)

Blue Winged Olive (BWO)

Ephemera Danica (Maifliege)

CDC Spent Spinner

KLARSTRUKTURIERTE ANATOMIE • IMAGO (ADULT)



2. KÖCHERFLIEGEN (TRICHOPTERA)

02

Englisch: Caddisflies / Sedges • Die agilen Oberflächen-Flitzer

ANATOMISCHE ERKENNUNGSMERKMALE

- **Flügelhaltung:** In Ruhe dachartig bzw. zeltförmig geschlossen über dem Hinterleib gefaltet.
- **Schwanzfäden:** **KEINE** Schwanzfäden vorhanden.
- **Fühler (Antennae):** Auffallend lang, oft körperlang und starr nach vorne gestreckt.
- **Körper:** Behaart (im Gegensatz zu den geschuppten Flügeln von Schmetterlingen).

VERHALTEN & BEDEUTUNG

- **Larvenstadium:** Bauen faszinierende Schutzgehäuse ("Köcher") aus Kies, Sand oder Holzpartikeln am Gewässergrund.
- **Aktivität:** Adulte Insekten skattern, schlittern und laufen extrem aktiv über das Wasser, um Eier abzulegen. Dies provoziert spektakuläre, aggressive Bisse.

WICHTIGSTE FLIEGENMUSTER (FLY PATTERNS)

Larven & Puppen:

Peeping Caddis (Cased)

Hydropsyche Green Nymph

Caddis Pupa (Sparkle Pupa)


Trockenfliegen:

Elk Hair Caddis (Klassiker)

Goddard Caddis

Deer Hair Sedge

KLARSTRUKTURIERTE ANATOMIE • ADULT



3. STEINFLIEGEN (PLECOPTERA)

03

Englisch: Stoneflies • Die urzeitlichen Riesen der Bergbäche

ANATOMISCHE ERKENNUNGSMERKMALE

- **Flügelhaltung:** Im Ruhezustand völlig flach und parallel übereinander auf dem Rücken plaziert.
- **Körperbau:** Breit, flach, sehr robust und stark gepanzert.
- **Schwanzfäden (Cerci):** Genau 2 relativ kurze, dicke und stabile Schwanzfäden.
- **Fühler:** Kräftig und lang nach vorne stehend (V-Form).

VERHALTEN & BEDEUTUNG

- **Indikator:** Benötigen perfektes, eiskaltes und extrem sauerstoffreiches Wasser (höchste Güteklasse).
- **Schlupf:** Haben kein freies Puppenstadium im Wasser! Die schweren Nymphen krabbeln am Gewässerboden mühsam zum Ufer und schlüpfen auf Steinen.

WICHTIGSTE FLIEGENMUSTER (FLY PATTERNS)

Schwere Nymphen:

Pat's Rubber Legs (Top-Muster)

Kaufman's Stone


Prince Nymph (kleine Arten)

Trockenfliegen:

Stimulator (Hervorragende Sichtbarkeit)

Golden Stone Adult

KLARSTRUKTURIERTE ANATOMIE • ADULT



4. ZWEIFLÜGLER / MÜCKEN (DIPTERA)

04

Englisch: Midges • Das fundamentale Ganzjahresbrot der Fische

ANATOMISCHE ERKENNUNGSMERKMALE

- **Flügelanzahl:** Besitzen radikal **NUR 2 FLÜGEL**. Die Hinterflügel sind zu winzigen, kaum sichtbaren Stabilisierungskölbchen (Halteren) verkümmert.
- **Größe:** Meist winzig bis mikroskopisch (Hakengrößen 18 bis 26).
- **Schwanzfäden:** Völlig abwesend.
- **Kopf:** Männchen besitzen oft auffällig buschige, federartige Fühler.

VERHALTEN & BEDEUTUNG

- **Massenphänomen:** Treten an fast jedem Gewässer in astronomischen Stückzahlen auf. Schlüpfen selbst im kältesten Winter durch Eisspalten.
- **Puppe (Emerger):** Verweilt oft stundenlang völlig regungslos vertikal hängend direkt im Oberflächenfilm des Wassers – leichte Beute für selektive Fische.

WICHTIGSTE FLIEGENMUSTER (FLY PATTERNS)

Larven & Puppen:

Zebra Midge (Ultimativer Klassiker)

Bloodworm (Rote Zuckmückenlarve)

Brassie

Trockenfliegen:

Griffith's Gnat (Mückenklumpen)

Shipman's Buzzer

Black Gnat

KLARSTRUKTURIERTE ANATOMIE • MÜCKE (ADULT)

